

RETZ
FAUNA
ARCTICA

II
12-8-10

G⁺ — I⁺
34 v.
241

II
12-3-10

Ex Libris J. S. Capieux.



123 = 31.



6-2-A-12

ah. e. A. Capieux. Liny. 1817.



1



2



1. *Fringilla Flavirostris.*
2. *Fringilla Lulensis.*



FAUNAE SUECICAE

A

CAROLO À LINNÉ EQ

INCHOATAE

PARS PRIM

SISTENS

MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA
ET PISCES SUECIAE

QUAM

RECOGNOVIT, EMENDAVIT ET AUXIT

ANDREAS JOANNES RETZIUS

IN ACADEMIA LUNDENSIS HISTORIAE NATURALIS,
OECONOMIAE ET CHEMIAE PROFESSOR N. O.

R-4408

CUM TABULA AERI INCISA.

LIPSIAE MDCCC.

APUD SIEGFRIED LEBRECHT CRUSIUM.



TAUNAE SUECICAE

A

OMNIO A LINEE EST

TECHNOLIA

P A R S P R I M A

LIBRIS

MAMMILLA, AVES, AMPHIBIA

ET TERRE SUECICAE

QUAE

PROFUNDIT, EMENDAVIT ET AUXIT

ANNO DOMINI MDCCLXXXIII

IN ACADEMIA REGIA SCIENTIARUM SUECICAE
SESSIONE PUBLICA HABITA DIE 15 JUNII 1783

AD ACADEMIAM REGIAM SCIENTIARUM SUECICAM

IN ACADEMIA REGIA SCIENTIARUM SUECICAE

AD ACADEMIAM REGIAM SCIENTIARUM SUECICAM



V I R O

INCOMPARABILI

D. OLAO a b ACREL

M. D. PROFESSORI REGIO,

HOSPITALIUM DIRECTORI GENERALI, HOSPITALII
HOLMENSIS CHIRURGO PRIMARIO, REG. ACADEMIAE
SCIENTIARUM SUECICAE ETC. MEMBRO, R. N. O. O.
DE WASA COMMENDATORI ET DE SVELLA
POLARI EQUIVI

MEDICORUM PATRIAE SENIORI

CHIRURGORUM PRINCIPI

M. D. D.

AUCTOR.

AUCTOR

D. OLLO

L. B.

VIR

L. B.

A. 1746 primam dedit Faunae Suecicae editionem immortalis à Linné et An. 1761 secundam multum auctam; de tertia quidem cogitavit ill. Vir, at illam absolvere aliae prohibuerunt curae, imprimis Botanicae. Defuerunt per XXX fere annos secundae hujus editionis exemplaria in Bibliopoliis, et quod pejus, defuit nobis liber, qui post annum 1761 in patria detecta et observata Animalia complecteretur. Secundae novam tantum impressionem curare parum utilis est labor. Ut itaque huic defectui succurreretur, et Zoologiae studiosis pro viribus consulerem, et ut amicorum praecipue exterorum votis quantum in me esset, responderem, jam Ao. 1781. manus huic operi admovi, et qua permiserunt circumstantiae sollicitia perfeci.

En itaque primam Faunae nostrae partem, quae typis parata ultra octo annos fuit. Haec tamen mora operi non nocuit, nam sub illo tempore varia accesserunt augmenta, varia de novo describere licuit.

Si numerum spectes Animalium, insigniter quidem in hac parte auctum videbis, at in sequente parte ultra expectationem. Insectorum species adeo copiosae sunt in Patria nostra ac late dispersae, ut difficillimus omnino sit labor illas omnes rite describere ac ordinare. Collectionem locupletem, pretiosum Laborum apparatus, praeterea acutam oculorum aciem et otium multiplici officiorum cura haud interruptum requirit talis labor. Haec omnia quum mihi defint, operis socium et administrum quaerere necesse fuit, et Nobilissimum D. LAURENTIUM GYLLENHAL feliciter nactus sum. Hic egregius Vir, qui in juventute litteris optime imbutus, et prae ceteris Naturae studio captus, dein Satellitum Regionum Cohorti adscriptus,

tan-

tandem culturae patrii ruris et studiorum repetitioni se totum dedit. Sub hoc otio, si ita vocari debet, Entomologiam, quam duce à LINNE Patre maximo cum successu tractavit, praecipuo cum amore profecutus est, et ita excoluit, ut jam non facile quisquam ex nostris palman illi praeripiat. In eo quoque jam studiose versatur, ut hanc Faunae nostrae partem elahoret, Tertiam vel Helminthologicam partem, ipse, si Deus vitam et vires dederit, conscribere mihi in animo est.

Basin primae hujus partis constituit Fauna Suecica Linneana, cujus descriptiones quantum licuit retinui, multas tamen novas addidi, alias emendavi, transpositis sua loca dedi.

Omnia in hac parte enumerata Animalia propius non licuit inspicere oculis, aliorum itaque observationes adhibere necesse fuit, cum cura autem illis usus sum. Inprimis magno mihi usui fuerunt Autographon Celebrissimi olim Aboensium Professoris IOHANNIS LECHE de

Avi-

Avibus Sueciae, et observationes Ornithologicae, quas rogati benevole mecum per litteras communicarunt amici aestumatissimi, Upsalienses Professores C. P. THUNBERG et S. ÖDMAN, nec non Celeb. Doct. et Assessor P. G. LINDROTH et Generos. Juvenis Comes H. G. WACHTMELSTER, quos itaque grato animo nominare debeo.

Icones in Fauna Suecica Linneana obvias repetere haud necessarium duxi, quia in utraque editione hujus libri prostant. Novas quas dedi, nuper laudati LINDROTH amicitiae debeo. Ex iconibus Rudbeckianis, quarum Centum et Octo tabulas Bibliotheca Grilliana Söderforsensis possidet, depictae sunt ipsius LINDROTH manu. Si forte quaeras, cur iconem *Fringillae flavirostris* addiderim, ideo factum scias, quod characterem erroneae speciei ex hac icone confecit olim H. à LINNE, ut optime monuit *Cel.* LINDROTH, et quia de illa ave hallucinentur omnes fere post LINNE Ornithologi. Ex visa itaque

icone

icone, quae errori ansam praebuit, et collatione cum *Fringillae Linariae* foemineo sexu facile judicabunt periti, num recte illam e numero specierum excluderim.

Doleo sane me non potuisse ad singulas Avium species tria illa, ut recentissima, sic et praestantissima opera citare, scil. J. LATHAM, *Synopsis of Birds*, BÜFFONS *Naturgeschichte der Vögel* durch OTTO et J. M. BECHSTEINS *Gemeinnützige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands*. Editio enim anglica primorum in Bibliotheca nostra desideratur, et germanica versio successive (1792 — 1798) prodit; sic etiam (1772 — 1793) versio operis Buffoniani, nec nisi sero nimis (1796) notus mihi fuit liber *Cel.* BECHSTEIN. Ex his itaque non nisi ad paucas solummodo species observationes afferre potui, nisi totum hunc ordinem retractare voluissem, quod tempus et aliae curae non permiserunt. In genere autem pauca tantum et praecipua attuli synonyma, ne prae-

ter

ter necessitatem libri moles et pretium incre-
cerent.

Alio loco, scilicet in Disertatione Academi-
ca a *praeclar.* I. SÖNNERBERG e cathedra de-
fensa, sub titulo: *Animadversiones in Classem*
Mammalium Linneanam, rationes dedi, cur in
distributione Ordinum hujus Classis a methodo
ill. à LINNE discefferim. Ceterum ad Societa-
tem Linneanam Londinensem Tractatiunculam
misi, in qua rationes novorum Ordinum in Classe
Piscium breviter exposui; illas itaque hic repetere
superfluum credidi.
Ut errores, quos invenies, amice corrigas,
et defectus benevole suppleas, meisque conatibus
faveas ac benigne judices, opto.

MAMMALIA SVECIAE.

MAMMALIA SVECIAE

1. *Primates.*

Homo sapiens.

2. *Noctivora.*

1. Vespertilio murinus.

2. — — auritus.

3. — — Noctula.

4. — — Barbastellus.

5. — — Pipistrellus.

3. *Feræ.*

6. Phoca virulina.

7. Canis familiaris.

8. — Lupus.

9. — Vulpes.

10. — Lagopus.

11. Felis Catus.

12. — Lynx.

13. Mustela Lutra.

14. — Lutreola.

15. — Martes.

16. — Foina.

17. — Putorius.

18. — Ermineæ.

19. — vulgaris.

20. Mustela nivalis.

21. Ursus Arctos.

22. Gulo borealis.

23. Meles Taxus.

4. *Feræ.*

24. Sus Scrofa.

25. Erinaceus Europæus.

26. Sorex Araneus.

27. — fodina.

28. Talpa Europæa.

5. *Glires.*

29. Lepus timidus.

30. — Cuniculus.

31. Castor Fiber.

32. Mus Decumanus.

33. — Rattus.

34. — Musculus.

35. — sylvaticus.

36. — amphibius.

37. — paludosus.

38. — gregarius.

39. — Lemmus.

40. Myoxus muscardinus.

A 2

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 41. <i>Sciurus vulgaris.</i> | 7. <i>Imenta.</i> |
| 42. — <i>volans.</i> | 51. <i>Equus Caballus.</i> |
| 43. — <i>striatus.</i> | 9. <i>Belluae.</i> |
| 6. <i>Pecora.</i> | 52. <i>Trichechus Rosmarus.</i> |
| 47. <i>Cervus Alces.</i> | 10. <i>Cete.</i> |
| 44. — <i>Elaphus.</i> | 53. <i>Monodon Monoceros.</i> |
| 45. — <i>Tarandus.</i> | 54. <i>Balaena Mysticetus.</i> |
| 46. — <i>Dama.</i> | 55. — <i>Phyalus.</i> |
| 47. — <i>Capreolus.</i> | 56. <i>Physeter macrocephalus.</i> |
| 48. <i>Capra Hircus.</i> | 57. <i>Delphinus Phocena.</i> |
| 49. <i>Ovis Aries.</i> | 58. — <i>Orca.</i> |
| 50. <i>Bos Taurus.</i> | |

I.
M A M M A L I A.

1. PRIMATES.

H O M O.

Homo sapiens, Naturae Regnorum Tyrannus.

Lappones corpore parvo, capillis brevibus nigris rectis et iridibus oculorum nigricantibus, singularem esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam, nullum videtur dubium. *Sueciae* autem et *Gothiae* incolae distingui non possunt, et si conjecturae sit locus, crediderim *Lappones* olim per totam *Sueciam* dispersos unicos fuisse incolas, donec *Odinus* cum suis *Scythis* regionem ingressus mixtam ex his progeniem effecerit, dein plurimis nationibus millies remixtam. *Fennones* forte *Slavis* *Tatarisque* originem debent.

2. NOCTICOLAE.

VESPERTILIO.

Dentes omnes erecti, acuminati, approximati, numero in speciebus inaequali.

Manus palmatae volitantes, membrana corpus cingente.

1. *VESPERTILIO murinus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus operculo lanceolato.

- V. murinus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. L. S. N. XII, T. I. p. 47. Fn. Su. 2.
- V. murinus*, naso oreque simplici, auriculis longitudine capitis. Erxl. Syst. p. 143.
- V. major*, murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis simplicibus. Beiff. Quadr. p. 158.
- V. murinus*, auriculis longitudine capitis. Bodd. El. I. p. 69.
- Common Bat, Penn. Britt. Zool. I. p. 148. Hist. Quadr. 2. p. 362. Arct. Zool. I. p. 103.
- Chauve Souris, Buff. H. N. VIII. p. 113. t. 16.
- V. murinus*. Schreb. Säugth. I. p. 165. t. 51.
- Suecis Läderlapp, Fladermus. Smolandis Nattblacka. Scanis pleh. Flagermus. Fensis Nahka - Süpi, Yötipakka.
- Habitat in cavis arborum, murorum ruinis etc. Insectis, lardo aliisque pinguibus victitans.
- Obs. Incertum omnino est, ad quam speciem pertineat descriptio in Fn. Su. l. c. data. In Vespertilione foemina IV mammas pectorales observavit Exper. Florman, ut speciem determinare praetermisit.
2. *VESPERTILIO auritus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite majoribus, operculis lanceolatis basi exteriore reflexo.
- V. auritus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite majoribus. L. S. N. XII. T. I. p. 47. Fn. Su. 3. Erxl. Syst. p. 141.
- V. minor*, murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus. Briff. Quadr. p. 160.
- V. auritus*, auriculis capite majoribus. Bodd. El. I. p. 69. Schreb. Säugth. I. p. 163. t. 50.
- Habitat in cavis arborum etc. at rarior.

3. *VESPERTILIO Noctula*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus, rotundatis, extus basi plicatis, operculo parvo semiorbiculari marginali.
- V. Noctula*, naso oreque simplici, auriculis capite brevioribus, corpore cano. Erxl. Syst. p. 146. Schreb. Säugth. I. p. 166. t. 52.
- Noctule Bat. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 559.
- Great Bat. Penn. Britt. Zool. I. p. 146. t. 13. f. 38.
- Noctule. Buff. H. N. VIII. p. 128. t. 18. f. 1.
- Habitat in Scania sat frequens.
- Corpus cinereo - canum, in aliis nigrescens. Artus nigri. Facies et Aures atrae. Verrucam sub mento haud observavi.
4. *VESPERTILIO Barbastellus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis magnitudine capitis supra frontem coeuntibus: exteriori latere lobo semiorbiculari auctis, operculo interno lanceolato.
- V. Barbastellus*, buccis barbatis, auriculis longioribus frontem tegentibus. Erxl. Syst. p. 148. Schreb. Säugth. I. p. 168. t. 55.
- Barbastelle. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 561. Buff. H. N. VIII. p. 130. t. 19. f. 1.
- Habitat in Scania haud rarus.
- Magnitudo *V. murini*, niger ore albido. Auriculas supra frontem coeunt, in latere exteriori lobo semiorbiculari insinuuntur et dein in genus descendunt, unde facies lata et buccae barbatae apparent.
6. *VESPERTILIO Pipistrellus*, caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus subrotundis sinuatis, operculo elliptico fornicato.
- V. Pipistrellus*, naso oreque simplici, auriculis longitudine capitis, corpore subtus nigricante. Erxl. Syst. p. 148. Schreb. Säugth. I. p. 167. t. 54.

Pipistrelle Bat. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 561.

Pipistrelle. Buff. H. N. VIII. p. 129. t. 19. f. 2.

Habitat in Scania.

Nosfer supra niger, subtus cinereus ac major figura Buffoni et Schreberi, murino haud cedens.

3. F E R A E.

P H O C A.

Dentes Primor. superiores paralleli VI—IV. exteriores majores.

inferiores paralleli IV—II. distincti, omnes compressi, incurvati, acuti.

Canina solitarii, conici, utriusque maxillae.

Intermedii solitarii utriusque maxillae.

Maxillares in utraque maxilla IV—V. ferini, distantes, subtricuspidati.*

Auricularae nullae in nostris.

Pedes postici coaliti.

6. *Phoca vitulina*, capite laevi inauriculato. L. S. N. XII. T. I. p. 56.

Ph. vitulina, dentibus caninis tectis. Fa. Su. 4.

Ph. vitulina, capite laevi inauriculato, corpore fusco. Erxl. Syst. p. 583. Bodd. El. I. p. 171.

Phoca l. *Vitulus marinus*, Brill. Quadr. p. 162.

Sueci Sjal, Sjalhund, Sjokalf. Fennis Hylje.

a. *Phoca*

* Dentium primorum numerus in speciebus diversus. Sic secundum Fabricium Phocae Ursinae IV. utriusque maxillae. Plures species VI. superiores, IV inferiores habent, aliae vero IV. superiores, II inferiores. Dentes canini in Phocis breviores sunt quam in genere Canis, Felis, Ursi etc. Nec maxillares in omni specie tricuspidati, in variis vix vestigia cuspidum, in universum autem ex toto Ferae ordine minimos, simplicissimos et remotissimos habet Dentes maxillares Phocae genus, quantum ego novi.

a. *Phoca flavescens*, maculis majoribus rariotibus.

Ph. barbata, pedibus anticis manus hominis referentibus, pollice brevior, vibrissis longis albis integris, apice curvis. Fabr. Fa. Groenl. p. 9.

Great Seal. Penn. Arct. Zool. I. p. 159. Britt. Zool. I. p. 156. Hist. Quad. I. p. 524?

Remnesal. Fabr. Nat. Hist. Selk. Skrift. I. 2. p. 139.

Gråhul Odman N. A. Suec. 1784. p. 83.

Der graue Seehund. Schreb. Säugth. 3. p. 309.

Habitat in mari, in aqua dormiens erecta, nunquam in terra.

β. *Phoca argentea*, immaculata?

Ståthul. Odman l. cit. p. 84.

Swinfal. *Phoca porcina*. Fabr. l. c. p. 165. t. 13. f. 4.

Der Sibirische Seehund. Schreb. Säugth. 3. p. 310.

Habitat in mari. Mores praecedentis, sed timidior.

γ. *Phoca foetida*, capite laevi, naso brevi, corpore fere elliptico, vibrissis undulatis: medulla lucida. Fabr. Fa. Groenl. 8.

Ph. hispida, capite laevi inauriculato, corpore pallide fusco, pilis surrectis hispido. Erxl. Syst. p. 589. Bodd. El. I. p. 171.

Rough Seal. Penn. Arct. Zool. I. p. 160. Hist. Quadr. 2. p. 524.

Der rauhe Seehund. Schreb. Säugth. 3. p. 312. t. 86. figura nimis elongata.

Grå Wikare Stål. Odman l. c. p. 85.

Fjord Sal. Fabric. l. c. I. 2. p. 74.

Habitat in mari juxta littora, in rupibus vel glacie littorum dormiens.

δ. *Phoca vitulina*, capite laevi, vertice retusiusculo, naso mediocri, corpore subcylindrico, vibrissis

lis undulatis: medulla concolore. Fabr. Fa. Groenl. 6.

Phoca Landselear. Olaf. et Powell. it. Island. I. p. 529. t. 32.

Common Seal. Penn. Britt. Zool. I. p. 137. t. 12. Arct. Zool. I. p. 151. Hist. Quadr. 2. p. 513.

Phoque. Buff. H. N. XIII. p. 335. t. 45.

Ph. vitulina. Schreb. Sæugth. 3. p. 305. t. 84.

Swart Wikare Skil. Ödman l. cit.

Steenhobbe. Rossed N. Act. Nidrol. 2. p. 185.

Spragled Sal. Fabric. l. c. I. 2. p. 98.

Habitat in iisdem locis ac præcedens. Hujus pullus est *Morange* Ödman l. cit.

Piscatores et Phocarum Venatores Maris Balthici maris *Algar*, speminas *Laggar*, juniores *Kutor* vel *Kutor* et pullos *Själtohar* vocant.

Nullus dubito, quin hæc totidem sint diversæ species, at illas determinare non audeo. Dentium numerus in diversis speciebus non tantum sæpe diversus, verum quoque forma, ut ex quinque Craniis diversarum specierum in Museo proprio asservatis patet. Color forte speciebus proprius et macularum situs, at non nisi in adultis. Pedum et digitorum forma, forte et medulla mystacum, uti Rev. Fabricio placet, observanda. Numne series Vibrillarum et numerus in quacunque serie constantes notas darent?

Norvegorum *Steenhobbe.* Caput breve. Setae V in circulo supra utrumque oculum positæ. Vibrissæ undulatae utrinque VII ordinum. Lingua acuta. Digiti manuum decrescentes, interiores vix filii: plantarum etiam decrescentes, medii membrana connexi. Color obscure cinereus maculis nigris elongatis longitudinalibus; abdomen pallidius vix maculatum. Rossed l. c.

CANIS.

CANIS.

Dentes Primor. superiores VI laterales longiores, distantes, reliqui sublobati.
inferiores VI lateralibus lobatis.

Canini solitarii, incurvati.

Intermedii solitarii utriusque maxillæ.

Maxillares superiores V. tribus ferinis, duobus interioribus molatibus transversis.
inferiores VI. quinque ferinis, sexto spurio.

7. *CANIS familiaris*, cauda sinistrorsum recurva. L.S.N. XII. T. I. p. 56. Fa. Su. 5. Amoen. Acad. IV. p. 43. Bodd. El. I. p. 95. Erxl. Syst. p. 531. Schreb. Sæugth. 3. p. 313.

C. Domesticus. Britt. Quadr. 170.

Faithfull Dog. Penn. Britt. Zool. I. p. 59. Hist. Quadr. I. p. 219.

Chien. Buff. H. N. V. p. 185.

Suecis Hund. Foem. Hynda, Tik. *Fennis Koira.*

a. *domesticus*, auriculis erectis, cauda subtus lanata. Linn. l. c. a.

Shepherd's Dog. Penn. Hist. Quadr. I. p. 222.

Chien de Berger. Buff. l. c. p. 241. t. 28.

Suecis Hushund, Bondhund.

β. *pommeranus*, auriculis erectis, capite nasoque villosis.

Pommerian Dog. Penn. l. c. p. 223.

Chien loup. Buff. l. c. t. 29.

Suecis Schäfferhund, Fårhund.

γ. *sibiricus*, auriculis erectis, totus etiam capite longipilis.

Siberian Dog. Penn. l. c. p. 225.

Chien de Sibirie. Buff. l. c. t. 30.

Suecis Fix.

1. *islandus*, auriculis erectis apice pendulis.
C. familiaris, cauda recurvata subtus lanata, auriculis erectis. Fabr. Fn. Groenl. p. 18.
Finar Hundar. Olaf. et Powell. it. Island. p. 57.
Chien d'Islande. Buff. l. c. t. 51.
 Suecis Isländsk Hund.
2. *aquaticus*, pilo crispo longo instar ovis. Linn. l. c.
Water-Dog. Penn. l. c. p. 224.
Grand et petit Barbet. Buff. l. c. t. 57. 58. f. 2.
Der Budel und Zwerghudel. Schreb. Säugth. 3. p. 320.
 Suecis Wattahund, Pudelhund.
3. *Pyramus*, auribus, pectore, cauda et pedibus pilice longipilis.
a. Gredin. Buff. l. c. t. 59. f. 1.
King Charles's Hound. Penn. l. c. p. 224.
β. Pyrame. Buff. l. c. t. 59. f. 2. Penn. l. c. p. 225.
 Macula fulva supra oculos distinctus.
 Suecis Knähund.
4. *extrarius*, auriculis longis lanatis dependentibus.
Epagneul. Buff. l. c. t. 58. f. 1.
 Suecis Spanior, Spanak Hund.
5. *melitaeus*, magnitudine Sciuri Linn. l. c. undique longissime pilosus.
Bichon. Buff. l. c. t. 40. f. 1.
 Suecis Angorisk Hund.
6. *leoninus* capite, pectore, cauda et pedibus longe pilosis.
Shock. Penn. l. c. p. 225.
Chien Lion. Buff. l. c. t. 40. f. 2.
7. *Histrion*, nigro-coerulescentique varius.
Petit Danois. Buff. l. c. t. 41. f. 1.
 Suecis Harlequin.

λ. *Fri-*

- λ. *Fricator*, naso refimo, auribus pendulis, corpore quadrato. Linn. l. c.
Pug-Dog. Penn. l. c. p. 227. β
Doguin. Buff. l. c. t. 44.
 Suecis Mops, Moppe.
a. capite nigro, abdomine tenui.
Bastard Pug. Penn. l. c. p. 227. δ
Roquet. Buff. l. c. t. 41. f. 2.
 Suecis Engelsk Mops.
- μ. *Molossus*, magnitudine Lupi, labiis ad latera pendulis, corpore teroso.
a. Bull Dog. Penn. l. c. p. 226. *
Dogue. Buff. l. c. t. 45.
 Suecis Blodhund.
β. Mastif. Penn. l. c. p. 226. δ
Dogue de forte race. Buff. l. c. t. 45.
 Suecis Engelsk Dogg.
- ν. *sagax*, auriculis magnis pendulis, digito spurio ad tibias posicis. Linn. l. c.
a. niger, pedibus et macula supra utrumque oculum fulvis.
 Suecis Stöfware.
β. ferrugineus, fuscus, griseus etc.
 Suecis Jagthund.
- ζ. *Avicularius*, naso obtuso fisso, cauda truncata.
Braque. Buff. l. c. t. 53. 54.
 Suecis Fogelhund, Hönshund, Rapphönshund.
- η. *Grajus* trunco curvato, rostro acuto. Linn. l. c.
Common Grayhound. Penn. l. c. p. 225.
Lewrier et Leuron. Buff. l. c. t. 27 et 24.
 Suecis Windhund.
- θ. *Vertagus*, pedibus brevibus (curvatis) trunco longo.
Turnspit. Penn. l. c. p. 224.

Basset.

Basset. Buff. l. c. t. 35.

Suecis Tax, Taxhund, Hanse.

f. *Aegyptius*, nudus, fere epilis. Linn. l. c.

Naked Dog. Penn. l. c.

Chien-Turc. Buff. l. c. t. 42. f. 1.

Suecis Naken Hund.

Hospitatur ubique in domibus et castris.

Mihi distincta videtur et propria species, nec a Lupo, nec Vulpe l. Cane aureo orta, licet cum his nunquam prolem generet fertilem. *Molossus* vidi digitis semipalmatis, plures autem non examinavi.

g. *CANIS Lupus*, cauda incurvata. L. S. N. XII. T. I. p. 58. Fn. Su. 6. Eral. Syst. p. 556. Schreb. Säugth. 3. p. 346. t. 88.

C. Lupus, cauda incurvata, oculis obliquis. Bodd. El. 1. p. 95.

Lupus vulgaris. Canis ex griseo flavescens. Briff. Quadr. p. 170.

Wolf. Penn. Britt. Zool. 1. p. 75. t. 5. Arct. Zool. 1. p. 38. Hist. Quadr. 1. p. 231.

Loup. Buff. H. N. VII. p. 39. t. 1.

Suecis Warg, Ulf; quibusdam locis Gräben. Fennis Sufi.

Habitat in sylvis.

Lupos ante 1730 in Suecia rariore fuisse contendit à LINNÆ.

9. *CANIS Vulpes*, auriculis acutis, cauda recta apice albo.

C. Vulpes, cauda recta apice albo. L. S. N. XII. T. 1. p. 59. Schreb. Säugth. 3. p. 354. t. 90.

C. Vulpes, cauda recta apice albo vel nigro. Bodd. El. 1. p. 96.

Vulpes vulgaris. Canis fulvus pilis cinereis intermixtis. Briff. Quadr. p. 178.

Fox.

Fox. Britt. Zool. 1. p. 71. Arct. Zool. 1. p. 45. Hist. Quadr. 1. p. 234.

Renard. Buff. H. N. VII. p. 75. t. 6.

Suecis Räf. Fennis. Kettu, Ropo.

β. *Vulpes crucigera.* Canis fulvus crucem nigram in dorso gerens. Briff. Quadr. p. 173.

Suecis Korsräf.

γ. *Alopex*, cauda recta apice nigro. L. S. N. XII. T. I. p. 59. Schreb. Säugth. 3. p. 358. t. 91.

C. Vulpes, ferrugineus. Fn. Su. 7. γ

Suecis Brandräf.]

Habitat in sylvis ubique. β et γ vix in inferiore Suecia.

Obs. *Canis Lycæon* Schreb. in Suecia vix visus; *Vulpes nigræ Schefferi* enim ad sequentem speciem pertinent. *The Cross Fox* Penn. Arct. Zool. I. p. 46. abdomine nigro describitur, quod in nostro Korsräf observatum non vidi, nec ejus *Brandräf* l. c. p. 47. ex Pennsylvania adductus cum nostro convenit. Ceterum attentius examen meretur *Canis Alopex* Linn. quamvis varii, et inter hos Rev. D. ÖDMAN Brand- et Korsräf nil nisi varietates esse Vulpis.

10. *CANIS Lagopus*, auriculis brevibus rotundatis, cauda recta apice concolore, pedibus subtus densissime lanatis.

C. Lagopus, cauda recta apice concolore. L. S. N. XII. T. I. p. 59. Fn. Su. 8. Schreb. Säugth. 3. p. 362.

C. Lagopus, cauda recta, palmis plantisque pilosissimis. Eral. Syst. p. 568. Bodd. El. I. p. 97.

Vulpes alba. Canis hieme albus, aestate ex cinereo coerulescens (falso). Briff. Quadr. p. 174.

Isatis. Gmelin. N. Comm. Petrop. V. p. 368.

Arctic Fox. Penn. Hist. Quadr. I. p. 238. t. 29. f. 1. Arct. Zool. I. p. 42.

Field

- Field Raven*. Fabricius N. Act. S. Scient. Hafn. 3.
p. 423. c. fig.
Suecis Fiallracka.
α. totus albus. Schreb. l. c. t. 93.
Suecis Hwit Räf.
β. totus cinereo - coeruleus. Schreb. l. c. t. 93.
Suecis Blå Räf.
γ. niger. *Fulpeculae nigrae*. Scheff. Lapp. illustr. p.
540.
Suecis Swart Räf.

Habitat in alpihus Lapponicis, victitans Mure Lemmo, Avibus, Testaceis, etiam baccis Empetri. Ao. 1758. quatuor hujus speciei alba specimen in Bahusia globo occisa. KALM in Bahus. p. 236. et Ao. 1786. d. 27. Octobr. aliud prope Lund in Scania. Ao. 1790. iterum tria specimen in Scania visa sunt.

Obs. Varietas β paulo minor, et γ hujus varietas. Etiam catuli β nigrescunt. Fabricius.

FELIS.

- Dentes Primor*. VI. aequales, superiores intus excavati.
Canini solitarii longitudinaliter fulcati.
Intermedia solitarii superioris maxillae.
Maxillares superiores III. duobus ferinis, tertio minuto oblique transverso.
inferiores III. ferini.
Lingua retrosum aculeata.
Ungues retractiles.
11. *FELIS Catus*, cauda elongata fusco-annulata, corpore fasciis nigricantibus: dorsalibus longitudinalibus tribus, lateralibus spiralibus. L. S. N. XII. T. I. p. 62. Fn. Su. 9. Erxl. Syst. p. 518. Bodd. El. I. p. 92. Schreb. Säugth. 3. p. 397. t. 107. B. f. 1.
F. domestica. Briss. Quadr. p. 19.

Dome-

- Domestic Cat*. Penn. Britt. Zool. I. p. 82.
Common Cat. Penn. Hist. Quadr. I. p. 274.
Suecis Katt, foem. Katta. Fennis Kiffa.
α. colore supra descripto, quo cum sero convenit.
Suecis Grå Katt.
β. fusco - cinereus; unicolor.
Blue Cat. Penn. Hist. Quadr. I. c. p. 276.
Chat des Chartreux. Buff. H. N. VI. t. 4.
Suecis Blå Katt, Cartheuser Katt.
γ. niger, unicolor.
Suecis Swart Katt, Genottkatt.
δ. maculatus ex fulvo, nigro et albo.
Tortoiseshell Cat. Penn. l. c. p. 276.
Chat d'Espagne. Buff. H. N. VI. t. 3.
Suecis Spansk Katt.

Hospitantur hae praecipuae varietates cum aliis unicoloribus albis et varie maculatis in domibus cicures.

Pellis *Genot* dicta a varietate nigra γ. desumitur.

Ao. 1760. in Sältsvitzborg vidi binas Feles juniores pedibus pollicis solito longioribus Cuniculi modo saltus facientes, quarum possessor eas ex Cuniculo mare et Fele foemina natas esse pro certo affirmabat. Singularem non nihil faciem praese se ferebant, at forte mera monstrifitas.

12. *FELIS Lynx*, cauda abbreviata, apice atra, auriculis apice barbatis. L. S. N. XII. T. I. p. 62. Schreb. Säugth. 3. p. 408. t. 109.
F. Lynx, cauda abbreviata, apice atra, auriculis apice barbatis, corpore maculato. Erxl. Syst. p. 525. Bodd. El. I. p. 91.
Felis auricularum apicibus pilis longissimis praeditis, cauda brevi. Briss. Quadr. p. 200.
Lynx. Penn. Hist. Quadr. I. p. 279. Arct. Zool. I. p. 50.

B

Lynx

Lynx ou *Loap Cervier*. Buff. H. N. IX. p. 251. t. 21.
Suecis Læ, Löödjur. *Wermelanilla* Gäpe, Göpe. *Fennis* Ilves.

- α. corpore rufescente maculis pallidis. Fn. Su. 10.
Suecis Warglo.
 β. corpore albido maculis nigris. Fn. Su. II.
Suecis Kattlo.

Habitat in densis superioris Sueciae sylvis.

Non solum colore sed etiam magnitudine differunt α et β, quas aptius distinxit, quam demum conjunxit à Linnæ. Ego diversas species puto, at notas specificas ex scriptoribus tuto eruere haud potui. De *Raslo* etiam loquuntur Venatores, quemque ex griseo et nigro fasciatum describunt. Forte huc pertinet fig. *Schreberi* cit.

M U S T E L A.

Dentes Primores VI utrinque, altitudine subaequales*) inferiorum II. situ interiores.

Canini conici l. subulati, incurvati.

Intermedii solitarii utriusque maxillae.

Maxillares superiores III — IV. quorum α l. 3. ferini, intimus molaris transversus, inferiores IV — V. quorum 3. l. 4. ferini intimo molari spurio.

Ungues haud retractiles.

13. *MUSTELA Lutra*, plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio brevior. L. S. N. XII. T. I. p. 66. Schreb. Säugth. 3. p. 457. t. 126. A.

Fiverria

*) Quo caractere *Mustelae* a *Fiverria* distinguuntur, fatetur me nescire, nisi forte natus in his magis productus, praesentia folliculi putorii et situs densus molaris intimi in superiore maxilla quid valeant. Lingua sculeata et numerus dentium maxillarum certe haud sufficient, multo minus situs dentium primorum in inferiore maxilla.

Fiverria Lutra, plantis palmatis nudis, cauda corpore brevior. Fn. Su. 12.

Lutra vulgaris, plantis nudis, cauda corpore brevior. Erxl. Syst. p. 448.

Lutra Lutra, plantis nudis, cauda corpore dimidio brevior. Bodd. El. I. p. 167.

Lutra, castanei coloris. Brill. Quadr. p. 202.

Otter. Penn. Brit. Zool. I. p. 92. t. 3. f. 19.

Common Otter, ejusd. Arct. Zool. I. p. 86.

Greater Otter, ejusd. Hist. Quadr. 2. p. 351.

Loutre. Buff. H. N. VII. p. 154. t. 11. XIII. p. 323. t. 45.

Suecis Utter, *Otter*.

Habitat in stagnis, piscinis, fluviis passim. Cicurata piscari discit. Act. R. Ac. Scient. Suec.

Obs. Lutræ in mari circa Kosteröe maris occidentalis insulam prope Strömstad copiose inveniri refert *Kalm It. Westrog.* p. 84. Aquae salae itaque etiam incolae, nisi quod vix crediderim *Lutra marina* vel *Musela Lutris* Linn. sit.

14. *MUSTELA Lutreola*, pedibus semipalmatis hirsutis, ore mandibulaque inferiore albis.

M. Lutreola, plantis palmatis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo. L. S. N. XII. T. I. p. 66. Schreb. Säugth. 3. p. 462. t. 127.

Fiverria Lutreola, ore albo, plantis palmatis hirsutis, digitis subaequalibus. Fn. Su. 13. Pallas Spic. Zool. XII. p. 42. t. 3. f. 1.

Lutra minor, plantis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo. Erxl. Syst. p. 451. Bodd. El. I. p. 167.

Mink. Penn. Arct. Zool. I. p. 87.

Lesser Otter. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 354. t. 38.

Tubcuri. Leche: A. R. Ac. Sc. Su. 1759. p. 302. t. 11.

Suecis Mänck. *Fennis* Tubcuri, *Tihcuri*.

Habitat in Finlandiae aquosis, victitans piscibus, ranis, cancris.

Obs. Huic solus *Erleben* duplices dentes caninos tribuit altero graciliore. vide l. cit.

15. *MUSTELA Martes*, pedibus fissis, corpore fulvo-nigricante, gula flava. Erxl. Syst. p. 455. Bodd. El. I. p. 87.

M. Martes, pedibus fissis, corpore fulvo-nigricante, gula pallida. S. N. XII. T. 1. p. 67. Fa. Su. 15. Schreb. Säugth. 5. p. 475. t. 130.

Martes. Mustela pilis in exortu ex cinereo-albidis castaneo colore terminatis, vestita, guttore flavo. Briss. Quadr. p. 179.

Pine Martin. Penn. Britt. Zool. I. p. 94. Arct. Zool. I. p. 76. Hist. Quadr. 2. p. 521.

Marte. Buff. H. N. VII. p. 186. t. 22.

Suecis Mård, Furumård, Björkmård.

Habitat in sylvis, olim copiose in Lapponia. Schæfferus, p. 541.

Obs. Hanc ob oculos habuit *Gez. à Linne*, sequentem nomine tenus tantum cognovit.

16. *MUSTELA Foina*, pedibus fissis, corpore fulvo-nigricante, gula alba. Erxl. Syst. p. 458. Bodd. El. I. p. 88. Schreb. Säugth. 5. p. 472. t. 129.

Foina. Mustela pilis in exortu albidis castaneo colore terminatis, vestita, guttore albo. Briss. Quadr. p. 178.

Martin. Penn. Britt. Zool. I. p. 94. t. 6. f. 15. Hist. Quadr. 2. p. 520.

Foina. Buff. H. N. VII. p. 161. t. 18.

Suecis Mård, Bokmård, Alpmård.

Habitat in sylvis Scaniae, forte etiam Smolandiae.

17. *MUSTELA Putorius*, pedibus fissis, corpore flavo-nigricante, ore auricularisque albis. S. N. XII. T. I. p. 67. Fa. Su. 16. Schreb. Säugth. 5. p. 485. t. 131.

M. Putorius, flavo-nigricans, ore auricularumque apicibus albis. Erxl. Syst. p. 465.

M. illeis, flavo-nigricans, ore auricularumque apicibus albis. Bodd. El. I. p. 87.

Putorius. Mustela pilis in exortu ex cinereo-albidis colore nigricante terminatis, vestita, oris circumferentia alba. Briss. Quadr. p. 180.

Fischer. Penn. Britt. Zool. I. p. 89. t. 6. f. 14.

Putois. Buff. H. N. VII. p. 199. t. 23.

Suecis Iller, Hiller.

Habitat in Scania campestri vulgaris, alibi ut et in Smolandia rarior.

18. *MUSTELA Erminea*, pedibus fissis, corpore rufo-fusco, subtus albo, cauda subquinquepollicari dimidiato-nigra.

M. Erminea, pedibus fissis, caudae apice atro. S. N. XII. T. 1. p. 68. Fa. Su. 17. Schreb. Säugth. 5. p. 496. t. 137.

M. Erminea, auricularum marginibus albis, caudae apice nigro. Erxl. Syst. p. 474. Bodd. El. I. p. 88.

Ermineum. Mustela hieme alba, aestate supra rutila, infra alba, caudae apice atro. Briss. Quadr. p. 176.

Stout or Ermine. Penn. Britt. Zool. I. p. 89. t. 7.

f. 18. Hist. Quadr. 2. p. 514. Arct. Zool. I. p. 75.

Roselet. Hermine. Buff. H. N. VII. p. 240. t. 29.

Suecis Lekatt, Hermelin.

Habitat in locis subterraneis, imprimis vero intra lapidum acervos, per totam Sueciam vulgaris, copiosius vero in Norlandia et Lapponia.

Animal sequenti plus duplo majus. Caput, Collum, Dorsum et Latera ac Pedes extes rufo-fusca vel fusco-brun-

brunnea, subtus pallide sulphureum, quem colorem etiam gerunt plantae palmaeque; circum os vero color albus, qui ad aures usque ascendit. *Auriculae* truncatae margine albo. *Nasus* nigricans. *Mustaces* superioris labii nigrae, inferioris albae. *Caudae* exterior dimidia pars nigra, reliqua corpori concolor. *Collis* tres subglobosi sub quovis pede. *Scrotum* lat. magnum pilosum proxime sub ano. *Digiti* pilosi, hyeme densius, tumque totius animal praeter dimidiam caudam et nasum candidum. Longitudo ab apice rostri ad caudam XI. pollices, caudae V. poll.

19. *MUSTELA vulgaris*, pedibus fissis, corpore fusco-griseo, subtus et macula juxta utrumque oculum parva albis, cauda bipollicari tertia parte nigra.

M. Erminea. L. S. N. XII. T. I. p. 63. a. Fn. Su. p. 17. n.

M. vulgaris, corpore ex rufo-fusco subtus alba. Erxl. Syst. p. 471. Schreb. Säugth. 3. p. 498. t. 138. nomine *M. nivalis*.

M. vulgaris, supra rutila, infra alba. Brill. Quadr. p. 175.

Common Weasel. Penn. Britt. Zool. I. p. 95. t. 7. f. 17. Hist. Quadr. 2. p. 315. Arct. Zool. I. p. 75.

Belette. Buff. H. N. VII. p. 225. t. 29.

Suec. Westla.

Habitat in iisdem locis ac praecedens, haud raro ad domos et pagos. Ob summam pernicitatem difficillime capitur.

Longitudo ab apice rostri ad caudam VII. poll. caudae II. poll. *Rostri* apex niger. *Supra* tota et pedibus extus fusco-grisea, nonnunquam in rufum vergens. *Subtus* tota alba, quae albedo etiam in labio superiore et ad aures usque ascendit. Ad canthum oculi internum macula parva alba. *Digiti* albido-pilosi. *Auriculae* postice

postice duplicatae. Apud nos caudae tertia pars semper nigra, dum animalculum sub hyeme totum praeterea candidum. In cranio adultioris speciminis *Dentes canini superiores* utrinque bini, in alio junioris etiam duo, at secundus multo brevior. An haec diversitas ab aetate vel sexu? an monstrositas tantum in his speciminibus? Ex duobus tantum inspectis pro certo, nihil determinare audeo.

20. *MUSTELA nivalis*, pedibus fissis, corpore fusco-cinereo subtus albo, cauda truncata sesquipollicari, unicolore.

M. nivalis, pedibus fissis, corpore albo, caudae apice vix pilis ullis nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 69. Fn. Su. 18. Erxl. Syst. p. 477.

Snoemur, Hellenius: N. A. R. Ac. Sc. Suec. 1785. p. 212. t. 3.

Suec. Snoemus. *Fenn. Nirpa*, *Lumikko*, *Lumitirka*.

Habitat in Westrobothnia et boreali Fennia, etiam in Norwegia.

Descriptionem I. cit. dedit *Cel. HELLENIUS*.

Cauda raro in apice nonnullos gerit pilos nigros sparsos. *Color* his tribus speciebus ceterum diversus, verno tempore fusco-cinereus, aestate nonnihil in rufum vergit, hyeme albus evadit.

U R S U S.

Dentes Primores superiores VI. intus excavati.

inferiores VI. exteriores bilobi, medii

intus marginati.

Canini solitarii, conici.

Intermedii superiores remoti, obtusi.

inferiores solitarii, obtusi.

Maxillares superiores III. molares, paralleli,
inferiores IV. primo ferino, III. mo-
laribus.

21. *Ursus Arctos*, corpore unicolore nigrescente.
U. Arctos, cauda abrupta. L. S. N. XII, T. I. p. 69.
Fu. Su. 29.
U. Arctos, fulco nigricans, cauda abrupta. Erxl. Syst.
p. 156.
U. Arctos, auriculis brevioribus rotundis, collo brevi.
Bodd. El. I. p. 79.
U. niger, cauda unicolore. Brill. Quadr. p. 187.
Succis Bioern.

a. *Ursus niger*.
Black Bear. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 235. Arct.
Zool. I. p. 57.

Ursus Arctos niger. Schreb. Säugth. 3. p. 502.
t. 140.

Succis Myrbioern, Ientis Myrtus.

β. *Ursus fuscus*.
Brown Bear. Penn. Arct. Zool. I. p. 61.

Ours brun. Buff. H. N. VIII. p. 240. t. 31.

Ursus Arctos fuscus. Schreb. Säugth. 3. p. 502.
t. 139.

Succis Slagbioern.

Habitat in vastissimis densissimisque Succiae borealis,
Ostrobothniae et Finlandiae sylvis.

Obs. Specie diversos esse verosimillimum est. Sus-
dent magnitudo, color, victus, mores; at characteres
dare difficillimum.

GULO.

GULO.

Dentes Primores superiores VI. intus excavati, exte-
rioribus uni-, mediis bi-lobatis.
inferiores VI. lateralibus bilobis: 2. 2.
sita interiores.

Canini solitarii, conici, latus angulosi.

Intermedia solitarii utrinque.

Maxillares superiores III. ferini, I. molari trans-
verso.

inferiores IV. ferini, I. molari spurio.

22. *Gulo borealis*. Pallas Spicil. XIV. p. 25. t. 2.

Mustela Gulo, pedibus filis, corpore rufo-fusco, me-
dio dorii nigro. L. S. N. XII, T. I. p. 67. Fu.
Su. 29. Erxl. Syst. p. 477.

Ursus Gulo. Schreb. Säugth. 3. p. 525. t. 144. bis.

Meles Gulo, rostro conico obtuso, corpore macilento,
ephippico aterrimo. Bodd. El. I. p. 81.

Glutton. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 295.

Wolverene. Penn. Arct. Zool. I. p. 66.

Glutton. Buff. H. N. Suppl. 3. p. 240. t. 48.

Järf. Filfrat. Genberg: A. B. Sc. Su. 1775. p. 215.
t. 7. 8. Lindwall ibid. p. 222.

Järven, Gunner: Act. Nidrol. 5. p. 143. t. 3. f. 5. 6.

Succis Järf, Filfrat.

Habitat in borealia Sueciae, Lapponiae, Ostrobothniae
sylvis montosis. Castoris hostis, quem Castoreo ex-
cepto totum devorat.

Obs. Mustelis re vera quam Urso propior, nec cum
Mele in uno genere bene jungitur. Singularis rugositas
dentium.

MELES.

M. E. L. E. S.

Dentes Primores superiores VI. intus excavati.

inferiores VI. integri.

Canini solitarii, conici.

Intermedii superiores nulli.

inferiores solitarii, minuti, occultati.

Maxillares superiores II. ferini, II. molares:

primo subtrigono intimo quadrato, maximo.

inferiores III. ferini, II. molares, intimo spurio.

23. *MILES TAXUS*, corpore supra cinereo, abdomine fasciisque per oculos et aures nigris, cauda brevi unicolore.

Ursus Meles, cauda concolore, corpore supra cinereo subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra. L. S. N. XII. T. I. p. 70. Fn. Su. 20. Erxl. Syst. p. 161. Schreb. Säugth. T. 3. p. 516. t. 142.

M. Taxus, cauda concolore, abdomine fasciisque oculari nigris. Bodd. El. I. p. 80.

Meles, pilis ex sordido albo et nigro variegatis, vestita, capite taeniis alternatim albis et nigris variegato. Briss. Quadr. p. 183.

Common Badger. Penn. Britt. Zool. I. p. 85. t. 8. f. 13. Hist. Quadr. 2. p. 297. Arct. Zool. I. p. 71.

Blaiseau. Buff. H. N. VII. p. 194. t. 7. 8.

Succis Gräfwün, Grälling, Gräfwing, Tax.

Habitat in sylvis umbrosis, depressis, lapidosis sub terra minus frequens.

Obs. Intestinum caecum nullum. P. C. ARILDGAARD.

BEIJER

4. FOSSORES.

S U S.

Dentes Primores, superiores VI. distantes, medii convergentes, proximi compressi serrulati, laterales oblique truncati, porrecti. *)

inferiores VI. prominentes, quorum IV. medii longiores intus bifurcati.

Canini solitarii, triquetri, exserti, recurvi.

Intermedii nulli.

Maxillares superiores II. ferini V. molares.

inferiores III. ferini, III. molares.

24. *Sus Scrofa*, dorso antice setoso, cauda pilosa. L. S. N. XII. T. I. p. 102. Fn. Su. 21. Am. Acad. V. p. 461. Erxl. Syst. p. 176. Schreb. Säugth. . .

S. setosus, dorso antice setoso, cauda pilosa. Bodd. El. I. p. 157.

S. domesticus caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa. Briss. Quadr. p. 74.

Common Hog. Penn. Britt. Zool. I. p. 54. Hist. Quadr. I. p. 126.

Cochon. Ferrut. Buff. H. N. V. p. 99. t. 16.

β. chinensis.

S. Sinesis caudatus, ventre ad terram usque pendente, cauda pilosa. Briss. Quadr. p. 75.

Chinese Hog. Penn. Hist. Quadr. I. p. 125. γ.

Chinesiska Swin. It. Scan. 72. It. Westr. . .

γ. pedibus moungulis.

Succis

*) Ad caninos refert Ges. & LINNÆ ultimos hos, sed situs eorum in ossibus intermaxillaribus quo minus illum sequar, verat. In *S. Babyrussa* IV. tantum D. primor. superiores et inferiores haud fulent.

Sueci Swin; *ma* Fargalt, *Scanis* Orne; *castratus* Galt; *foemina* Sugga, *Scanis* So; *castrata* Gylta; *Pullus* Gris.

Habitatur culta ubique species, *chinesis* varietas jam rarior et *mongolica* varietas circa Upsaliam et in nonnullis Smolandiae locis. Varietas *sylvestris* antehac in Oelandia jussu R. Friderici I. plantata, nuper extirpata.

E R I N A C E U S.

Dentes Primores nulli.

Canini superiores II. subcylindrici, oblique intus truncati.

inferiores II. cylindrici, porrecti, truncati.

Intermedia superiores utroque latere IV. per paria approximati.

inferiores III. recumbentes.

Maxillares superiores V. molares, primo et ultimo minuto.

inferiores IV. molares, primo triquetro, ultimo spurio.

25. *Erinaceus europaeus* auriculis rotundatis, naribus cristatis. L. S. N. XII. p. 75. Fn. Sn. 22. Excl. Syst. p. 169. Schreb. Säugth. 3. p. 530. t. 162.

Jgelkott. It. Gothl. p. 264.

E. auriculis erectis. Brill. Quadr. p. 129.

E. europaeus auriculis rotundis, naribus cristatis. Bodd. El. I. p. 129.

Common Urchin. Penn. Britt. Zool. I. p. 135.

Common Hedge Hog. Penn. Hist. Quadr. I. p. 503. t. 48. f. III. Arct. Zool. I. p. 142.

Herisson. Buff. H. N. VIII. p. 28. t. 6.

Sueci Jgelkott, *Scanis* Pinnswinn, Piggswin.

Habitat

Habitat in Suecia rarior, vix in Norlandia, in Gothia vulgatiore, in Scania frequens. Hybernat.

S O R E X.

Dentes Primores superiores II. convergentes ligidi.
inferiores II. porrecti quadrifidi.

Canini nulli.

Intermedia superiores V. sensim minores.
inferiores solitarii.

Maxillares superiores IV. molares cuspidati.
inferiores I. ferinus III. molaribus cuspidatis. *)

26. *Sorex Araneus*, cauda mediocri tereti, corpore subtus albedo. L. S. N. XII. T. I. p. 74. Excl. Syst. p. 125. Schreb. Säugth. 3. p. 575. t. 160.

S. Araneus, cauda corpore longiore. Fn. Sn. 24.

S. Araneus, cauda mediocri, corpore griseo-nigro, subtus albo. Bodd. El. I. p. 125.

Fetid Shrew. Penn. Britt. Zool. I. p. 125. Hist. Quadr. 2. p. 479. Arct. Zool. I. p. 139.

Musaraignée. Buff. H. N. VIII. p. 57. t. 10. f. I.

Sueci Nabbmus.

Habitat in pratis, sylvis, hortis, fodinis.

27. *Sorex fodiens*, cauda mediocri subtetragona subtus alba canaliculata, corpore subtus albedo.

S. fodiens. Ödman N. A. R. Ac. Sc. Su. 1783. p. 312.

S. carinatus atro-cinereus, subtus albidus, incisivibus brunneis, macula retrò oculos albida, cauda attenuata subtus pilosa carinata. Bodd. El. I. p. 124.

S. Dae-

*) Difficillime numerantur ob parvitatem. Singulare quod in utraque specie desit arcus zygomaticus.

- S. Daubentonii*, cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus cinereo, digitis ciliatis. Erxl. Syst. p. 124.
- S. Daubentonii* atro-cinereus, cauda mediocri subnuda, digitis ciliatis. Bodd. El. I. p. 123.
- S. Tetragonurus*, atro-cinereus, subtus pallidior, cauda subquadrata, incisoribus brunnea. Bodd. El. I. p. 123.
- S. fodiens* rostro longiore, auriculis brevissimis, corpore supra nigro subtus cinereo, pedibus albis. Bodd. El. I. p. 124. Schreb. Säugth. 3. p. 571. t. 161.
- Carinated Shrew* et *Squaretailed Shrew*. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 482.
- Water Shrew*. Penn. Britt. Zool. I. p. 126. t. 11. f. 35. Hist. Quadr. 2. p. 480.
- Musaraignée d'eau*. Buff. H. N. VIII. p. 64. t. 11. f. 1.
- Suecis* Wattenäbbmus.

Habitat juxta aquas.

Obs. Nisi omnia jam allata synonyma ad speciem nostram pertinent, multum fallor.

Animal simillimum sp. 26. ab apice rostri ad caudae basim 5. poll. *Cauda* sesquipollicaris subtetragona, fere aequalis apice acuto, annulata, pilis brevibus rariusculis appressis tecta, supra nigrescens, subtus albida fulco longitudinaliter exarata, et dehinc pili versus margines versi. *Aures* truncatae, albae. *Color* dorsii niger, laterum et capitis murinus, gulae et abdominis fordide albidus, sub gula paululum in luteum vergens. *Pedes* pilis brevibus albidis nitidis vestiti. *Dentium* omnium apices fusco-crocci, quod et in priori specie observatur.

T A L P A.

Dentes Primores superiores VI. medii majores, inferiores VIII. exteriores majores.

Canini

- Canini* utriusque maxillae solitarii, basi lata apice acuto.
- Intermedii* in utraque maxilla III. utrinque, compressi, acuti.
- Maxillares superiores* IV. triquetri, molares cuspidati.
- inferiores* III. compressi, cuspidati.
28. *TALPA Europaea*, caudata, pedibus pentadactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 73. Fa. Su. 25. Schreb. Säugth. 3. p. 559. t. 156.
- T. Europaea*, cauda brevior, pedibus pentadactylis. Erxl. Syst. p. 144.
- T. vulgaris*, cauda brevi, pedibus pentadactylis. Bodd. El. I. p. 126.
- T. vulgaris*, caudata, nigricans, pedibus anticis et posterioribus pentadactylis. Brill. Quadr. p. 204.
- European Mole*. Penn. Britt. Zool. I. p. 128. Arct. Zool. I. p. 142. Hist. Quadr. 2. p. 483.
- Taupe*. Buff. H. N. VIII. p. 81. t. 12. Suppl. III. p. 195. t. 32.
- Suecis* Mullwad. *Smolandis* Surk. *Scanis* Syrk. *Mullsyrk*.
- Habitat sub terra in agris, pratis, hortis et pascuis.
- Pelli ex hortis dicitur sato Coriandro. A. R. Ar. Sc. Su. 1761. p. 82.

5. G L I R E S.

L E P U S.

- Dentes* Primores II. superiores duplicati: interioribus minoribus.
29. *LEPUS timidus*, cauda abbreviata, auriculis apice nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 77. Fa. Su. 25.

L. timi-

L. timidus, cauda abbreviata, pedibus posticis longitudine corporis dimidii, auriculis apice nigris. Erxl. *Syst.* p. 325.

L. caudatus, ex cinereo rufus. Brill. *Quadr.* p. 94. et plane candidus p. 95.

L. variabilis, apice aurium atro, cauda concolore alba. Bodd. *El. I.* p. 99. Schreb. *Säugeth. 4.* p. . . . t. 355. B.

Varying Hare. Penn. *Hist. Quadr.* 2. p. 370. t. 40. f. 1. *Arct. Zool. I.* p. 94.

Sæcæ Hare.

Habitat per totam Sueciam vulgaris.

Obs. In Scania major, ætate subrufus, hyeme griseus, quo magis vero versus septentrionem vergit eo minor, et hyeme magis albescit, ætate vero solum cinereus. In ipsa Scania etiam insignis est differentia quoad magnitudinem et colorem; in campestri enim tractu major et minus sub hyeme griseus quam in sylvestri parte; omnes autem a nobis visi cauda alba. Ideoque adhuc dubium est, num specie differant *L. europæus* et *variabilis* recentiorum; si vero ita, caudæ color characterem dabit, non autem magnitudo vel coloris mutatio.

30. *Lepus Cunicular*, cauda abbreviata, auriculis nudatis. L. S. N. XII. T. I. p. 77. Fa. Su. 26. Schreb. *Säugeth. 4.* p. . . . t. 236. A. B.

L. Cuniculus, cauda abbreviata, pedibus posticis corpore dimidio brevioribus. Erxl. *Syst.* p. 331.

L. Cuniculus, auribus apice atris, cauda concolore, cruribus posticis trunco brevioribus. Bodd. *El. I.* p. 100.

Cuniculus nostras. *Lepus caudatus* obscure cinereus. Brill. *Quadr.* p. 95.

Rabbit.

Rabbit. Penn. *Britt. Zool. I.* p. 104. t. 10. f. 21. *Hist. Quadr.* 2. p. 375.

Lepus. Buff. H. N. VI. p. 303. t. 51.

Sæcæ Kanin.

Hospitatur jam rarius domesticus. 1760 integram insulam juxta Elfsnabben Cuniculis populatam vidi.

CASTOR.

Dentes Primores, superiores II. truncati, angulo transverso excavati. inferiores apice transversii.

Cauda depresso-plana.

31. *CASTOR Fiber*, cauda ovata plana. L. S. N. XII. T. I. p. 78. Fa. Su. 27. Schreb. *Säugeth. 4.* p. 623. t. 175.

C. Fiber, cauda depressa ovata. Erxl. *Syst.* p. 440. Bodd. *El. I.* p. 166.

Castor, castanei coloris, cauda horizontaliter plana. Brill. *Quadr.* p. 90.

Beaver. *Castor*. Penn. *Britt. Zool. I.* p. 96. t. 9. *Hist. Quadr.* 2. p. 385. *Arct. Zool. I.* p. 98.

Castor. Buff. H. N. VIII. p. 282. t. 36.

Bäfwer. Gislæ: A. R. Ac. Sc. Su. 1756. p. 257. *Hollæn:* ibid. 1768. p. 281. *Lagus:* ibid. 1766. p. 218.

Sæcæ Bäfwer. *Smolandis Bjur.*

Habitat in lacubus et fluviis superioris Sueciæ, præsertim Lapponiæ.

Obs. *Castor moschatius* L. *Mygalus* nob. nondum in Finlandia certe visus.

G

MUS.

M U S.

Dentes Primores, utrinque II. inferiores subulati

Maxillares molares III. utrinque.

Cauda annulata nudiuscula.

* *cauda annulata, subnuda.*

32. *Mus decumanus*, cauda elongata, corpore subrufo-cinerascente, subtus albido. Schreb. Säugth. 4. p. 645. t. 178.

M. Norwegicus, cauda elongata, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, corpore rufo. Erxl. Syst. p. 381.

M. decumanus, cauda longissima squamata, corpore toto griseo, subtus albido. Bodd. El. I. p. 111.

M. Norwegicus, cauda longa ex dilute cinereo-fulvus. Briff. Quadr. p. 123.

M. sylvestris, cauda longissima supra dilute fulvus, infra albicans. Briff. Quadr. p. 120.

Brown Rat. Penn. Britt. Zool. I. p. 115. Hist. Quadr. 2. p. 439. Arct. Zool. I. p. 130.

Surmulot. Buff. H. N. VIII. p. 206. t. 27.

Suecis Brun Rotta. *Scanis* Jordrotta.

Habitat in terra sub aedibus, ante 50 annos plane ignotus, jam vero in variis provinciis vulgarissimus: Murem Rattum, ubi sedem fixit, expulit pejor hospes, dum non tantum Rattorum more omnia rodit, sed pavimenta subfodit, sicque aedificiorum fundamenta saepe destruit.

33. *Mus Rattus*, cauda elongata, corpore cinereo-nigriscente subtus cano.

M. Rattus, cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 83. Fn. Su. 33. Schreb. Säugth. 4. p. 647. t. 179.

M. Rat-

M. Rattus, cauda elongata, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, corpore griseo. Erxl. Syst. p. 382.

M. Rattus, cauda longissima squamata, corpore atro, subtus canescente. Bodd. El. I. p. 112.

Rattus. *Mus* cauda longissima, obscure cinereus. Briff. Quadr. p. 113.

Black Rat. Penn. Britt. Zool. I. p. 115. Hist. Quadr. 2. p. 438. Arct. Zool. I. p. 129.

Rat. Buff. H. N. VII. p. 278. t. 36.

Suecis Rotta.

Habitat in aedibus per totam Sueciam excepta Lapponia, ante adventum *M. decumani* vulgarior.

34. *Mus Musculus*, cauda elongata, corpore cinereo-fulco, subtus cinerascente.

M. Musculus, cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. L. S. N. XII. T. I. p. 83. Fn. Su. 34.

M. Musculus, cauda elongata, palmis tetradactylis absque unguiculo pollicari, corpore griseo. Erxl. Syst. p. 391.

M. Musculus, cauda longissima squamata, corpore fulco, subtus cinerascente. Bodd. El. I. p. 112.

Sorex. *Mus* cauda longissima, obscure cinereus; ventre subalbescente. Briff. Quadr. p. 119.

Mouse. Penn. Britt. Zool. I. p. 122. t. 11. f. 30. Hist. Quadr. 2. p. 443. Arct. Zool. I. p. 131.

Souris. Buff. H. N. VII. p. 309. t. 39.

Suecis *Mus*.

Habitat in aedibus et sylvis glandiferis ubique.

Varietates tres in Suecia observatae, scil.

alba, oculis rubris hinc inde visa.

alba, oculis piceis capta ad Uddarp Scaniae.

striata, ex albo cinereoque ad Oennessad Scaniae.

Obs. Spec. 32. 33. 44. hyeme magis cinereae aestate plus minus rufescunt, hinc diversitas colorum apud Auctores.

35. *Mus sylvaticus*, cauda longa, corpore griseo sordide flavescente, subtus lateribusque albis.

M. sylvaticus, cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido. L. S. N. XII. T. I. p. 84. Fn. Su. 36. Schreb. Säugth. 4. p. 651. t. 180.

M. sylvaticus, cauda mediocri, corpore cano pilis nigris, pectore flavescente, abdomine albido. Erxl. Syst. p. 538.

M. sylvaticus, cauda longa squamosa, corpore griseo-lutescente, subtus lateribusque abrupte albis. Bodd. El. I. p. 112.

Fieldmouse. Penn. Britt. Zool. I. p. 120. Hist. Quadr. 2. p. 444. Arct. Zool. I. p. 131.

Mulot. Buff. H. N. VII. p. 325. t. 41.

β. *Mus agrifus*, cauda abbreviata, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascens. Fn. Su. 30.

M. agrorum, cauda longa, supra e fusco flavescens, infra ex albo cinerascens. Brill. Quadr. p. 123.

Harvest Mouse. Penn. Britt. Zool. I. p. 121. Hist. Quadr. 2. p. 445.

Suecis Skogsmus.

Habitat in sylvis et agris.

** cauda pilis brevibus vestita.

36. *Mus amphibius*, cauda longa pilosa, corpore cinereo-fusco, subtus sordide lutescente, auriculis velleris longitudine.

M. amphibius, cauda elongata pilosa, plantis palmatis. L. S. N. XII. T. I. p. 82. Fn. Su. 32.

M. am.

M. amphibius, cauda mediocri, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, corpore nigricante. Erxl. Syst. p. 536. Schreb. Säugth. 4. p. 663. t. 186.

M. amphibius, cauda dimidia longitudine corporis, auribus vix velleris prominulis, palmis subtetradactylis. Bodd. El. I. p. 108.

M. aquaticus, cauda longa, pilis supra ex nigro et flavescente mixtis, infra cinereis vestitus. Brill. Quadr. p. 124.

Water Rat. Penn. Britt. Zool. I. p. 118. Hist. Quadr. 2. p. 442. Arct. Zool. I. p. 130.

Rat d'eau. Buff. H. N. VII. p. 348. t. 43. Suecis Wattrottia.

Habitat ad aquas, rivulos, fossas, hortis infestus.

37. *Mus paludosus*, cauda longa pilosa, corpore nigro, auriculis longitudine velleris.

M. paludosus, cauda mediocri pilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis velleris brevioribus. L. Mant. Plant. alt. p. 522.

Habitat ad fossas et rivulos, introitu sub ipsa aqua.

Obs. Vix varietas praecedentis, totus ater, pilis mollissimis sericeis, pedibus albescentibus. Cauda longitudine circiter corporis magis pilosa.

38. *Mus gregarius*, cauda corpore triplo brevior pilosa, corpore griseo, subtus pedibusque albis. L. S. N. XII. T. I. p. 84.

M. terrestris, cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis velleris brevioribus. Fn. Su. 31.

M. terrestris, cauda mediocri, auriculis velleris brevioribus, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo. Erxl. Syst. p. 535.

M. ar.

M. arvalis, cauda unciali, auribus velleo prominulis, palmis subtetradactylis, corpore fulco. Bodd. El. I. p. 107. Schreb. Säugth. 4. p. 680. t. 191.

M. campestris minor, cauda brevi, pilis e nigricanti et sordide luteo mixtis in dorso, et saturate cinereis in ventre, vestitus. Brill. Quadr. p. 125.

Shorttailed Mouse. Penn. Britt. Zool. I. p. 123.

Meadow Rat. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 460.

Campagnol. Buff. H. N. VII. p. 369. t. 47.

Sueci Molle, perperam Wattrotta.

Habitat in sylvis, dumetis, pratis etc.

Obs. Corpus saepius subtus griseum. Cauda verticillatis pilis.

59. *Mus Lemmus*, cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo nigroque vario. L. S. N. XII. T. I. p. 80. Fa. Su. 29. Zool. Dan. II. p. 5. t. 45. Schreb. Säugth. 4. p. 687. t. 195. A

Mus, cauda abrupta, corpore fulvo-nigro-maculato. Linné: A. R. Ac. Sc. Su. 1740. p. 320. t. 6. f. 4. 5.

Glis Lemmus, corpore fulvo nigroque vario. Erxl. Syst. p. 371.

M. Lemmus, brachyurus, auribus velleo brevioribus, palmis pentadactylis, corpore fulvo nigroque vario, subtus albo. Bodd. El. I. p. 107.

Cuniculus Norvegicus, caudatus, auritus, ex flavo rufo et nigro variegatus. Brill. Quadr. p. 100.

Mus Norvegicus vulgo *Leming*. Worm: Mus. p. 325. f. 1. 2. ejusd. Monogr. Hafniae 1653. c. fig.

Lemmus. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 454. t. 42. f. 2. Arct. Zool. I. p. 136.

Leming. Buff. H. N. XIII. p. 314.

Sueci

Sueci Fiällmus, Sabelmus, Roedmus, Lemming, Lemmel. Lappis Lummick.

Habitat in alpihus Lapponicis, non omni anno gregatim in adjacentes Provincias usque in Wernelandiam descendens, incertis temporibus. Hostes ejus sunt Vulpes, Falcones, Striges, Corvi, Lari, immo Tarrandi capita illorum comedunt.

MYOXUS.

Dentes Primores II. superiores cuneati, inferiores subulati.

Maxillares IV. molares.

Cauda elongata, pilosa, planiuscula.

40. *Mroxus muscardinus*, cauda longa subfloccosa, corpore fulvo, gula alba, pollicibus plantarum muticis. Schreb. Säugth. 4. p. 835. t. 227.

Mus Avellanarius, cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis. L. S. N. XII. T. I. p. 83. Fa. Su. 35.

Sciurus Avellanarius, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis. Erxl. Syst. p. 433.

Mus Avellanarius, cauda longa subfloccosa, corpore fulvo, gula alba. Bodd. El. I. p. 110.

Mus Avellanarum minor. Glis supra rufus, infra albicans. Brill. Quadr. p. 115.

Dormouse. Penn. Britt. Zool. I. p. 110.

Common Dormouse. Penn. Hist. Quadr. I. p. 425. Arct. Zool. I. p. 123.

Muscardin. Buff. H. N. VIII. p. 193. t. 26.

Sueci Hasselmus, Skogsmus.

Habitat in sylvis et Coryletis, promptuaria colligens hyberna.

SCIU.

S C I U R U S.

Dentes Primores, utrinque II. superiores cuneati, inferiores compressi.

Maxillares, superiores V. primo spurio cylindrico; reliqui molares.

inferiores IV. molares.

Cauda longa distiche pilosa.

41. *Sciurus vulgaris*, auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 96. Fn. Su. 37. Schreb. Säugth. 4. p. 757. t. 212.

S. vulgaris, auriculis apice barbatis, cauda dorso concolore. Erxl. Syst. p. 411. Bodd. El. I. p. 117.

S. vulgaris, rufus quandoque griseo admixtus. Briff. Quadr. p. 104.

Common Squirrel. Penn. Britt. Zool. I. p. 107. Hist. Quadr. 2. p. 406. Arct. Zool. p. 122.

Eurenil. Buff. H. N. VII. p. 253. t. 32.

Suecis Ikoru, Ikorre, Ekoru. *Scanis rusticis* Igarn. *Fennis* Orava.

Habitat in sylvis, aestate rufus, hyeme incanus, verum in Scania raro omnem rubedinem in dorso amittit. Post rigidam hyemem 17⁸⁸. per totam aestatem in Scania compestri vulgaris, autumnis imprimis Pifis hortorum infestus.

Varietas nivea rarissima. It. Westrogoth. 222.

42. *Sciurus volans*, hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata. L. S. N. XII. T. I. p. 89. Erxl. Syst. p. 435. Schreb. Säugth. 4. p. 815. t. 223.

S. volans, hypochondriis volitans. Fn. Su. 38.

S. volans, auribus non penicillatis, oculis protuberantibus, cute dilatata plicatili, cauda pilosissima rotundata. Bodd. El. I. p. 120.

S. 29

S. volans, obscure cinereus aut rufescens, cute ab anticiis cruribus ad postica membranas in modum extensa, volans. Briff. Quadr. p. 110.

S. sibiricus, volans dilute cinereus etc. ibid. p. 111.

Flying Squirrel. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 415.

European Flying Squirrel. Penn. Arct. Zool. I. p. 124.

Polatouche. Buff. H. N. X. p. 95.

Suecis Flygande Ikoru. *Fennis* Süpi-Orava, Lendo-Orava.

Habitat in Lapponia, Finlandia.

6. P E C O R A.

C E R V U S.

Dentes Primores inferiores VIII.

Canini solitarii obtusi superne rarius.

Cornua solida, ramosa (tenera corio teneri tomentoso tecta, apiceque crescentia) denudata, annua.

43. *Cervus Alces*, cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. L. S. N. XII. T. I. p. 92. Fn. Su. 39. Bodd. El. I. p. 135. Schreb. Säugth. 5. p. . . . t. 246. A. B.

C. Alces, cornibus acaulibus palmatis. Erxl. Syst. p. 298.

Alces, C. cornibus ab imo ad summum palmatis. Briff. Quadr. p. 64.

Elk. Penn. Hist. Quadr. I. p. 93. t. 9.

Moose. Penn. Arct. Zool. I. p. 17. t. 8. et Tit.

Elan. Buff. H. N. XII. p. 79. t. 7. 8.

Elch, *Elen* etc. Wangenheim: N. Schr. Berl. Gef. Nat. Fr. I. p. 1. T. I.

Suecis Alg, Elg; mas, Elgoxe; foemin. Elgko. *Fennis* Hirvi.

Habitat

Habitat in Sueciae superioris et Norlandiae fylvis, e Gothia jam exul.

44. *Cervus Elaphus*, cornibus ramosis totis teretibus recurvatis. L. S. N. XII. T. I. p. 93. Fn. Su. 40. Erxl. Syst. p. 301. Schreb. Säugth. 5. p. — t. 247. A—E.

C. Elaphus, cornibus teretibus ramosis recurvatis. Bodd. El. I. p. 135.

Cervus, cornibus ad latera teretibus incurvis. Briff. Quadr. p. 58.

Stag. Penn. Britt. Zool. I. p. 41. Hist. Quadr. I. p. 105. Arct. Zool. I. p. 27.

Cerf, Biche et Faun. Buff. H. N. VI. p. 63. t. 9. 10. 12. Suecis Hjort; mas, Kronhjort; foemin. Hind, Hjortko.

Habitat in fylvis rarius, in Scania frequentior, hospitatur etiam in vivariis.

45. *Cervus Tarandus*, cornibus ramosis recurvatis teretibus: summitatibus palmatis. L. S. N. XII. T. I. p. 93. Fn. Su. 41. Erxl. Syst. p. 305. Bodd. El. I. p. 135. Am. Acad. IV. p. 144. Schreb. Säugth. 5. p. — t. 248. B. D.

Ren. Hollstien.: A. R. Ac. Sc. Su. 1774. p. 124.

Cervus Groenlandicus, cornibus teretibus, ab imo ad summum cute pilosa tectis, naso piloso. Briff. Quadr. p. 61.

Rangifer, *C.* cornuum summitatibus omnibus palmatis. Briff. Quadr. p. 63.

Rein. Penn. Hist. Quadr. I. p. 99. Arct. Zool. I. p. 22.

Renne. Buff. H. N. XII. p. 79. t. 10. 11.

Rennkirsch. Mellin: Berl. Gef. Schr. I. p. 1. t. 2. f. 2. 4. p. 128. t. 5. f. 2. cornua.

Suecis Ren; mas, Renoxe; foemin. Renko; pullus Renkalf. Lappis Pätfo. Fennis Peura, Poro.

Habitat

Habitat in alpihus Lapponicis plane spontaneus, licet et cicur pecus unicum sit Lapponum.

Obs. Variat Rangifer Lapponicus a Rossico cornibus, in hoc summitate non palmata, ut ex iconibus Mellini l. c. et Schreberi t. 248. A. et C. nec non Pennanti Hist. Quadr. t. 10. videri potest.

Hujus foemina aeque ac mas cornuta est, quamvis illi cornua minora. Varietas alba rarior, uti etiam ecornis. In cranio foeminae quod misit *cel. Jolin*, *Dentes* canini adfunt et ossa intermaxillaria e quatuor ossibus componuntur.

46. *Cervus Dama*, cornibus ramosis recurvatis compressis summitate palmata. L. S. N. XII. T. I. p. 93. Erxl. Syst. p. 309. Bodd. El. I. p. 136. Schreb. Säugth. 5. p. — t. 249. A. B.

C. Dama, cornibus ramosis compressis: summitate palmata. Fn. Su. 42.

Dama vulgaris, *C.* cornuum unica et altiore summitate palmata. Briff. Quadr. p. 62.

Fallow. Penn. Britt. Zool. 1. p. 41. Hist. Quadr. 1. p. 101. Arct. Zool. I. p. 33.

Dain. Buff. H. N. VI. p. 161. t. 27. 28.

Dammwildpret. Mellin: Berl. Gef. Schr. '2. p. 162. t. 4—7.

Suecis Doshjort.

Hospitatur in vivariis ab exteris allatus.

47. *Cervus Capreolus*, cornibus ramosis teretibus erectis, summitate bifida. L. S. N. XII. T. I. p. 94. Fn. Su. 45. Bodd. El. I. p. 136. Schreb. Säugth. 5. p. . . . t. 252. A. B.

C. Capreolus, cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore fusco-rufo. Erxl. Syst. p. 315.

Capreo-

- Capreolus*, *C. cornibus teretibus erectis*. Briff. Quadr. p. 61.
Roe. Penn. Britt. Zool. I. p. 49. t. 4. Hist. Quadr. I. p. 108. Arct. Zool. I. p. 53.
Chevreuil. Buff. H. N. VI. p. 289. t. 52. 53.
Suecis Rå; *mas*, Råbock; *foemina* Rådjur.

Habitat in sylvis.

C A P R A.

Dentes Primores inferiores VIII.

Canini nulli.

Cornua concava, suturum versa, erecta, scabra.

Aranicus menti.

48. CAPRA *Hircus*, cornibus carinatis arcuatis. L. S. N. XII. T. I. p. 94. Fn. Su. 44. Erxl. Syst. p. 256. Schreb. Säugth. T. 5. p. — t. 283.
Hircus Hircus, cornibus carinatis arcuatis. Bodd. El. I. p. 146.
Hircus et Capra domestica, cornibus interioribus cultratis, exterius rotundatis, infra carinatis, arcuatis. Briff. Quadr. p. 38.
Domestic Goat. Penn. Britt. Zool. I. p. 55. t. 3. Hist. Quadr. I. p. 53.
Bouc, Chevre. Buff. H. N. V. p. 59. t. 8. 9.
Suecis *mas*, Bock; *foemina* Get; *pullus* Kid, Killing. *Fennis* *mas* Pukki, Putti; *foem.* Wuohi, Kuttu; *pullus* Wohla.
β. ecornis.
Suecis Kullig Bock.
γ. angorensis.
C. angorensis. *Hircus* pilis longissimis crispis toto corpore vestitus. Briff. Quadr. p. 39.

Hircus

- Hircus angorensis*, cornubus magis spiralibus, pedibus brevioribus, pilo longiore sero ad pedes descendente. Bodd. El. I. p. 147. 3. β.
Bouc d'Angora. Buff. H. N. V. t. 10. 11.
C. Hircus angorensis. Schreb. Säugth. 5. p. — t. 284.
Suecis Angorisk Bock, Kamelbock.

Hospitatur in locis sylvestribus at γ rarior.

O V I S.

Dentes Primores inferiores VIII.

Canini nulli.

Cornua concava, retrosum versa, intorta, rugosa.

Mentum imberbe.

49. OVIS *Aries*, cornibus compressis lunatis. L. S. N. XII. T. I. p. 97. Fn. Su. 45. Am. Acad. IV. p. 169. Erxl. Syst. p. 242.
O. Aries, cornibus compressis lunatis, corpore lanato. Bodd. El. I. p. 147.
O. domestica. *Aries laniger*, cauda rotunda brevi. Briff. Quadr. p. 49.
Fleecy Sheep. Penn. Britt. Zool. I. p. 27. Hist. Quadr. I. p. 52.
Belier. *Brebis*. Buff. H. N. V. p. 1. t. 1. 2.
Suecis Får; *mas*, Bagge, Gumsö, Wådur; *castratus* Bete; *foemina* Tacka; *pullus* Lamb. *Fennis* Lammas; *mas*, Jäärä, Pålfi; *castratus* Oinas, Kuoho; *foem.* Uuhi, Unho, Uttu; *pullus* Wuona (Savol.) Karikaritzä, Karikko et diminutive Karkoinen. *Smolandis* Sör, Söer.
α. rustica, minor, cornuta plerumque, lana brevior, grossiore, minus crispä.
Suecis Bondfår, Swenska Får.

β. angli-

β. anglicana, ecornis, lana crispa, cauda longiore cum scroto ad genua propendente.

Penn. Britt. Zool. I. Tit.

Suecis Engellikt Får.

γ. hispanica, cornubus spiraliter contortis, depressis, lana crispa.

Suecis Spanakt Får.

δ. multicornis, cornubus tribus, quaternis, quinis.

Many horned Sheep. Penn. Hist. Quadr. I. p. 54. t. f. 3.

Hospitantur hae varietates cultae. *δ* rarior in Gothlandia et Scania.

Cum Hirco nonnunquam prolem generat fertilem, lana villiorem.

B O S.

Dentes Primores inferiores VIII.

Canini nulli.

Cornua concava, antrorsum versa, lunata, laevia.

50. *Bos Taurus*, cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. L. S. N. XII. T. I. p. 98. Fn. Su. 46. Excl. Syst. p. 228.

B. Ursus, cornubus crassis brevibus, sursum flexis, fronte crispa. Bodd. El. I. p. 151. *α. europaeus.*

B. domesticus, cornibus laevibus teretibus sursum reflexis. Briff. Quadr. p. 52.

Domestic Ox. Penn. Britt. Zool. I. p. 15. t. 2.

Bull. Penn. Hist. Quadr. I. p. 15.

Taureau. Buff. H. N. IV. p. 437. t. 14.

Suecis Noet; *mas*, Tjur; *castratus* Oxo; *junior* Stut; *foemina*, Ko, donec prima vice peperit Quiga; *pullus* Kalf. *Foenis mas* Härkä; *foemina*, Lelunä; *pullus* Wasikka.

Hospi-

Hospitatur cultus ubique.

Obs. Uros olim australiorem Sueciam, saltem Scania in habitasse nullum est dubium. Testatur *Adamus Bremenfis*, testantur denique *Crania* et *Cornuum reliquiae* in caespitum fodinis saepius inventae.

7. JUMENTA.

E Q U U S.

Dentes Primores superiores VI. erecto-paralleli. inferiores VI. prominentiores.

Canini solitarii, inclusi, utrinque remoti.

Pedes ungula indivisa.

51. *Equus Caballus*, cauda undique setosa. L. S. N. XII. T. I. p. 100. Fn. Su. 47. Excl. Syst. p. 207.

E. domesticus, auribus brevioribus, colore varians, nunquam murino. Bodd. El. I. p. 159. *α.*

Equus, auriculis brevibus erectis, juba longa. Briff. Quadr. p. 69.

Generous Horse. Penn. Britt. Zool. I. p. 1. t. 1. Hist. Quadr. I. p. 1.

Cheval. Buff. H. N. IV. p. 174. t. 1.

Suecis Häst; *mas* Hingst; *castratus* Wallack; *foemina*, Sto, Märr; *junior* Foelja; *pullus* Foel. *Foenis* Hevoineh; *mas* Orhi; *castratus* Ruuna, Salvio, Waslakka; *foemina*, Taama, *pullus* Warfa. *Scanis* Oek, Horfa.

Hospitatur cultus ubique, ante 40 annos adhuc in sylvis quoque semiferus, juba longissima et mystacibus saepe recurvis. Oelandiae Equi minimi putantur, Metelli vero ex insula Mitylene i. Lesbos adhuc minores referente Björnstål in Epist. Voll. 5. p. 53. Equi murini coloris in Scania haud rari.

9. BEL-

9. BELLUAE *)

TRICHECHUS.

Dentes Primores nulli.

Canini solitarii in maxilla superiore.

Maxillares molares spurii, simplicissimi utriusque subquaterni.

Manus unguiculatae.

Pedes postici compedes.

52. *TRICHECHUS Rosmarus*, dentibus caninis elongatis distantibus, maxillaribus his approximatis. N. A. B. Ac. Sc. Su. 1794. p. 291.

T. Rosmarus, dentibus lanariis superioribus exsertis. L. S. N. XII. T. I. p. 49. Erxl. Syst. p. 593. Fn. Groenl. p. 4. Schreb. Säugth. 2. p. 262. t. 79.

Odobenus, Brill. Quadr. p. 30.

Rosmarus Morsus, dentibus lanariis exsertis longioribus. Bodd. El. I. p. 169.

Arctic Walrus. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 514. Arct. Zool. I. p. 144.

Morse. Buff. H. N. XIII. p. 358. t. 54.

Succis Wallrofs.

Habitat in mari glaciali.

10. CETE.

MONODON.

Dentes unus vel duo cornuum instar in maxilla superiore exserti, praelongi, recti.

Fistula, in vertice.

53. *MONODON Monoceros*, cornu praelongo spiraliter fulcato, dorso impinni.

M. Mo-

*) Bruta 8 ordinem constituunt. Horum nullum genus Europaeum.

M. Monoceros, dente corniformi spirali (rarius duplici) recto praelongo exserto, in maxilla superiore. Fabr. Fn. Groenl. 18.

M. Monoceros. L. S. N. XII. T. I. p. 105. Fn. Su. 48. Erxl. Syst. p. 646.

Monodon. Art. Gen. 78. Syn. 106.

Ceratodon Narhual. Brill. Quadr. p. 231.

Habitat in mari atlantico.

BALAENA.

Dentium loco in maxilla superiore laminae corneae.

Fistula duplex.

54. *BALAENA Myflicetus*, naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni. L. S. N. XII. T. I. p. 105. Fn. Su. 49. Erxl. Syst. p. 601. Fn. Groenl. 20.

B. fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. Art. Gen. 76. Syn. 106. Spec. 106.

B. vulgaris, Groenlandica bipinnis, in dorso nigricans, in ventre alba, dorso laevi. Brill. Quadr. p. 218.

Common Whale. Penn. Britt. Zool. 5. p. 50.

Succis Groenlands Hwalfisk.

Habitat in mari atlantico, victitans imprimis *Canceris* minutis et *argonauta* arctica *Fabr.*

55. *BALAENA Physalus*, fistula duplici in medio capite, dorso extremo pinna adiposa. L. S. N. XII. T. I. p. 106. Fn. Su. 50. Fn. Groenl. 21. Erxl. Syst. p. 605.

B. fistula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorso. Art. Gen. 77. Syn. 107.

B. pinna in dorso macronata. Brill. Quadr. p. 222.

Finfish. Penn. Britt. Zool. 5. p. 57.

Succis Finnfisk.

Habitat in mari Norvegico. Editur ab incolis.

Obs. Hujus forte cadaver, quod recens circa initium hujus saeculi non longe ab Ystad in litus projectum et ex quo varia ossa in Museo R. Academiae Lundensis servantur; ejus etiam integrum fere Sceleton non procul a Landscrona sub arena juxta flumen Heljarp ante paucos annos effossum.

PHYSETER.

Dentes in maxilla inferiore.

Fistula in capite l. fronte.

56. *PHYSETER macrocephalus*, dorso impinni, dentibus inflexis apice acutiusculo. Fabr. Fn. Groenl. 25.

Ph. macrocephalus, dorso impinni, fistula in cervice. L. S. N. XII. T. I. p. 107. Excl. Syst. p. 612.

Catodon macrocephalus, dorso impinni, fistula in cervice. Fn. Su. 53.

Catodon, fistula in cervice. Art. Gen. 78. Syn. 108.

Cetus bipinnis, supra niger, infra albicans, fistula in cervice, dorso laevi. Briss. Quadr. 2. p. 225.

Bluntheaded Cachalot. Penn. Britt. Zool. 3. p. 61. t. 6.

Habitat in mari Norwagico.

DELPHINUS.

Dentes in maxilla utraque.

Fistula in capite.

57. *DELPHINUS Phocaena*, corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtusulo. L. S. N. XII. T. I. p. 108. Fn. Su. p. 51. Art. Gen. 75. Syn. 104. Fn. Groenl. 29. Excl. Syst. p. 618. Nat. Hist. Selfk. Skr. 2. 2. p. 111.

D. Phocaena, pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtusulo. Briss. Quadr. p. 234.

D. Phocaena, pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtusulo. Briss. Quadr. p. 234.

D. Phocaena, pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtusulo. Briss. Quadr. p. 234.

Delphi-

Delphinus, rostro obtuso, dentibus acutis. Bloch. Pisc. Germ. 5. p. 119. t. 92.

Porpessa. Penn. Britt. Zool. p. 69.

Nifen. Gunnerus: Act. Nidros. 2. p. 258. t. 4.

Suecis Marfwin, Tunlars.

Habitat ubique in mari vulgaris, unica hujus ordinis species, quae etiam mare Balticum inhabitat.

58. *DELPHINUS Orca*, rostro sursum repando, dentibus latis serratis. L. S. N. XII. T. I. p. 108. Fn. Su. 52. Art. Gen. 76. Syn. 106. Excl. Syst. p. 623.

D. Turfis, corpore crasso, dorso pinnato, rostro sursum repando, dentibus obtusis. Fn. Groenl. 31.

D. Orca, pinna in dorso una, dentibus obtusis. Briss. Quadr. p. 236.

Crampus. Penn. Britt. Zool. 3. p. 72.

Suecis Loepare.

Habitat in mari.

Sunt procul dubio plures hujus ordinis species in mari occidentali et septentrionali, quarum notitia nos fugit, cum raro capiuntur et mortui a solo vulgo observentur.

ADDENDA.

59. *SCIAENUS striatus*, flavus, striis quinque fuscis longitudinalibus. L. S. N. XII. T. I. p. 87. Pallas Glir. Spec. p. 378. Excl. Syst. p. 426. Schreb. Säugth. 4. p. 790. t. 219.

Myoxus striatus, flavus, striis quinque fuscis longitudinalibus. Bodd. El. I. p. 122.

Sciurus carolinensis, rufus, taeniis in dorso nigris, taeniis ex albo - flavicantibus intermixtis. Briss. Quadr. p. 108.

D 2

Striped

Striped Dormouse. Penn. Hist. Quadr. 2. p. 422. Arct.
Zool. I. p. 126.

The Ground Squirrel. Edw. Av. 4. t. 181.

Sciurus minor virgatus. N. Comm. Acad. Petrop. V.
p. 344. t. 9. f. 1.

Röffelweibla. Kalm. it. Amer. 2. p. 419.

Ecureuil Suisse. H. N. X. p. 126. t. 28.

Habitat — In Dalekarlia captum a D. Alf. Blom R. Acad.
demiae Scient. oblatum retulit D. Pr. Sparmann.

Ore buccato, cauda subdifticha et vita subterranea a
felliis Sciuris recedit.

AVES SVECIAE.

A V E S S V E C I A E

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|
| 1. Accipiter. | | |
| 1. Falco | Chrysaetos. | 33. Strix |
| 2. — | Melanurus. | 34. — |
| 3. — | Albicilla. | 35. — |
| 4. — | Ofiifragus. | 36. — |
| 5. — | Haliaeetus. | 37. Lanus |
| 6. — | Legopus. | 38. — |
| 7. — | Apivorus. | 39. — |
| 8. — | ruficollis. | |
| 9. — | Pygargus. | 2. Fica. |
| 10. — | rufus. | 40. Corvus |
| 11. — | Milvus. | 41. — |
| 12. — | ster. | 42. a — |
| 13. — | Gentilis. | 42. — |
| 14. — | Subluteo. | 43. — |
| 15. — | Lithofalco. | 44. — |
| 16. — | Buteo. | 45. — |
| 17. — | fasciatus. | 46. — |
| 18. — | Tinnunculus. | 47. — |
| 19. — | Lanarius. | 48. Coracias |
| 20. — | Gyrfalco. | 49. Oriolus |
| 21. — | seruginosus. | 50. Cuculus |
| 22. — | Palumbarius. | 51. — |
| 23. — | Nisus. | 52. Iynx |
| 24. Strix | Bubo. | 53. Picus |
| 25. — | Scandiacus. | 54. — |
| 26. — | Onus. | 55. — |
| 27. — | Scops. | 56. — |
| 28. — | Nyctes. | 57. — |
| 29. — | liturata. | 58. — |
| 30. — | Lapponica. | 59. Sitta |
| 31. — | Aluco. | 60. Upupa |
| 32. — | flammea. | 61. Certhia |

	3. <i>Anseres.</i>	101. <i>Procellaria Glacialis.</i>
62. <i>Anas Cygnus.</i>		102. <i>Pelecanus Carbo.</i>
63. — <i>Olor.</i>		104. — — <i>crifatus.</i>
64. — <i>Tadorna.</i>		105. — — <i>Bassanus.</i>
65. — <i>spectabilis.</i>		106. <i>Colymbus arcticus.</i>
66. — <i>fufca.</i>		107. — — <i>feptentrionalis.</i>
67. — <i>nigra.</i>		108. <i>Uria Grylle.</i>
68. — <i>Marila.</i>		109. — <i>Troile.</i>
69. — <i>ruficollis.</i>		110. <i>Podiceps crifatus.</i>
70. — <i>Anfer.</i>		111. — — <i>auritus.</i>
71. — <i>albifrons.</i>		112. — — <i>obfcurus.</i>
72. — <i>Erythropus.</i>		113. — — <i>rubicollis.</i>
73. — <i>Bernicla.</i>		114. — — <i>minor.</i>
74. — <i>molliffima.</i>		115. <i>Larus eridacrylus.</i>
75. — <i>clypeata.</i>		116. — <i>glaucus.</i>
76. — <i>platyrhynchus.</i>		117. — <i>marinus.</i>
77. — <i>ftrepeta.</i>		118. — <i>fufcus.</i>
78. — <i>Clangula.</i>		119. — <i>canus.</i>
79. — <i>Glaucion.</i>		120. — <i>ridibundus.</i>
80. — <i>Penelope.</i>		121. — <i>atricilla.</i>
81. — <i>acuta.</i>		122. <i>Cataracta paraftica.</i>
82. — <i>hyemalis.</i>		123. — — <i>Skua.</i>
83. — <i>ferius.</i>		124. <i>Sterna Hirundo.</i>
84. — <i>Querquedula.</i>		125. — <i>nigra.</i>
85. — <i>Crecca.</i>		126. — <i>cafpia.</i>
86. — <i>Circia.</i>		127. — <i>nubiofa.</i>
87. — <i>Hiftrionica.</i>		
88. — <i>ferruginea.</i>		4. <i>Grallee.</i>
89. — <i>Alaudica.</i>		128. <i>Platalea Leucorodia.</i>
90. — <i>Boëchas.</i>		129. <i>Ardea Grus.</i>
91. — <i>Fuligula.</i>		130. — <i>Ciconia.</i>
92. — <i>Stellera.</i>		131. — <i>nigra.</i>
93. <i>Mergus Merganfer.</i>		132. — <i>stellaris.</i>
94. — <i>Serrator.</i>		133. — <i>cineres.</i>
95. — <i>Albellus.</i>		134. — <i>alba.</i>
96. <i>Alca Torda.</i>		135. <i>Tantalus Falcinellus.</i>
97. — <i>Pica.</i>		136. <i>Scolopax Arquta.</i>
98. — <i>impennis.</i>		137. — <i>Phacopus.</i>
99. — <i>arctica.</i>		138. — <i>fufca.</i>
100. — <i>Alle.</i>		139. — <i>ruficollis.</i>
101. <i>Procellaria Pelagica.</i>		140. — <i>paludofa.</i>
		141.

141. <i>Scolopax Gallinago.</i>	181. <i>Meleagris Gallinago.</i>
142. — <i>Gallinula.</i>	182. <i>Phasianus Gallus.</i>
143. — <i>Glorijs.</i>	183. <i>Tetrao Urogallus.</i>
144. — <i>Callaris.</i>	184. — <i>Tetrix.</i>
145. — <i>limofa.</i>	185. — <i>Cachinnans.</i>
146. — <i>Lapponica.</i>	186. — <i>Lagopus.</i>
147. <i>Tringa pugnax.</i>	187. — <i>Bonafus.</i>
148. — <i>Vanellus.</i>	188. — <i>Perdix.</i>
149. — <i>Gambetta.</i>	189. — <i>Coturnix.</i>
150. — <i>Interpres.</i>	
151. — <i>Ariata.</i>	6. <i>Pagores.</i>
152. — <i>hyperbores.</i>	190. <i>Columba Oenas.</i>
153. — <i>alpina.</i>	191. — <i>Palumbus.</i>
154. — <i>Ocropus.</i>	192. — <i>risoria.</i>
155. — <i>Glaucola.</i>	193. <i>Alauda arvenfis.</i>
156. — <i>litorea.</i>	194. — <i>pratensis.</i>
157. — <i>Hypoleucos.</i>	195. — <i>arborea.</i>
158. — <i>Canutus.</i>	196. — <i>campeftris.</i>
159. — <i>Cinclus.</i>	197. — <i>trivialis.</i>
160. — <i>Squatarola.</i>	198. — <i>criftata.</i>
161. — <i>grifca.</i>	199. <i>Sturnus vulgaris.</i>
162. — <i>cineres.</i>	200. — <i>Cinclus.</i>
163. — <i>Islandica.</i>	201. <i>Turdus viscivorus.</i>
164. — <i>paflilla.</i>	202. — <i>musicus.</i>
165. <i>Charadrius Hifancula.</i>	203. — <i>pilaris.</i>
166. — — <i>Morinellus.</i>	204. — <i>ilifcus.</i>
167. — — <i>Apticarius.</i>	205. — <i>rofcus.</i>
168. — — <i>pluvialis.</i>	206. — <i>Merula.</i>
169. <i>Recurviroftra Avocetta.</i>	207. — <i>torquatus.</i>
170. <i>Hematopus Oflrilegus.</i>	208. <i>Ampelis Garsulus.</i>
171. <i>Fulica atra.</i>	209. <i>Loxia curviroftra.</i>
172. — <i>aterrima.</i>	210. — <i>Coccothraufles.</i>
173. — <i>Chloropus.</i>	211. — <i>Enucleator.</i>
174. — <i>Porphyrio.</i>	212. — <i>Pyrrhula.</i>
175. <i>Rallus Crex.</i>	213. — <i>Chloris.</i>
176. — <i>aquaticus.</i>	214. <i>Emberiza nivflis.</i>
177. — <i>Porzana.</i>	215. — — <i>Miliaria.</i>
	216. — — <i>Hortulana.</i>
5. <i>Gallinae.</i>	217. — — <i>Cotrinella.</i>
178. <i>Oris Tarda.</i>	218. — — <i>Schoeniclus.</i>
179. — <i>Tetrax.</i>	219. <i>Fringilla Lapponica.</i>
180. <i>Pavo crifatus.</i>	220. — <i>Coccyzus.</i>

221. Fringilla Montifringilla.	248. Motacilla Boecica.
222. — Lulensis.	249. — — Rubecula.
223. — Carduelis.	250. — — Troglodytes.
224. — Spinus.	251. — — Regulus.
225. — flammea.	252. — — Trochilus.
226. — Cannabina.	253. Parus Cyanus.
227. — Linaria.	254. — cristatus.
228. — domestica.	255. — major.
229. — montana.	256. — coeruleus.
230. Muscicapa Aticapilla.	257. — ater.
231. — — Grifola.	258. — palustris.
232. Motacilla Lulcinia.	259. — caudatus.
233. — — modularis.	260. — Biarmicus.
234. — — Schoenobaenitis.	261. Hirundo rustica.
235. — — Curruca.	262. — urbana.
236. — — Hippobos.	263. — riparia.
237. — — Salicaria.	264. — Apus.
238. — — Sylvia.	265. Caprimulgus europaeus.
239. — — alba.	
240. — — flava.	
241. — — Hostrula.	
242. — — Oenanthe.	266. Fringilla candida.
243. — — Rubetra.	267. Emberiza.
244. — — Aticapilla.	268. Muscicapa alba.
245. — — Phoenicurus.	269. Falco Lapponicus.
246. — — Tithys.	270. Anas Canadensis.
247. — — Erithacus.	271. Larus minutus.

II. AVES.

II.
A V E S.

1. ACCIPITRES.

FALCO.

Rostrum aduncum, basi cœra tectum.

Caput pennis arcte tectum.

Lingua bifida.

* Aquilæ Briff. rostro prius recto, dein adunco.

1. FALCO Chrysaëtor, cœra lutea, pedibus lanatis luteo-ferrugineis, corpore fusco-ferrugineo variq., cauda nigra basi cinereo-undulata. L. S. N. XII. T. I. p. 125. Fu. Su. 54. Lath. Ind. I. p. 12.

Aquila Chrysaëtor seu Aquila aurea. Briff. Orn. I. p. 124.

The golden Eagle. Willugh. p. 58. t. 1.

Golden Eagle. Penn. Britt. Zool. I. p. 161. t. XVI. l. Tit. Arct. Zool. 2. p. 214.

Grand Aigle. Buff. Av. I. p. 76. t. 1.

Suæc. Orn.

Habitat in petris altis, etiam in arboribus excelsis.

Ova 2, 3.

Corpus magnitudine majoris anseris, 12 — 15. libr. ferrugineo-fuscoque nebulosum. Caput tegitur pennis rigidis

rigidis flavo-fulvis longisque instar pennarum colli in Gallo gallinaceo, at discretis. Remiges nigri, secundarii parum albido-nebulosi. Cauda rotundata, rectricibus obscure fuscis vel nigrescentibus versus basin cinereo-undulatis l. nebulosis. Ani regio ferruginea. Pedes ferruginei, tecti usque ad digitos. Rostris apex aduncus, niger. Mystaces setosae, supra quas cera lutea, in qua nares transversae.

2. FALCO *Melanaetus*, cera lutea, pedibus lanatis, corpore fuliginoso-fusco, cauda nigra basi alba.

F. *Melanaetus*, cera lutea, pedibus semilatis, corpore ferrugineo-nigricante striis flavis. L. S. N. XII. T. I. p. 124. Lath. Ind. I. p. 10.

Aquila Melanaetus seu *Aquila nigra*. Brill. Orn. I. p. 125.

Aigle noir. Buff. Av. I. p. 36.

Fieldörn, Slagörn. Parel: Act. Nidros. 4. p. 421.

β *Falco fulvus*, cera flava pedibusque lanatis fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba. L. S. N. XII. T. I. p. 125. Lath. Ind. I. p. 10.

Aquila. Brill. Orn. I. p. 121.

Golden Eagle with a white ring about its tail. Will. Orn. p. 59.

The white-tailed Eagle. Edw. Av. I. p. 1. t. 1.

Black Eagle. Penn. Britt. Zool. I. p. 165. Arct. Zool. 2. p. 195.

Aigle commun. Buff. Av. I. p. 36.

γ *Aquila alba*. Brill. Orn. I. p. 122.

Habitat in sylvis montosis rariis, Leporibus, Felibus etc. vicitans, proprie *Slagörn* dictus.

Magnitudo Gallopavonis foeminae. Color varius pro aetate ut reliqui Falcones: α cauda dimidiato alba maculis nigricantibus, ceterum nigra. β cauda alba

sibirica

apice

apice nigra, rectricibus i. i. saepe cinereis. γ tota ex albo flavescens in Scania olim capta. In annosiore ave var. β caput et collum pennas habet longas, angustas, ferrugineas.

3. FALCO *Albicilla*, cera pedibusque flavis, corpore fusco-cinereo maculato, uropygio, caudaque albis. Ödman N. Act. Ups. 4. p. 251.

Falco Albicilla, cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis apice nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 123. Lath. Ind. I. p. 9. (i. Falco.)

F. *Albicilla*, cera flava, rectricibus albis, intermediis nigris. Fn. Su. 55. Brunn. Orn. p. 3.

Aquila Albicilla. Brill. Orn. I. p. 123.

Pygargus. Will. Orn. p. 61.

Cinereous Eagle. Penn. Britt. Zool. I. p. 170. t. 12. Arct. Zool. 2. p. 214.

Grand Pygargue. Buff. Av. I. p. 99.

Orfroye. Buff. Av. I. p. 112. t. 37

Suecis *Fiskörn*.

Habitat ad loca maritima in arboribus vel montium praecipitiis nidum constructus, ova 3. ponit. *Fictus Pälces*, Mammalia minora tam viva quam putida. Historiam dedit Rev. ÖDMAN l. cit. qui etiam *Olfifragum Buff.* hujus speciei biennem avem esse suspicatur, Digitus exterior versatilis more strigum. *Tengmaln*.

4. FALCO *Olfifragus*, cera lutea pedibusque semilatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albis. L. S. N. XII. T. I. p. 124. Brunn. Orn. p. 3. Lath. Ind. I. p. 12.

Aquila Olfifraga. Brill. Orn. I. p. 125.

Sea Eagle or *Osprey*. Will. Orn. p. 59.

Sea Eagle. Penn. Britt. Zool. I. p. 167. t. 17. Arct. Zool. 2. p. 194.

Suecis *Hafsörn*.

Habitat

Habitat ad littora maris lacuumque in praeruptis montium vel arboribus excelſis nidificans. *Victus* Piscis, Phocae juniores, Aves aquaticae etc.

Magnitudo praecedentis, pennae basi albis, medio ferrugineis, apice fusco-nigricantibus. *Pectus* et *Abdomen* ferruginea albido-maculata. *Remiges* primores nigricantes. *Rectrices* extrorsum ferrugineo-nigricantes, introrsum cinerascens-nebulosae. Sub gula *Barba* fetosa brevis. Tibiarum suprema pars tantum plumosa.

6. *FALCO Haliaetus*, cera pedibusque caeruleis, corpore supra fusco subtus albo, capite albido. L. S. N. XII. T. I. p. 129. Fn. Su. 63. Lath. Ind. p. 17.

Haliaetus, l. *Aquila* marina. Briss. Orn. I. p. 126.

Bald Buzzard. Will. Orn. p. 69.

Osprey. Penn. Britt. Zool. I. p. 174. Arct. Zool. 2. p. 199.

Balbutard. Buff. Av. I. p. 103. t. 2.

Sueci Bläfsot, Fiskjulen, Fiskhök.

Habitat humi inter Arundines juxta aquas, nidificat in arboribus, victitat piscibus.

Nares oblongae, obliquae. *Ingulum* saepe maculis oblongis. *Remiges* variegati. *Alae* compositae cauda longiores. *Rectrices* binae mediae nigricantes, reliquae albo fuscoque fasciatae. *Digitus* exterior versatilis ungue majore. Penn.

** Accipitres Briss. rostro mox curvato.

6. *FALCO Lagopus*, cera digitisque luteis, pedibus plumosis, corpore ferrugineo-fusco alboque maculato, cauda dimidiato-alba fuscaque, apice exalbido.

F. Lagopus, cera pedibusque pennatis luteis, corpore fusco et albido vario, rectricibus fuscis basi dimidia apiceque albis. Lath. Ind. I. p. 19.

scilicet

F. penn

F. pennatus, cera pedibusque pennatis luteis, corpore nigricante griseo-vario, subtus luteo-fusco, capite pallido, superciliis nigris. Lath. Ind. p. 19.

Falco pedibus pennatis. Briss. Orn. I. p. 120.

F. Lagopus, cera pedumque lanatorum digiti lutei, corpus nigrum albo-maculatum, rectrices nigrae versus apicem albae. Brunn. Orn. p. 4.

F. Norvegicus, dorso, alis, sterno subtus et abdomine fuscis, maculis subululatis canis, praesertim in alis aspersis, rectricibus albis, extremitatibus late nigris. Gannet. Lecons Lappi. p. 237.

Grøn Falk, Parelius. Act. Nidros. 4. p. 119. t. 13.

Roughlegged Falcon. Penn. Britt. Zool. 2. p. 623. t. 1. Arct. Zool. 2. p. 209.

Sueci Grå Falk.

Habitat in Scania, forte et alibi.

Pro aetate variat e griseo ad obscure testaceum, maculis longitudinalibus undique aspersus vel obscure fuscis vel nigricantibus. *Rectrices* alarum fuscae marginae ferrugineo. *Alae* cauda breviores.

7. *FALCO apivorus*, cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo, caudae fascia cinerea apice albo. L. S. N. XII. T. I. p. 130. Fn. Su. 65. Lath. Ind. I. p. 25.

Accipiter, Buteo Apivorus. Briss. Orn. I. p. 117.

Honey Buzzard. Will. Orn. p. 72. Penn. Britt. Zool. I. p. 190. Arct. Zool. 2. p. 224.

la *Bondrée*. Buff. Av. I. p. 203.

Sueci Slaghök.

Habitat in sylvestribus. Praedatur Ranas, Lacertas, Aviculas, Insecta.

Rostrium nigrum. *Cera* nigra rugosa. *Iris* oculorum crocea. *Frons* cinerea, reliquum capitis ex cinereo-fuscis.

scilicet.

scelcit. *Dorsum* ferrugineo - fuscum. *Remiges* et *Rectrices* 3. l. 4. fasciis alternis nigricantibus, totidemque cinereis, in quibus 5 — 6. striae observantur undulatae pallidiores. *Pennarum* et *plumarum rachides* nigrae. *Pedes* lutei. *Gula* albida striis nigris. *Corpus* subtus maculis ferrugineis. Varietatem macula alba nucae observavit pl. rev. ÖDMAN.

8. *FALCO ruficollis*, cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo. L. S. N. XII. T. I. p. 105. Fn. Su. 56. Fabr. Fa. Groenl. 54. Lath. Ind. I. p. 23.

F. islandicus fuscus, Brünn. Orn. p. 2. f. c. Fabr.

Collared Falcon, Penn. Arct. Zool. 2. p. 222.

Suecis Ringbök.

Habitat in sylvis, rarior Avia.

Magnitudo Gallinae majoris. *Rostrum* plumbeum apice nigro. *Capitis* pennae angustae albae rachi nigra, unde caput longitudinaliter striatum. *Tempora* magis albicant. *Circa* basim rostri et ad oculos plumulae fetosae nigrae sparsae. *Collis* suprema pars capiti concolor, sed inferior cum gula et pectore alba immaculata, quam albedo collum annuli instar fere cingit. *Dorsum* cinereo - alboque undulatum, apicibus pennarum albis. *Abdomen* album maculis cordatis nigricantibus raris. *Alae* supra dorso fere concolores, licet magis obscurae, subtus albidae. *Remigum* 7 primorum latus exterius nigricans. *Cauda* aequalis subtus albida, supra albo cinereoque fasciata, fasciis 12. 13. Otto Fabricius.

9. *FALCO Pygargus*, cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pallido maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. L. S. N. XII. T. I. p. 126.

F. cyaneus femina, Lath. Ind. I. p. 59.

F. torquatus, Brill. Orn. I. p. 100.

Ringtail.

Ringtail, Penn. Britt. Zool. I. p. 194.

Soubyse, Buff. Av. I. p. 215. t. 9.

Hujus mas. *)

F. cyaneus, cera alba, pedibus fulvis, corpore coeruleo - canescente, arcu superciliari albo gulam cingente. L. S. N. XII. T. I. p. 126. Lath. Ind. I. p. 59.

F. torquatus, mas. Brill. Orn. I. p. 100. Brünn. Orn. p. 4.

Blue Hawk, Edw. Av. 5. t. 225.

Henharrier, Penn. Britt. Zool. I. p. 195. t. 28.

Oiseau St. Martin, Buff. Av. I. p. 212.

Habitat in Scania rarius LECHE, qui solam foeminam vidit.

Collare e pennis brevibus rigidis pallidioribus pone aures ascendens. *Colore* non sexus solum variat, sed et aetate variant plurimum. *Conf.* Auctores infra nominatos. In mare cera laud alba, sed lutea. *Rectrices* 2 intermediae totae cinereae, reliquae exteriore tantum latere, in foemina illae fasciis 4 nigricantibus totidemque cinereis, haec 5 nigris totidemque testaceis, omnibus apice albis.

10. *FALCO rufus*, cera pedibusque flavis, corpore rufo maculis longitudinalibus vario, dorso fulco, rectricibus cinereis. Lath. Ind. I. p. 25.

Circus rufus, Brill. Orn. I. p. 115.

Le Harpoye, Buff. Av. I. p. 217.

Habitat in Scania.

Magnitudo falconis gentilis maris. *Cera* lutea, etiam subvirescens. *Irides* crocae. *Caput*, *Collum* et *Pectus* pennis

*) Auctoritate D. Pennant, Latham et Bechstein.

F.

pennis longitudinaliter dimidiato pallide testaceis, dimidiato nigricantibus. *Abdomen* et *Femora* rufo-ferruginea, pennis in medio longitudinaliter obscure fuscis. *Dorsum* fusco-fuliginosum. *Alae* longae, expansae 4 ped. inter apices. *Remiges* 1-6. nigri, basi intus albi, 7 etc. cinereo-cani, *Tectrices* primorum etiam. *Cauda* alis vix longior. *Rectrices* cinereo-cauae, sed 6. 6. tinctura ferruginea. *Cristum* rufo-ferrugineum. *Uropygium* ferrugineo et albo maculatum.

Juniorem *F. aeruginosum* suspicatur BECHSTEIN.

11. *FALCO Milvus*, cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore. L. S. N. XII. T. I. p. 126. *Fn. Su.* 57. *Lath. Ind. I.* p. 20.

Milvus regalis. *Briss. Orn. I.* p. 113.

Kite or Glead. *Will. Orn.* p. 74.

Kite. *Penn. Britt. Zool. I.* p. 185. *Aret. Zool. 2.* p. 225.

Milan Royal. *Buff. Av. I.* p. 197. t. 7.

Suecis Glada. *Scavis* Glanta.

Habitat ubique vulgaris.

Notissima Avis, in *Fauna Suec. Linn.* descripta. Ex volatu altiore serenam tempestatem, ex depressiore autem et clamore pluviosam praedicunt ruricolae.

12. *FALCO ater*, cera pedibusque flavis, corpore supra fusco-nigro, capite et subtus albedo, cauda forficata. *Lath. Ind.* p. 21.

Milvus niger. *Briss. Orn. I.* p. 117.

Le Milan noir. *Buff. Av. I.* p. 205.

Habitat in boreali Suecia. *Mus. Grill.*

13. *FALCO gentilis*, cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. L. S. N. XII. T. I. p. 126. *Fn. Su.* 58. *Lath. Ind. I.* p. 29.

F. gen-

F. gentilis. *Briss. Orn. I.* p. 98.

Genil Falcon. *Will. Orn.* p. 30. *Penn. Britt. Zool. I.* p. 181. t. 21. 22. *Aret. Zool. 2.* p. 205.

Anour. *Buff. Av. I.* p. 230. t. 12.

β. Falco dubius. *Mus. Caroll. 2.* t. 26.

Suecis Falck.

Habitat per totam Sueciam et Finlandiam licet rarius, in alpinis Dalekarlicis vulgarior.

Avem non nisi semel vidi. Differunt descriptiones ab ill. a LARSS' in *Fn. Su.* data, quam secundum specimina Dalekarlica forte confecit, et accuratiff. LACHM, quam a Speciminibus in Scania et Finlandia captis concinnavit, utramque ideo adpono.

Magnitudo Gallinae aut Corvi. *Pedes*, *Cera*, *Iris* oculorum flava. *Corpus* totum cinereum maculis fuscis. *Cauda* cinerea fasciis quatuor transversis fuscis. *Capitis* pennae nigrae lateribus ferrugineis; subtus flavescens maculis raris oblongis fuscis sub gula, collo, pectore et abdomine, adhuc angustioribus in femoribus. *Remiges* fusci a latere nudo, at interiori latere albidum cum punctis cinerascens et fasciis fuscis 5. l. 6. *Rectrices* extra et subtus omnes fuscae fasciis latis 5. l. 6. nigricantibus, aequalibus, apice obsoletis; rectrices subtus albedo-flavescens lineolis longitudinalibus raris fuscis. *Fn. Su.* l. cit.

Longit. 21½ poll. *Pond.* 1½ libr. *Rostrium* coeruleo-fecenti-nigrum. *Cera*, *Iris* flava. *Nares* rotundatae. *Pedes* flavi scutellis 14 antice in tibiis, longitudine fere caudae, antice ad dimidium fere plumati, pollice nudi. *Ungues* nigri, grandes, subtus plani, margine ad latera elevato. *Cauda* lata et longa semipedem fere ultra alas. *Remiges* 21. *Color* supra cinereo-fuscus, omnibus pennis margine dilutioribus, subtus et femora exalbida cum

E 2

tinctura

tinctura dilutiore fuscescente cum macula longitudinali fusca in quavis penna; in collo et pectore latiore, in femoribus angustissima. In remigibus 10 ad 15 variationes ex albo et fusco subtus, quod et superae licet minus bene observatur, fusco angustiore, excepto extremo quod latius. Rectrices apice alidae, dein 10 ad 15 variationes ex fusco et fusco-cinereo vel fusco-flavescente, e quibus fuscum extremum et huic vicinum fusco-cinereum majorem habent latitudinem. *LACHZ in adversar.*

In specimine nostro *Cera* virefcens et femora ferruginea, praeterea Avi a *LACHZ* descriptae similis.

14. *FALCO Subbuteo*, cera pedibusque flavis, dorso fusco, nuca pallida, abdomine pallido maculis oblongis fuscis. L. S. N. XII. T. I. p. 127. Fn. Su. 59. crisso femoribusque rufis. Lath. Ind. I. p. 47.

Dendro-Falco. Briff. Orn. I. p. 109.

Hobby. Will. Orn. p. 85. Penn. Britt. Zool. I. p. 197. Arct. Zool. 2. p. 227.

Hobreaux. Buff. Av. I. p. 277. t. 17.

Sueci Lärkfälck.

Habitat in Scania, Westrogothia et Finlandia, in arboribus nidificans.

Foeminae *Rostrum* coerulefcens. *Cera* flava. *Palpebrae* luteae. *Iris* rufescens. *Sapercilia* alba. *Nares* orbiculares. *Dens* versus apicem mandibulae superioris neutus, cui in inferiore respondet sinus insignis. *Caput* nigro-fuscum, nuca dilute fusca, gula, latera capitis et initium colli pallide ferruginea. *Abdomen* ejusdem coloris cum macula magna oblonga, nigra raris in singula penna. *Femora* ferruginea. *Crissum* pallide ferrugineum. *Alae* cauda longiores. *Remiges* ex nigro-coerulefcenti-cinerei exceptis primoribus nigris, apicem margine albicante, omnes praeter intimum maculis 5—

10. in latere interiore pallidis. *Cauda* complicata acutiuscula e rectricibus mediis longioribus subtus maculatis, exceptis intimis immaculatis. In singula rectrice maculae 9 pallide ferrugineae praesertim in interiore latere conspicuae; caeterum supra ex nigro-coerulefcenti-cinereae, qualis etiam *Uropygi* color. *Pedes* nudi, lutei, breves. *Pennae* omnes totius avis versus basin cinereo-coerulefcentes. *LACHZ*, qui praeterea in adversariis adnotavit, se vidisse marem et pullum volando jam aptum d. 10. Junii cui cera et palpebrae viridi-coeruleae vel aeruginae. Ex eo autem, quod praeter diversitatem magnitudinis et ponderis nihil addidit, concludere licet praecedentem descriptionem utriusque sexui competere. *Max* long. 10½ poll. pond. 15½ semunc. *Coem.* long. 11½ poll. pond. 20½ semunc.

15. *FALCO Lithofalco*, cera lutea, corpore fusco-cinereo, subtus rufescente striis fuscis, rectricibus apice nigricantibus albo terminatis, lateralibus nigro-fasciatis. Lath. Ind. I. p. 47.

Lithofalco. Briff. Orn. p. 101.

Stone Falcon. Will. Orn. 80.

Le Rochier. Buff. Av. I. p. 286.

Habitat . . . Mus. Grill.

Magnitudo Tinnunculi. *Rostrum* coerulefcens, *Iris* lutea. *Rachides* pennarum nigrae. Est *Falco Nifus* biennis *BECHSTEIN*.

16. *FALCO Buteo*, cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido maculis fuscis. L. S. N. XII. T. I. p. 127. Fn. Su. 60. cauda fusco-fasciata. Lath. Ind. I. p. 25.

Buteo. Briff. Orn. I. p. 116.

Common Buzzard or *Puttock*. Will. Orn. p. 70.

Buzzard.

Buzzard. Penn. Britt. Zool. I. p. 188. t. 25. Arct. Zool. 2. p. 205.

Buse. Buff. Av. I. p. 206. t. 8. *)

Sueci Quidfogel, Muswäg.

Habitat frequens Upsaliae ad Gottunda. Pulli medio Julii mensis sepibus insident, continuo ejulatu, unde Uplandia Quidfogel dicitur.

Magnitudo Gallinae (longit. sesquipedis) Rostrum, Ungues nigra. Cera pedesque flavi. Tota avis capite, collo supra fusca; pennarum marginibus ferrugineis, (non in omnibus speciminibus, sed modo pallidiore fusco notatis) Subtus tota avis ex albido flavescens maculis longitudinalibus fuscis, quarum posteriores fere cordatae. Iris exalbida (subcinerea). Membrana nictitans coerulefcens. Remiges nigricantes, latere interiore inferne albi. Horum 1-4. absque (non semper), reliquae cum fasciis 5-8. obscurioribus ab utroque pennae latere conspicuis. Rectrices nigro-cinereae aequales, fasciis plurimis (sex numeravimus) obscurioribus, praesertim supra conspicuis, apice obsolete ferrugineae (in nostro specimine albidae). Crissum et Tectrices caudae subtus niveae, in nostro specimine maculis majoribus duorum ordinum nigris.

17. FALCO fasciatus, cera pedibusque luteis, supra testaceo nigroque fasciatus, subtus albidus lineis longitudinalibus nigris.

Falco brunneus. Bechstein Anhang, p. 679. t. 2.

Habitat in Scania rarius.

Magnitudo circiter Tinnunculi l. 15 poll. long. Rostrum maxilla superiore plumbea valde curva, denticulo utrinque insigni, inferior albida. Frontis et Gula exalbida

Iris

*) Haec figura me iudice potius strigem refert quam Falconem.

strigis vix observandis nigris. Pileus et nucha testacea strigis nigris majoribus. In dorso et alis pennae omnes fasciatae, fasciis testaceis nigrisque alternis, apex vero plerumque pallidior. Alae cauda longiores. Remiges primores nigri apice pallidi, interiore latere maculis testaceis. Rectrices ferrugineae fasciis 10 nigris, ad apices margine albido et supra hunc macula magna nigra. Subtus alae albae obscure fasciatae. Pectus et abdomen exalbido-testacea lineis longitudinalibus nigris. Femora et Crissum alba strigis parvis nigris.

18. FALCO Tinnunculus, cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pectore strigis fuscis, cauda rotundata. L. S. N. XII. T. I. p. 127. Fa. Su. 61. Lath. Ind. 2. p. 41.

Tinnunculus. Brill. Orn. I. p. 115.

Kestrel, Stannel, or Stonegall. Will. Orn. p. 34.

Kestrel. Penn. Britt. Zool. I. p. 195. Arct. Zool. 2. p. 226.

Cresserelle. Buff. Av. I. p. 230. t. 18.

Sueci Kyrkofalck, Duf Hök.

Habitat in turribus et muris praecaltis, non minus quam in arborum excellorum cavis rupiumque antris. Ova ponit 4-5. albida maculis rubentibus crebris. Columbas praedatur nudacillimus. In superiori Suecia advenit deliquescente nive, et in Septembri abit.

Mas 7-8 unc. pond. Caput canum lineis tenuissimis nigris striatum, ex rachi singulae pennae nigra. Rostrum breve, curvum, coeruleo-atrum, cuius maxilla superior in medio utrinque denticulo, uti inferior sinu notata. Cera flava uti et regio nuda circum oculos. Nares orbiculares puncto flavo centri. Gula albida. Dorsum et tectrices alarum rufae seu cinnamomeae, singula pluma versus apicem macula nigra acuta notata.

Pectus,

Pectus, Venter et Femora dilutius rufa maculis longitudinalibus nigris, linearibus in pectore, ovatis in abdomine, miliaribus rarioribus in femoribus. *Uropygium* canum. *Cristum* album immaculatum. *Pedes* lutei parum sub genua plumati. *Remiges* 22, quorum secundus reliquis longior, dein sensim brevioribus: omnes supra sulci subtus cani, antice immaculati (exceptis secundariis parum ferrugineis) postice sinibus seu maculis albidis septem vel octo. *Rectrices* longae, lateralibus brevioribus, omnes cauae lineis s. l. 9. nigris, praeter medias, quae totidem maculis obscuris ornantur, versus apicem fascia lata nigra notatae. *Tectrices* alarum inferiores albae maculis parvis nigris. *Rachis* remigum et rectricum supra nigra, subtus alba.

Junior forte Avis cui caput brunneum pennae basi canis et cauda praeter fasciam nigram immaculata.

Form. 11. unc. pond. *Caput* rufescens striis nigris, *Corpus* magis obscurum. *Rectrices* capiti concolores apice macula nigra terminatae et singulae lineis nigris 9. l. 10. transversis notatae, intermediae binae apice uti reliquae non albae.

Aliter nonnihil Avem describit *Gen. a Linnæ* in *Fn. Suec.*

19. *FALCO Lanarius*, cera lutea, pedibus rostroque coeruleis, (pileo vitta albidâ cincto) corpore subtus maculis nigris longitudinalibus. *L. S. N. XII. T. I. p. 129. Fn. Su. 62. Lath. Ind. I. p. 33.*

Lanarius. *Briss. Orn. I. p. 105.*

Lanner. *Will. Orn. p. 82. Penn. Britt. Zool. I. p. 182. t. 25. Arct. Zool. 2. p. 225.*

Habitat in sylvis, nidificat in arboribus rupibusque rarior avis et migratoria.

Front

Front testacea. *Venter* obscure ferrugineus. *Pileum* cingit linea albidâ supra oculos incipiens et verticem a nucha distinguens. *Cera* lutea, in juniore ave virescenti flava. *Gula* alba et aurium regio macula nigra distinctae. *Tota avis* subtus cinereo-albidâ (in juniore sordide lutea) maculis fulcis infecius acutis. *Dorsum* et *tectrices* alarum fusco-nigricantes, marginibus pennarum dilutioribus. *Remiges* nigricantes interiore latere ferrugineo-maculati. *Cauda* longa maculis oppositis albis, subtus fusco-fasciata. *Pedes* breves coerulei, tibiâ ultra medium vestitis.

Obs. *Anno Lanarius* Brunn. *Orn. Bor. p. I. ad Falconem Merulinum* Penn. *Britt. Zool. I. p. 200. pertinet?*

20. *FALCO Gyrfalco*, cera coerulea, pedibus luteis, corpore fusco, subtus fasciis cinereis, caudae lateribus albis. *L. S. N. XII. T. I. p. 130. Fn. Su. 64. Lath. Ind. I. p. 32.*

Gyrfalco islandus. *Briss. Orn. I. p. 108.*

Falco Islandus fuscus. *Brunn. Orn. bor. p. 2. n. 9?*

Iceland. Falcon. *Penn. Arct. Zool. 2. p. 216.*

Ge'fauit d'Islande. *Buff. Av. I. p. 241. loc. Penn.*

Habitat rarius in Suecia, columbis infestus.

Avem haud videre licuit, descriptionem ex Pennant addo.

Rostrum validum, valde curvum, dente acuto versus apicem. *Cera* coerulelescens. *Caput* pallide ferrugineum striis obscurioribus. *Collum, Pectus, Abdomen* alba maculis cordatis. *Femora* alba fasciis brevibus transversis obscure fulcis. *Dorsum* et *tectrices* alarum fusca albo-maculata marginata. *Remiges* primores sulci exteriore latere pallide rufo irrorati: interiore albo-fasciati. *Rectrices* fasciis 14. pluribusve angustis fulcis albis.

albisque. *Alae* repositae caudae fere longitudine. *Pedes* validi, lutei (plerumque coerulescentes alii.)

21. *FALCO aeruginosus*, cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis. L. S. N. XII. T. I. p. 130. Fn. Su. 66. Lath. Ind. I. p. 25.

Circus palustris. Brill. Orn. I. p. 115.

Moor Buzzard. Will. Orn. p. 75. Penn. Britt. Zool. I. p. 192. t. 27. Arct. Zool. 2. p. 225.

Buzard. Buff. Av. I. p. 213. t. 10.

Sueciis Hönstjuf.

Habitat in sylvis paludosis inque Carice l. Scirpo nidificans.

Rosstrum nigrum. *Cera* luteo-virescens. *Irides* luteae. *Corpus* testaceo-fuscum cum tinctura ferruginea. *Vertex*, *Gula*, *Axillae* flavae. *Tibiae* longae, tenues, nudae, flavae. *Varietates* observavit Pennant capite et gula albis, etiam macula tectricum alarum alba.

22. *FALCO palumbarius*, cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fusco, reatricibus fasciis pallidis, superciliis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 130. Fn. Su. 67. Lath. Ind. I. p. 29.

Astur. Brill. Orn. I. p. 91.

Goshawk. Will. Orn. p. 85. Penn. Britt. Zool. 1. p. 184. t. 24. Arct. Zool. 2. p. 204.

Autour. Buff. Av. I. p. 230. t. 12.

Sueciis Hök, Dufhök.

Habitat ubique per Sueciam, praecipue sylvestrem. Nidificat in arboribus. *Ova* 5 rufo-maculata. D. TENORMANI Nov. Act. Suec. 1783. p. 45.

Ceram omnino luteam vidit Briffon, Leche, Tengmalm; luteo-rufoem Willoughby, Pennant, etiam coerulescentem Bränniche, nigram margine luteo à Linné.

Magni-

Magnitudo circiter Gallinae. *Rosstrum* coerulescenti nigrum. *Caput* fuscum, uti et *Colli* superior pars et *Dorsum*. *Linea* supra oculos albida. *Nucha* albo-maculata. *Gula* alba lineis longitudinalibus fuscis. *Pectus* et *Abdomen* albida, lineis transversis subundulatis fuscis. *Cauda* longa cinereo-fusca fasciis transversis obscurioribus remotis.

Junior forte fuit, quam ita in Adversariis descripsit LEXEL. *Cera*, *Iris*, *Pedes* ac *Digiti* lutei. *Tibiae* antice ad medium vestitae. *Color* supra fusco-cinereus, sed *caput* et *fasciae caudae* obscuriores. In *nucha* albedo basos pennarum translucet. In *remigibus* maculae majores nigrae 8. 7. 6. quae in supina primorum parte, vix autem in secundariis conspiciuntur. *Rectrices* omnes extimo albae, dein fasciis nigris 5. l. 6. totidemque cinereis; haec vero obscuriore tinctura quasi marmoratae. Tota avis subtus alba, at in collo, abdomine, femoribus et sub alis lineae transversae nigricantes. *Remiges* 2. 3. 4. 5. 6. versus apicem sinu quasi excisi.

In pullis maculae pectoris sunt longitudinales ÖDMAN.

23. *FALCO Nisus*, cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus. L. S. N. XII. T. I. p. 130. Fn. Su. 68. Lath. Ind. I. p. 44.

Accipiter. Brill. Orn. I. p. 90.

Sparrowhawk. Will. Orn. p. 86. Penn. Britt. Zool. I. p. 198. Arct. Zool. 2. p. 226.

Epervier. Buff. Av. I. p. 225. t. 11.

Sueciis Sparfhök.

Habitat in sylvis, turribus, rupibus, saepe etiam in majorum hortorum sepibus.

Inter

Inter Suecicos hujus generis minimus. Caput, Dorsum, Alae supra foeminae fusca, maris cana. Pectus, Abdomen et Femora foeminae allida, maris testacea lineis transversis angustioribus fuscis undulatis vel fulvis, in foemina duplo fere majore frequentioribus. Remiges fusci. Rectrices longae, fuscae, fasciis 5 nigris.

S T R I X.

Rostrum aduncum, absque cera plerisque.

Nares pennae setacea recumbentibus tectae.

Caput grande, auribus oculisque magnis.

Lingua bifida.

24. STRIX Bubo, capite auriculato, corpore rufo. L. S. N. XII. T. I. p. 131. Fa. Su. 69. Lath. Ind. I. p. 51.

Bubo. Briss. Orn. I. p. 159.

Great Horn-Owl, or Eagle-Owl. Will. Orn. p. 99.

Eagle-Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 202. t. 29. Arct. Zool. 2. p. 228.

Le Duc ou grand Duc. Buff. Av. I. p. 332. t. 22.

Suecic UF, Horuuf, Berguf.

Habitat per Sueciam vulgaris; nidificat in petris sylvaticis praeruptis, arboribus praecaltis, turribus et ruderatis. Vicit Lepotes, Mures, Talpae, Vespertiliones ac varia amphibia.

Magnitudo fere Aquilae sed torosior multo. Rostrum nigrum, basi et apice mandibulae inferioris emarginatis. Cera nigra setis fere occultata. Nares in cera ad marginem hujus extensae, patulae. Iris aurantia. Corpus testaceo-rufum lineolis transversis nigris undulatis, longitudinalibus majoribus itidem nigris. Cauda brevis, sed alis longior, fasciis sordidis. Alae maculis nigris asperis. Tibiae et Pedes crasso vellere vestiti.

25. STRIX Scandinica, capite aurito, corpore albido. L. S. N. XII. T. I. p. 132. Fa. Su. 70. nigra maculis asperso. Lath. Ind. I. p. 53.

Bubo lapponicus. Briss. Orn. I. p. 142.

Bubo Scandinavus. Rudb. Av. pict.

Scandinavian Eared Owl. Penn. Arct. Zool. 2. p. 257.

Habitat in Alpibus Lapponicis.

Magnitudo Meleagridis. Corpus totum album nigris maculis adpersum. Similis Strigi Nyctene, ni supercilia aurita adessent in hoc Bubo. Avis non nisi ex icone picta Rudbeckii nota, et forte praecedentis tantum varietas.

26. STRIX Otus, capite auriculato pennae sex. L. S. N. XII. T. I. p. 132. Fa. Su. 71. Lath. Ind. I. p. 55.

Otus. Briss. Orn. I. p. 142.

Horn-Owl. Will. Orn. p. 100.

Longeared Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 203. t. 30.

Arct. Zool. 2. p. 229.

Le Hibou ou moyen Duc. Buff. Av. I. p. 342. t. 23.

Suecic Hornuggla.

Habitat in sylvis, cavis arboribus et domibus desertis.

Magnitudo Gallinae. Rostrum nigrum. Ad aures fasciulae sex pennae erectae in medio longitudinaliter fuscae, extus sordide luteae, intus pallidiores maculis nigris. Dorsum et Alae supra ex albo, cinereo flavo et fulco variegatae. Pectus et Abdomen sordide lutea maculis oblongis fuscis et transversis pallidis ex apicibus pennarum albidis. Cauda subtus cinerea obscure fasciata, supra ex rufo et nigricante fasciata. Pedes lanati.

27. STRIX Scops, capite auriculato penna solitaria. L. S. N. XII. T. I. p. 132. Lath. Ind. I. p. 56.

Scops. Briss. Orn. I. p. 144.

Little Horn-Owl. Will, Orn. p. 201.

Le Scops ou petit Duc. Buff. Av. I. p. 555. t. 24.

Habitat in Suecia septentrionali. Mus. Grill.

Longit. circa 8 poll. Varius ex griseo, rufo, fulco et nigro, supra autem fuscum, subtus griseum praedominat. *Aurium pennae* solitariae in mortua ave vix observandae. *Remigium* et *Bectricum* fasciae rufescentes et fuscae. Variat ceterum coloribus pro aetate.

* * capite laevi. *)

29. *Strix Nyctea*, iridibus flavis, corpore vel toto albo vel albo fulco-maculato fasciatove, circulo oculorum albo. Tengmalm: N. Act. R. Ac. Sc. Su. 1793. p. 264.

St. Nyctea, capite laevi, corpore albido maculis lunatis distantibus fuscis. L. S. N. XII. T. I. p. 152. Fabr. Fn. Groenl. 56. Lath. Ind. I. p. 57.

St. Nyctea, capite laevi, corpore albido. Fn. Su. 76.

Strix alba freti Hudsonis. Brill. Orn. I. p. 152?

Sunny Owl. Penn. Arct. Zool. 2. p. 233.

Harfang. Buff. Av. I. p. 587.

Suecia Harfang.

Habitat in superioris Sueciae provinciis minus vulgaris.

Gallo duplo major. *Rostrum* nigrum. *Irides* flavae. *Caput* fere album. *Corpus* totum fere niveum. *Pectus*, *Abdomen* et *Tectrices* alarum lineis transversis undulatis fuscis. *Remiges* nivei, (4 priores margine serrati) secundum longitudinem duplici ordine macularum parvarum subrotundarum, cinerearum, quibus et interdum

tertius

*) *Strigum* Historiam egregie reformavit Cel. TENGMALM in Nov. Act. R. Ac. Scient. Suec. 1793. quemque in sequentibus sequor.

tertius macularum ordo accedit. *Cauda* nivea nigris minimis punctis vel maculis tenebre notatur. Variat maculis lunatis fuscis. Quo adultior Avis eo magis albescit, donec tota nivea. Fabr. Fn. Groenl. I. cit.

29. *Strix literata*, corpore supra griseo, albo-maculato, subtus albo, striis longitudinalibus nigris, iridibus flavis. Tengmalm, l. c. p. 267.

St. nebulosa, capite laevi, corpore fulco albido undulatum striato, remige sexto longiore apice nigro. Lath. Ind. I. p. 58. an?

Barred Owl. Penn. Arct. Zool. 2. p. 234. t. 11. f. 120. an?

Habitat in superiore Suecia.

Magnitudo praecedentis, capite fere majore. *Circulus* oculorum sordide albus, ad marginem vero plumis ex albo cinereo et nigro variegatis. *Caput* ex albo et fulco-griseo varium; linea fusca a basi mandibulae superioris descendente. *Dorsum* et *tectrices* Alarum griseae maculis albis notatae. *Alae* ex albo et griseo tessellatae, singulo remige albo et fulco-griseo quasi fasciato. *Subtus* alba maculis oblongis vel lituris nigris. *Tibiae*, *Anus* *Criussum* alba. *Cauda* alis longior, griseo et albo fasciata, *rectricibus* albo et griseo tessellatis.

30. *Strix lapponica*, corpore supra ex fulco, cinereo, ferrugineo, albidoque maculato, subtus cinereo canescentique variegato, iridibus flavis, gula barbata. Mus. Caroll. Fasc. 5. tab. —

Habitat in Lapponia. SPARRMANN in litteris.

Magnitudo fere Bubonis. *Caput* inauriculatum. *Rostrum* flavum. *Facies* cinerea fulco-undulata. *Pileus* et *Cervix* etiam, sed densius. *Dorsum* fuscum. *Tectrices* alarum quoque, sed cinereo-variegatae et striatae. *Remiges*

miges primores cinerei fusco - fasciati, secundarii fusco cinereoque lineati. Rectrices longae cinereo, fasciis lineisque transversis fuscis. Subtus pallide cinerea maculis longitudinalibus et striis transversis copiosis fuscis.
 COM. H. G. WACHSMEISTER.

51. *Strix Aluco*, capite prægrandi, iridibus nigris, corpore griseo - ferrugineo nigro alboque vario. Tengmalm, l. cit. p. 270.

Ma.

St. Aluco, capite laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus serratis. L. S. N. XII.

T. I. p. 132. Fn. Su. 72. Lath. Ind. I. p. 59.

Ulula. Briss. Orn. I. p. 148.

Grey Owl. Will. Orn. p. 103.

Brown Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 210. t. 32.

Hulotte. Buff. Av. I. p. 359.

Succis Harugla.

Foemina.

St. stridula, capite laevi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 133. Fn.

Su. 77. Lath. Ind. I. p. 58. Brünn. Orn. p. 7.

Strix. Briss. Orn. I. p. 146.

Common brown Owl. Will. Orn. p. 102.

Tawny Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 208. Arct. Zool. 2. p. 237.

Chat-huant. Buff. Av. I. p. 362. t. 25.

Succis Skrikugla, Nattugla.

Habitat in cavis arboribus, horreis etc. mures, aviculas etc. consumens.

Mac. Caput a griseo - albo et nigro maculatum. Rostrum in aliis albidum in aliis flavescens marginibus nigris.

gris. Nares juxta ceram (LACHZ). Iris alii fusca, alii nigra. Dorsum testaceum nigro et griseo maculatum, quasi arena conspurcatum. Maculae albae ad latera dorfi et in tectricibus alarum. Remiges 1. 2. 3. sensim longiores et margine exteriori serrati, omnes fasciis fuscis quasi tessellati. Cauda alis longior, grisea, fasciis 5 sub-fuscis exceptis 2 mediis. Abdomen albicans maculis oblongis griseis et nigris, et hæc lituris transversis saepius marginatae. Pedes albi punctis nigricantibus.

Foemina minor nonnihil, ex fusco rufo et nigro variegata ubi mas testacea, griseo et nigro pictus. Abdomen magis flavescit. Pro aetate uterque sexus variat.

52. *Strix flammea*, iridibus flavis, corpore supra fulvo cinereo intermixto, guttulis albis notato, subtus albo ochraceo punctulis fuscis. Tengmalm l. cit. p. 274.

St. flammea, capite laevi, corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus. L. S. N. XII. T. I. p. 133. Lath. Ind. I. p. 60.

St. capite laevi, corpore luteo. Fn. Su. 73.

Aluco. Briss. Orn. I. p. 147.

Common Barn-Owl, or White Owl, or Church-Owl. Will. Orn. p. 104.

White Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 206. Arct. Zool. 2. p. 235.

L'Effraie ou la Frefaie. Buff. Av. I. p. 366. t. 26.

Habitat in horreis, templis, ruderatis. Nidificat in turribus, muris, cavis arborum, muribus inprimis victitans.

Magnitudine *Stridulae* cedit. Caput et totum corpus supra luteum vel fulvum griseo tenuissime undulatum et albo guttatum. Maculae vero hæc ambitu nigro acuminato cinctae; subtus album vel ochraceum maculis

parvis stellatis fuscis sparatis. *Area* oculorum vel nivea, si corpus subtus album, vel pallido flavescens immaculata. *Remiges* exterius flavescentes, interius albi, in singulo maculae 4 nigrae. *Cauda* alis brevior alba, rectricibus margine exteriori leviter flavescente, fasciis tribus ad 5 fuscis.

33. *Strix Ulula*, capite subaurito, iridibus flavis, corpore fulvo vel ochraceo, maculis longitudinalibus fuscis vario, remigibus arcis nigris luteisque alternis notatis, cauda fasciata. Tengmalm L. cit. p. 279.

St. Ulula, capite laevi, corpore supra fusco-albo maculato, rectricibus fasciis albis linearibus. L. S. N. XII. T. I. p. 155.

St. Ulula, capite laevi, supra rufescens maculis longitudinalibus fuscis, subtus albida lineolis fuscis, cauda fasciis fuscis. Lath. Ind. I. p. 60.

St. brachyotos, capite aurito penna solitaria, corpore fusco subtus flavescente longitudinaliter striato, rectricibus fuscis, intermediis 4 macula lutea, pupilla fusca. Lath. Ind. I. p. 55.

Grey Owl. Will. Orn. p. 103.

Noctua major. Brill. Orn. I. p. 149.

St. Aluco. Brünn. Orn. hor. p. 6.

St. stridula. N. Act. R. Ac. Sc. Su. 1783. p. 47.

St. Arctica, capite inaurito, corpore ferrugineo, supra nigro-maculato, subtus lineolis fuscis striato, orbitis fasciaque subalari nigris. Mus. Carlsson. 3. t. 51.

Brown Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 210. t. 52. Arct. Zool. 2. p. 256.

Shorteared Owl. Penn. Britt. Zool. I. p. 204. t. 51.

Chouette ou Grande Chouette. Buff. Av. I. p. 372. t. 27. Suecis Brand Uglä.

Habitat

Habitat passim per totam Sueciam et Finlandiam.

Magnitudo *Cornicis*. *Irides* crocae. *Oculorum area* juxta oculum nigra, dein alba ad marginem vero variegata ex punctis vel atomis nigris, fuscis et flavis. *Terrefacta* dum pennas capitibus more generis erigit, una vel altera harum supra utrumque oculum longior et truncata observatur, in tranquilla ave vel mortua difficulter. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Pectus*, flavo-ferruginea et longitudinaliter nigris striis vel maculis picta. *Alae* cauda longiores, subtus albidae macula vel fascia subalari nigrescente, ad apicem fasciis 3—4 obscuris, supra dorso concolores fasciis nonnullis nigris. *Remiges* 1, 2, 3, subaequales. *Cauda* brevis dorso pallidior fasciis 4 l. 5 fuscis. Alia specimina subtus magis cinerea. *Foenina* mari similia, sed in rectricibus et scapularibus maculas albas habet, et remiges secundarii apice albescent. *Tengmalm*.

Ocelli rectricum, qui in *St. brachyoto* adesse debent, in nostra ave desiderantur, praeterea similes.

34. *Strix funerea*, capite fusco-nigro punctis albis, iridibus flavis, corpore supra fusco albo-maculato, subtus albo fasciis transversis fuscis, cauda longa. Tengmalm L. cit. p. 284.

St. funerea, capite laevi, corpore fusco, iridibus flavis. L. S. N. XII. T. I. p. 155.

St. Ulula, capite laevi, corpore supra fusco albo-maculato, rectricibus fasciis albidis. Fu. Su. 78.

St. funerea, capite laevi, corpore fusco albo-maculato, subtus albo fuscoque fasciolato, remigibus maculis albis variegatis, rectricibus albo fasciatis. Lath. Ind. I. p. 62.

St. canadensis. Brill. Orn. I. p. 151. *freti Hudsonis*, ibid.

F 2

Hawk

Hawk-Owl. Penn. Arct. Zool. 2. p. 234.

Little Hawk-Owl. Edw. Av. 2. t. 62.

Chouette ou Grande Cheveche de Canada. Buff. Av. I. p. 391.

Habitat in frigidioribus Sueciae provinciis.

Magnitudo circiter falconis Nisi, a rostro ad caudae apicem 16 — 17 poll. *Rostrum* pallide flavescens. *Irides* flavae. *Caput* nigro-fuscum punctis l. lineolis albis, quae puncta in collo confertissima. Linea pone oculos incipiens nigra ad latera colli descendens. *Scapulares* et *tectrices* alarum maculas habent majores albas, quae ad latera dorsi lineam fere formant oblongam albam. *Uropygium* ferrugineo-fuscum maculis albidis. *Gula* nigra. *Jugulum* album striis fuscis. In sterno est quasi collare ex albo et fusco varium. *Pectus* et *Abdomen* albo fusco transversim undulata. *Cauda* longa, angusta, cuneata, griseo-fusca fasciis angustis albis picta, subtus alba fasciis fuscis. *Pedes* laevigati alba fasciis transversis fuscis ad unguis usque tectae sunt. Mas foemina major, colore obscuriore maculisque magis distinctis.

35. *Strix Noctua*, capite maculato, iridibus flavis, corpore supra griseo-fusco albo-maculato, subtus albo fusco-maculato, alis albo et nigro tessellatis. Tengmalm l. cit. p. 239.

Strix capite laevi, corpore griseo maculis piliformibus albis, iridibus flavis. Idem 1785. p. 46.

St. funerea, capite laevi, corpore fusco, iridibus oculorum flavis. Fu. Su. 75.

St. capite laevi, corpore fusco, iridibus oculorum fulvis. Fu. Su. 74.

St. Tengmalmi, capite laevi, corpore griseo-maculis piliformibus albis, iridibus flavis. Lath. Ind. I. p. 64.

Noctua

Noctua minor. Will. Orn. p. 69. Briff. Orn. I. p. 150.

St. Passerina, capite laevi, remigibus quinque ordinum. Lath. Ind. I. p. 65.

Little Owl. Will. Orn. p. 105. Penn. Britt. Zool. I. p. 211. Arct. Zool. 2. p. 236.

La Cheveche ou petite Chouette. Buff. Av. I. p. 377. t. 23.

Succis Perlugla.

Habitat in ruderatis, lapidicinis et circa fodinas derelictas, magis quam caeterae diurna.

Obs. Cel. TENGMALM hanc, quae sine dubio est *Strix Passerina* et Linnei et reliquorum Ornithologorum, a *passerina* distinguit. *Strigem funeream* cum sua *passerina* confudisse à LINNEO facile largior. Ab utraque multum diversa est *the little Owl*, Edw. Av. 5. p. 39. t. 228. quam *passerinam* facit Cel. LATHAM. Et propria et aliorum experientia novi, Avem nostram magnitudine multum differre. Testimonium Rev. BOCK apud me parum valet. Foeminae magnitudinem Columbae risoriae, Mari Turdi Merulae tribuit Cel. BEREK *Vög. Kurlands* p. 27. Novem cum dimidio pollicis et caudae $3\frac{1}{2}$ poll. ait Cel. BECHSTEIN *Vög. Deutschl. I.* p. 368. Octo et $\frac{2}{3}$ LECHE, et sex et octo poll. longitudine habui. Coloribus et ordine horum ita conveniunt, ut utraque descriptio Cel. TENGMALM vicissim majori et juniore quadret. Interea cum fieri possit, ut quam dixit *passerinam*, diversa sit species, quamvis ego dubito, utramque verbis Cel. Viri assero. Nostram etiam addo descriptionem in paucis diversam. *Longit.* ab apice rostri ad caudae apicem 6—8 poll. Tota avis supra fuliginoso-fusca maculis albis guttatis, in capite crebrioribus et minoribus. *Tempora* alba. *Irides* flavae. *Rostrum* pro magnitudine Avis magnum, basi nigrescens, caeterum flavum. *Remiges* supra albo-maculati, maculis numero incerto, subtus albo-fascia-

fasciati, 1 et 2 margine exteriori serrulati, 5 vix. *Cauda* alia poll. 1 circiter longior aequalis, dorso concolor, rectricibus vel fasciis 5 vel totidem paribus macularum albarum. *Subtus* tota Avis alba maculis oblongis irregularibus fuscis. *Digiti* ad ungues fero plumosi-obsoleto maculati, subtus lutei. Nos.

Magnitudo Merulae, corpore vero crassiore. Longit. 8—9 poll. *Caput* griseo-fuscum punctulis albis. *Area* oculorum alba, fusco hinc et inde immixto. *Corpus* supra fusco-griseum, maculis albis pisi et quod excurrit magnitudine. *Alae* complicatae pagina exteriori tessellatae apparent e maculis albis et fuscis alternatim positis, (conf. N. Act. Suec. 1735. p. 46. ubi nonnihil diversa descriptio) remiges primores margine inferiore vel exteriori serrati sunt. *Pectus* et *Abdomen* alba, maculis oblongis, irregularibus fuscis in pectore confertissimis, abdomine vero rarioribus. *Cauda* brevis, supra fusca: rectrices fuscae, tæniis albis, medio interruptis, hinc quasi per paria positis. *Pedes* lanati albi. *TENGMAHM.*

36. *Syrax passerina*, capite laevi, iridibus pallide flavis, corpore supra fusco-griseo, albo-maculato: subtus albo, fusco immixto, Area oculorum corpori concolore. *Tengmahm* l. cit. p. 294.

St. Acadienfis, capite laevi, regione periophthalmica cinerea, corpore supra rubro-fusco maculis albis, subtus fordide albo maculis longitudinalibus ferrugineis. *Lath. Ind. I. p. 65.*

Die Acadische Eule. *Bechf. Lath. I. p. 157. t. 5. f. 2.*

Habitat in superiori Suecia.

Magnitudo exacte Pyrrhulae, capite vero majori, caudaque brevior. Longitudo 5—6 poll. *Caput* nigro-fuscum, supra punctis striisve tenuissimis hinc et inde

inde albis, quo circa aures oculosque confertiora sunt. *Area* oculorum capiti concolore nec radius ille, quo caeterae notantur species, apparet. *Dorsum* et *Alae* griseo-fusca, maculis lentis vel pisi minoris magnitudine albis. *Alae* complicatae nigro-fuscae apparent, sed cum extensae in medio singuli remigis maculae 4, 5 pisiiformes albae sunt. *Pectus* et *Abdomen* alba, fusco quodam colore irregulariter immixto. *Cauda* cinereo-fusca tæniis tribus distinctis, angustis albis, linearum ad instar. *Tengmahm.*

L A N I U S.

Rostrium teretiusculum, dente utrinque versus apicem incurvum; basi nudum.

Lingua lacera.

57. *Lanius Excubitor*, cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. *L. S. N. XII. T. I. p. 185. Fn. Su. 30. Lath. Ind. I. p. 67.*

Lanius cinereus. *Briss. Orn. I. p. 197.*

The Greater Butcherbird or Mattagefsi. *Will. Orn. p. 87.*

Great Shrike. *Penn. Britt. Zool. I. p. 215. t. 55. Arct. Zool. 2. p. 238.*

Pie-grieche grise. *Bull. Av. I. p. 296. t. 20.*

Succit *Warfögel.*

Habitat passim in sylvestribus. Singulari sonu advenientem Accipitrem indicat, eoque aviculas periculum monet. Ob eandem rationem Falconarii utuntur eo ad Falcones indigitandos, ipse Aviculis, Muribus victitans.

Magnitudo vix Merulae. *Nares* setis fere tectae. *Caput, Dorsum* cana. *Macula* longa nigra a rostro per oculos ad aures. *Gula* et totum corpus subtus album. *Remiges* 1—9 nigri, a basi ad medium fere albi, 10 simili

lis prioribus, sed latere tantum exteriori infra medium albus, 11 - 13 similes primis. *Cauda* cuneiformis. *Rectrices* intermediae nigrae exceptis summis apicibus, laterales quo exteriores eo magis basi et apice albae, ut extremae tantum in medio nigrae. *Pedes* nigri.

Foem. differt tantum lineolis transversis subundulatis pectoris.

38. *Lanius Collurio*, cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. L. S. N. XII. T. I. p. 157. Fn. Su. 81. fig. 31. Lath. Ind. I. p. 69.

Collurio. Briss. Orn. I. p. 200. Mas.

Collurio varius. Ibid. p. 201. Foem.

Lesser Butcherbird. Will. Orn. p. 83. Mas.

Hen Butcherbird. Ibid. p. 89. Foem.

Redbacked Shrike. Penn. Britt. Zool. I. p. 215. Arct. Zool. 2. p. 240.

Écorcheur. Buff. Av. I. p. 305.

Lanius spinitorquus. Bechst. Vög. Deutschl. I. p. 392. t. 16.

Scanis Törnškata.

Habitat in sylvestribus, nidum in frutice non alte conficiens et ova 6 alba rufo-maculata ponens. *Victus* Aviculae, Coleoptera majora, quae spina transfigit, ut commodius dilacerari possint. N. Act. Suec. 1781. p. 85.

Mas. *Rostrum* nigrescens conico-cultratum, maxilla superiore longiore utrinque apice emarginata. *Caput* et *Uropygium* cana. *Dorsum* rufo-testaceum. *Gula* alba. *Venter* a gula ad sterni finem ut et latera corporis dilute rubicundo-alba. *Venter* pone sternum albus. *Linea* a fronte et basi rostri per oculos ad aures nigra, et supra

hanc

hanc linea minor alba. *Remiges* nigricantes 3-8 basi laevissime albi, hinc macula alarum alba. *Rectrices* nigrae, a basi ad medium ut et apicibus extremis omnes albae, exceptis intermediis quatuor omnino nigris. *Pedes* nigri. *Magnitudo* Pyrrhulae.

Foem. *Rostrum* et facies praecedentis, sed magnitudine parum inferior. *Caput* griseo-ferrugineum. *Macula* oblonga sub oculo, apice antrosum verso, rufescens. *Dorsum* rufo-testaceum lineolis transversis nigris in singula penna prope apicem singulis. *Uropygium* griseum. *Pectus* et *Venter* a gula usque albicantia manifesta lutei mixtura, lineolis undulatis crebris. *Abdomen* pallidius immaculatum. *Remiges* nigricantes immaculati. *Rectrices* fuscescentes margine et apice albae exceptis quatuor intermediis unicoloribus; 10 intermediae aequales, extremo utrinque breviora. Adeoque

Mas. rectricibus nigris basi apiceque albis, intermediis quatuor unicoloribus.

Foem. rectricibus fuscescentibus margine apiceque albis, intermediis quatuor unicoloribus.

39. *Lanius rufus*, capite colloque rufis, dorso fronteque nigris, fascia alarum duplici alba. *Peyrouse*, N. Act. Suec. 1732. p. 108.

Lanius rufus. Briss. Orn. I. p. 199.

L. rufus, supra tricolor, subtus rufescente-albus, scapularibus totis, rectricibus a basi ad medium, lateralibus apice albis, fascia oculari nigra. Lath. Ind. I. p. 70.

L. Pomeranus, supra niger, subtus albus, occipito dorsoque Colli saturate ferrugineis nigro circumdatis, alarum maculis utrinque duabus uropygioque albis. Mus. Carlsson, I. t. 1.

L. Collurio. Bechst. Vög. Deutschl. I. p. 387. t. 15.

Another

Another sort of Batcherbird. Will. Orn. p. 89.

Woodchat. Penn. Britt. Zool. I. p. 217.

Pie-grièche rouffe. Buff. Av. I. p. 301.

Habitat in nemorosis rarius. Victitat præcipue coleopteris.

Rostrum corneum. Frons prope rostrum alba, supra hanc albedinem vero nigra, quae nigredo trans oculos versus scapulas vittam efficit, intra quam Caput et Colli supina pars rufa vel rufo-fusca. Dorsum et Alae nigra, saepe in fuscum vergentia. Fascia alba trans alas et alia minor in remigibus primoribus. Uropygium cinerascens. Gula, Pectus, Abdomen flavescens-alba. Rectrices dimidiato-albae nigraeque, laterales etiam apice albae, sed extremae longitudinaliter extrorsum albae.

Foemina differt, capite colloque supra et dorso rufescentibus transverse fusco-friatis, subtus sordide alba fusco-friata. Cauda subrufa, juxta apicem rufum obsolete fusco-fasciata.

2. P I C A E.

CORVUS.

Rostrum convexum, cultratum.

Naves pennae setaceis recumbentibus obtectae.

Lingua cartilaginea, bifida.

Pedes ambulatores.

40. *Corvus Corax*, ater, dorso atro-coeruleo, cauda subrotundata. L. S. N. XII. T. I. p. 155. Fn. Su. 85. Lath. Ind. I. p. 150.

Corvus. Briss. Orn. I. p. 156.

Raven. Will. Orn. p. 121. Penn. Britt. Zool. I. p. 218. Arct. Zool. 2. p. 245.

le Cor-

le Corbeau. Buff. Av. 3. p. 15. t. 2.

Succis Korp. Rusticis Scaenis Raron.

β. *Corvus Clericus*, macula gulari alba. Mus. Carl. I. t. 2.

Habitat per totam Sueciam vulgaris. Victitat cadaveribus, muribus, ranis, ovis avium, avibus junioribus etc. Avis furto dedita, loqui discens. Haud facile occiditur nisi ob remiges graphicam artem excentibus imprimis utiles.

Corpus totum atrum, dorso parum coeruleo. Remiges 20, quorum duo primi paulo breviores. Rectrices expansi caudam rotundatam offerunt. Sub gula plerumque cinerea, quae in var. β in majorem maculam albam mutata.

41. *Corvus Corone*, atro-coeruleo totus, cauda rotundata, rectricibus scutis. L. S. N. XII. T. I. p. 155. Fn. Su. 86. Lath. Ind. I. p. 151.

Corvus. Briss. Orn. I. p. 157.

The common or Carrion Crow. Will. Orn. p. 122.

Carrion Crow. Penn. Britt. Zool. I. p. 219. t. 34. Arct. Zool. 2. p. 246.

La Corvine ou Corneille noire. Buff. Av. 3. p. 45. t. 3. Succis Blåkorp.

Habitat in sylvis aestate, hyeme Cornices saepe sequitur, minus rara apud nos. Fectus cadavera, Aves, Cancri, Scarabaci, Larvae quas sub aratione colligit, vermes etc. etiam lata.

Corace dimidio minor forte, tota atro-coerulea, etiam abdomine. Plumae ad rostrum fere detritae.

42. a. *Corvus fragileus*, ater, fronte cinerascens, cauda subrotundata. L. S. N. XII. T. I. p. 156. Fn. Su. 87. Lath. Ind. I. p. 152.

Cornix

- Cornix frugilega.* Briss. Orn. I. p. 158.
 Rook. Will. Orn. p. 123. Penn. Britt. Zool. I. p. 221.
 Arct. Zool. 2. p. 250.
le Freaz ou la Frayonne. Buff. Av. I. p. 55.
Oelandis Roka. Scania Råka.

Habitat in Oelandia et Scania campestri, locis non longe a mari remotis non minus quam in cæteris australibus Provinciis maritimis. Satae segeti noxia avis, vicitans frugibus vermibusque, etiam insectis muribusque, immo stercore cadaveribusque. Coniunctim nidificant in arborum cacuminibus.

Monedula parum major. Tota nigra e violaceo splendens. Frons cinerascens. Remiges 10 — 13 emarginati. Rectrices rotundatae, exteriores breviores. Plumae capistris et frontis pennae saepe detritae.

42. *Corvus Cornix*, cinerascens, capite, jugulo, alis caudaque nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 156. Fa. Su. 88. Lath. Ind. I. p. 155.)
Cornix cinerea. Briss. Orn. I. p. 159.
Royston Crow. Will. Orn. p. 124.
Hooded Crow. Penn. Britt. Zool. I. p. 223. Arct. Zool. 2. p. 251. Faun. Scot. p. 20. t. 20.
Corneille mantelée. Buff. Av. 3. p. 61. t. 4.
Succis Kråka.

Habitat per totam Sueciam communis. Victus Semina, Insecta, Cadavera, Vermes, etiam Testacea. Arantes loquitur. Eradicat gramina sub quibus Larvae latent et erucas depascitur, hinc prata et pascua ab insectis graminivora purgat. Futurae tempestatis et venti nuncia in maritimis; respicit sedens adversus ventum.

Rostrum, Caput, Gula ad dimidium pectoris, Alae, Cauda, Pedes nigra, cæterum cinerea.

43. *Corvus Monedula*, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 156. Fa. Su. 89. Lath. Ind. I. p. 154.
Monedula. Briss. Orn. I. p. 160.
Jackdaw. Will. Orn. p. 125. Penn. Britt. Zool. I. p. 230. t. 34. Arct. Zool. 2. p. 251.
Choucas. Buff. Av. 3. p. 69. t. 5.
Succis Kåja. Scania Allika.

Habitat passim ad urbes et pagos frequens. Autumno migrat e Smolandia, in Uplandia manet et per hyemem gregaria in turribus pernoctat. Vicitans Vermibus, Insectis, Frugibus, Ovis et hyeme Cadaveribus. Loqui discit.

Nigra Rostrum, Frons, Gula, Alae, Cauda, Pedes, Remiges et Rectrices. Albida Iris Oculorum. Nigricans Dorsum, obscure cinereum Pectus, Abdomen.

44. *Corvus glandarius*, tectricibus alarum coerulesis: lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato. L. S. N. XII. T. I. p. 156. Fa. Su. 90. Lath. Ind. J. p. 158.
Garrulus. Briss. Orn. I. p. 163.
The Jay. Will. Orn. p. 130. Penn. Britt. Zool. I. p. 226. Arct. Zool. 2. p. 252.
Le Geai. Buff. Av. 3. p. 107. t. 8.
Succis Allonkrika, Nötkrika. Ostrogothis Kornkrika.

Habitat in sylvis, imprimis quernis, nidum in fraticibus altioribus struens. Ova ponit 5 l. 6 sordide virefocentia fusco-maculata. Victus hyemalis glandes, nuces, autumnalis Baccæ hortenses et Pifa, reliquo tempore Juniperi baccas, semina Insectaque coleoptera devorat. Aviculas etiam capit nec Turdis laqueari

queari captis parcat. Loqui discit. Capitis pennas erigit.

Caput griseo-ferrugineum. Scapularum regio et Pectus ferruginea. Abdomen sordide albidum. Frontis ferrugineo-albicans maculis longitudinalibus nigris. Iris caesia. Maxilla inferior extus nigra. Gula in quibusdam albida. Rostrum nigrum. Vibrissae utrimque setis 5-6 nigris. Lingua membranacea bifida. Macula nigra in genis. Remiges nigri, at 1-9 exteriori margine maxima ex parte albi, 10-14 a basi ultra medium exteriori latere albi, reliqui omnes nigri, quorum per gradus 5 reliquis longiores. Tectrices alarum exteriori latere coeruleae lineis transversis nigris. Cauda nigra tectricibus albis. Crissum album.

45. *CORVUS Caryocatactes*, fuscus albo-punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis; intermediis apice detritis. L. S. N. XII, T. I. p. 157. Fn. Su. 91. Lath. Ind. I. p. 164.

Nucifraga. Brill. Orn. I. p. 171.

Caryocatactes. Will. Orn. p. 152.

Nutcracker. Penn. Brit. Zool. 2. p. 625. tab. app. 3.

Aret. Zool. 2. p. 252. Edw. Av. 5. t. 240.

Casse Noix. Buff. Av. 5. p. 122. t. 9.

Sueciis Nörwäcka, Nötraka.

Habitat in sylvis. Victus Insecta, Vermes, Baccae, Noces, Glandes.

Rostrum conicum, firmiter, sine angulis, apice depresso et quasi truncato, basi setis rigidis albis tectum. Mandibula inferior intus gibbere instructa, cui in superiori forca respondet. Lingua brevis bifida, laciniis corneis. Irides fuscae. Caput supra immaculatum. Tota Avis praeterea fusca macula in singula penna alba orata vel

ful-

subtriangula versus apicem. Alae nigrae supra nitentes. Remiges 5-8 latere inferiore macula magna alba marginali, secundarii omnes apice albi tantum. Uropygium nigrum immaculatum. Crissum album. Cauda subrotunda; rectricibus apice albis; intermediis apice detritis.

46. *CORVUS Pica*, albo-nigroque varius, cauda cuneiformi. L. S. N. XII, T. I. p. 157. Fn. Su. 92.

Lath. Ind. I. p. 162.

Pica. Brill. Orn. I. p. 164.

Maggie or P Janet. Will. Orn. p. 127. Penn. Brit.

Zool. I. p. 225. Aret. Zool. 2. p. 247.

La Pie. Buff. Av. 5. p. 85. t. 7.

Sueciis Skata. Uplandis Skjura. Gottlandis Skära.

♂. glauco-rufescens, ubi a nigra. Mus. Caroll. 4. t. 77.

♀. corpore fuliginoso-alboque vario, oculis rubicundis, rostro pedibusque nigris. Mus. Caroll. 3. t. 53.

Habitat per totam Sueciam vulgarissima, e sola Lapponia exulans, ♂ hinc inde in Scania et Smolandia visa, ♀ e Finlandia. Victus Vermes, Insecta, Quisquilae praecipue regni animalis, etiam pullos galinaceos et anserinos necat.

Notissima avis descriptione haud eget.

47. *CORVUS infaustus*, dorso cinereo, rectricibus rufis; intermediis duabus cinereis; fascia nigricante. Fn. Su. 93. cauda rotundata. Lath. Ind. I. p. 159.

Lanius infaustus, dorso cinereo; rectricibus rufis intermediis duabus cinereis fascia nigricante, cauda rotundata. L. S. N. XII, T. I. p. 138.

Corvus

Corvus infausus. Mus. Carlsson. 4. tab. 76.

Suecis Enskrika, Lappskata, Olycksfogel *Jemlandis*
Rödtjuxa, Dalekarlis Lafsrika.

Habitat in sylvis acerosis praesertim Lapponiae et Fin-
landiae. *Victus* Baccae Juniperi, Mures, forte et
Aviculae.

Sine dubio ab Auctoribus cum Turdo saxatili con-
fusa, ideo tamen in omnibus Clariss. in PERNOWE assenti-
turi non possum *Conf. N. Act. R. Ac. Sc. Suec. 1782.*
p. 109. 115.

Rostrum nigrum, crassum, breve, subtrigonum,
basi setis albidis tectum, apex utriusque emarginatus.
Lingua emarginata, lobis bifidis (lamina cornea bifida
terminatur LECHZ). *Nares* ovatae tectae setis. *Caput*
fulcum. *Dorsum* pallide cinereum plumis pinnatis, h. e.
radiis discretis nec contiguis. *Remiges* 18 fusci, basi
testaceo-rufi, tres priores per gradus breviores. *Tectri-
ces* anteriores testaceo-rufae. *Cauda* rotundata longi-
tudine corporis, rectricibus lateralibus brevioribus, tota
testaceo-rufa exceptis intermediis duabus cinereis fa-
scia nigricante, proxima utrinque apice cinerea, haec
proxima vix apice cinerea. *Tectrices* caudae testaceo-
rufae. *Latera* testacea. *Pedes* nigri ungue postico ma-
jore firmo. *Ungues* omnes compressi, medio introsum
emarginati.

Quod à LINSSE' testaceo-rufum dicit a LECHZ ful-
vum vocatur, qui simul addit: *Abdomen*, *Femora*, *Cau-
dam* et *Criussum* pallide rufa esse, et *Dorsum* rufo-cine-
reum. *Pennae* capitis et dorsi tumidulae sequae ac in
Corvo glandario, nec appressae. *Longit.* 10 poll.

CORACIAS.

Rostrum cultratum apice incurvato, basi penae de-
nudatum.

Lingua cartilaginea bifida.

Pedes ambulatorii.

43. CORACIAS *Garrula*, coerulea, dorso rubro, remigi-
bus nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 159. Fn. Su. 94.

N. Act. Suec. 1787. p. 108. Lath. Ind. I. p. 168.

Galgulus. Brill. Orn. I. p. 175.

Buller. Will. Orn. p. 131. Penn. Britt. Zool. 2.
p. 624. App. 1. 2. Arct. Zool. 2. p. 255. Edw.
Av. 5. l. 109.

le *Rodier d'Europe.* Buff. Av. 5. p. 155. t. 10.

Suecis Spansk Kräka. *Smolandis* Blåkråka. *Scania*
Ellekråka.

Habitat in Scania occidentali, in Smolandia, Finlandia.
Primo vere advenit et incipiente gelu abit. *Victus*
Insecta, Ranar, Lacertae. *Avis* inter nostratas
splendidissima et pulcherrima.

Rostrum nigrum apice sinu obsoleto, qui excipit api-
cem mandibulae inferioris. *Nares* plumis tectae; inter
nares et oculos setae 6 rigidae. *Area* oculorum nuda,
in mare verrucis a l. 5 sub pruritus tempore increfcenti-
bus (*Hellenias*). *Macula* nuda pone aures (*Pennant*).
Caput ex virefcenti dilute coeruleum. *Collum* supra et
Dorsum griseo-ferruginea vel fordide fulva. *Abdomen*
et *Alae* subtus dilute coerulefcentia. *Uropygium* subvio-
laceo-coeruleum. *Alarum* basis nitidissime coerulea.
Tectrices superiores dilute coeruleae. *Remiges* nigri an-
tice obscure coerulefcentes et basi coerulei. *Rectrices*
foeminae aequalos, viridi-coerulefcentes apice albidio-
res, maris exteriores longiores apice nigrae, sed mediae
unicolores. *Lingua* lacera.

ORIOLUS.

Rostrum conicum, convexum, acutissimum, rectum; mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.

Lingua bifida, acuta.

Pedes ambulatorii.

49. *Oriolus Galebula*, luteus, locis artibusque nigris, rectricibus exterioribus pollice flavis. L. S. N. XII. T. I. p. 166. Lath. Ind. I. p. 186.

Coracias Oriolus, flava, alis caudaque nigris. Fn. Su. 95.

Ampelis flava, artibus nigris, rectricibus exterioribus pollice flavis. Act. Suec. 1750. p. 127. t. 3. f. 5.

Oriolus. Brill. Orn. I. p. 247.

Witwall. Will. Orn. p. 198.

Golden Trush, Icterus. Edw. Av. 4. t. 185.

Oriole. Penn. Britt. Zool. 2. p. 626. App. tab. 4. Arct. Zool. 2. p. 345.

Loriot. Buff. Av. 3. p. 254. t. 17.

Succis Sommarguling, Gultraft, Gylling.

Habitat in Finlandia. *Victus* Insecta, Vermes, Baccae. Nidum artificiose contextum suspendit e ramis, introitu laterali. Majo mense ad finem vergente advenit, et initio Septembris iterum abit. Conf. Act. Suec. l. cit. et N. Act. 1786.

Rostrum rufum sinu utriusque maxillae ad apicem, a natibus ad apicem angulatum. *Nares* ovatae, patulae, nudae. *Lingua* bifida, apice membranacea, lacera. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Abdomen*, *Uropygium*, *Criſsum*, *Tectrices* alarum inferiores, citrina. *Alae* nigrae praeter maculam e sex tectricibus factam flavam, et margines albidos remigum. *Rectrices* 6. 6. nigrae, reliquae nigrae apicibus flavis.

CUCU.

CUCULUS.

Rostrum teretiusculum.

Nares marginae prominulae.

Lingua sagittata, plana, integra.

Pedes scanlorii.

50. *Cuculus canorus*, cauda rotundata nigricante albo punctata. L. S. N. XII. T. I. p. 168. Fn. Su. 96. Lath. Ind. I. p. 207.

Coccyus. Brill. Orn. 2. p. 70.

Cuckoo. Will. Orn. p. 97. Penn. Britt. Zool. I. p. 252. t. 56. foem.

European Cuckoo. Penn. Arct. Zool. 2. p. 266.

Coucou. Buff. Av. 6. p. 305.

Succis Gök. Lappus Geeka.

Habitat per totam Sueciam vulgaris. Mores ejus bene observavit LOTTINGER der Kuhk Argentor. 1776. BECHSTEIN Vög. Deutschl.

Max. *Rostrum* curvatum. *Nares* marginatae puncto centrali. *Irides* flavo-fulcae. *Palpebrae* luteae. *Caput*, *Dorsum*, *Alae* cinerascens-cana. *Collum* cinereum. *Abdomen* et *Femora* alba lineis transversis nigris. *Criſsum* fordide testaceum. *Remiges* nigrescentes, 10 prioris interiorè latere albo-maculati, maculis numero decrecentibus. *Rectrices* 10 nigrae maculis parvis albis alternis juxta rachin et marginem apice etiam albidas, intermediae solo apice albae. *Pedes* hutei.

Foemina impruinis differt liris rufis crebris *Collis* et *rectricibus* rufo nigroque fasciatis alboque maculatis.

Junior Avis aliis coloribus variat, scil. ferrugineo, fulco, nigro alboque variegata.

G 2

51.

51. *CUCULUS hepaticus*, cauda cuneiformi, corpore brunneo nigroque undulato, uropygio ferrugineo, rostro alarum apicibus caudaeque fasciis nigris, subtus albicans nigro-undulatus, pedibus flavis. Lath. Ind. I. p. 215. Mus. Carlinov. 3. t. 35.

Cuculus canorus rufus. Lath. Ind. I. p. 208. f.

C. rufus. Bechst. Lath. 2. p. 449. Bechst. Vög. Deutschl. I. p. 495.

Habitat in Dalekaria D. LINDORFII, in Scania Comes H. G. WÄCHTERII. Moris ignoti. An revera distincta species?

Præcedenti minor, at Caput et Cauda relative majora. Rostrum etiam nonnihil majus. Caput, Collum, Dorsum, Alarum tectrices rufo-brunnæ fasciis nigris aequalibus. Gula et Jugulum flavescens, dehinc subtus tota alba nigrescenti undulata. Remiges nigrescentes fasciis dimidiato-rufo-alboque fasciatis in primoribus. Uropygium et Cauda magis rufescent. Rectrices fasciis nigris in angulum cocuntibus, rachides albae, ultima fascia latior, apice albens.

I Y N X.

Rostrum teretiufculum, acuminatum.

Nares concavae, denudatae.

Lingua teres, lumbriciformis, longissima, apice mucronata.

Pedes scanforii.

52. *IYXX Torquilla*. L. S. N. XII. T. I. p. 172. Fu. Su. 97. t. 1. f. 97. Lath. Ind. I. p. 223.

Iyx. Rudb. Lapp. p. 66. t. 66.

Torquilla. Brill. Orn. 2. p. 43.

Wryneck. Will. Orn. p. 158. Penn. Britt. Zool. I. p. 157. t. 36. Arct. Zool. 2. p. 267.

Torcol.

Torcol. Buff. Av. 7. p. 84. t. 3.

Succis Göktyta. Smolandis Südesgök.

Habitat in truncis arborum putrescentium, Insecta præcipue Formicas Larvasque legens, ova 6 mense Majo ponens, voce canoris, collum undique contorquens, adventantes Accipitres Passeribus indicans.

Avis pulchre variegata cinereo, nigro, ferrugineo et albido. Rostrum rectum. Irides flavescens. Caput et Collum cinerea lineolis albis ferrugineisque transversis undulatis. A vertice versus dorsum fascia obsoleta obscurior ex nigro et ferrugineo. Remiges fuscescentes ferrugineo-tessellati in complicatis alis. Jugulum et Penæ pallide ferruginea maculis nigris acutis. Rectrices 10 æquales, apicibus rotundatis, cinerae, nigro ferrugineoque variegatae fasciisque 4 nigris subdeliquescentibus; præterea una utrinque brevissima vix observanda. Bechstein. Pedes cinereo-fusci. Penas verticis instar cristæ erigere valet.

P I C U S.

Rostrum polyedrum, rectum, apice cuneato.

Nares penæ siccæ recumbentibus tectæ.

Lingua teres, longissima, lumbriciformis, mucronata, apice retrosum aculeata setis.

Pedes scanforii.

Rectrices acutæ, rigidae.

53. *PICUS martius*, niger, pileo coccineo. L. S. N. XII. T. I. p. 173. Fu. So. 98. Lath. Ind. I. p. 224.

Picus niger. Brill. Orn. 2. p. 47.

The greatest black Woodpecker. Will. Orn. p. 155.

Black Woodpecker. Penn. Arct. Zool. 2. p. 276.

Pic

Pic noir. Buff. Av. 7. p. 41. t. 2.

Succis Spillkråka, Tillkråka. *Gotlandis* Toile.

Habitat in arboribus antiquis aridis.

Corpus totum atrum, in foemina aliquantum ad fuscum vergens. A basi rostri ad occiput macula oblonga purpurea, foeminae vero nucha tantum rubra. *Irides* stramineae. *Rostrum* et *Pedes* nigro-coerulescentes.

54. *Picus viridis*, vertice coccineo. L. S. N. XII. T. I. p. 175. Fn. Su. 99. Lath. Ind. 2. p. 234.

Picus viridis. Briss. Orn. 2. p. 44.

The green Woodpecker or Woodspite. Will. Orn. p. 135.

Green Woodpecker. Penn. Britt. Zool. I. p. 240. Arct. Zool. 2. p. 277.

Pic verd. Buff. Av. 7. p. 7. t. 1.

β. *P. Norvegicus*, coerulesco-viridis, capite collo corporeque subtus cinereis, uropygio luteo, loris mystacibusque nigris. Lath. Ind. I. p. 236.

P. viridis Norvegicus. Briss. Orn. 2. p. 46.

Greyheaded Woodpecker. Penn. Arct. Zool. 2. p. 277.

Greyheaded Green Woodpecker. Edw. Av. 2. t. 65.

Succis Wedknarr, Grönspek, Gröngöling. *Scanis* Gyllenrenna.

Habitat in exaridis arboribus.

Rostrum trigonum, acutum. *Lingua* intra vaginam cylindricam retractilis. *Irides* rubescentes. *Pileus* coccineus, fundo canescente tamen conspicuo, in aliis immaculatus, in aliis albo vel nigro-maculatus. *Area* oculorum et fascia a maxilla inferiore ad aures nigra vel nigro-punctata. Interdum sub hac fascia linea rubra, quae in aliis ipsam fasciam quoad partem percurrit. *Dorsum* viride, *uropygium* flavescens-viride. *Venter*, *Crissum*,

Crissum, *Femora* sordide albida cum virore quodam et lineis undulatis. *Remiges* exteriorè latere virides, interiorè nigri maculis albis, tribus extimis exceptis, in quarum exteriorè latere maculae albescentes. *Rectrices* nigricantes cum virore versus basin et maculis cinerascenscentibus. *Pedes* subvirescentes.

β. Foemina junior ex observationibus Cl. BECHSTEIN.

55. *Picus major*, albo nigroque varius, crisso occipitè quo rubris. L. S. N. XII. T. I. p. 176. Fn. Su. 100. Lath. Ind. I. p. 228.

P. varius major. Briss. Orn. 2. p. 51.

Greater spotted Woodpecker or Witwall. Will. Orn. p. 137. Penn. Britt. Zool. I. p. 243. Arct. Zool. 2. p. 272.

Epeiche or Pic variè. Buff. Av. 7. p. 57.

Succis Hackspett, Hackspik, Skogsfkata.

Habitat in sylvis vulgaris.

Obs. Coniungunt alii hanc cum sequente, vel saltem pro varietate habent. Distinguit Cel. Ornithologus BECHSTEIN in edit. german. Synopsis Lathamianae.

Rostrum angulatum fortius apice compresso. *Front* mox supra rostrum ferruginea. *Caput* nigrum, maculis in mare occipitis coccineis. *Tempora* alba et dehinc linea alba sub oculos ad frontem ferrugineam. Sub hac linea a rostro fascia nigra ad nucham, colli latera et dorsum. *Macula* alba utrinque ad collum. *Subtus* sordide albus, *crissum* vero rubrum. *Remiges* nigri maculis albis utrinque 3—6 excepto primo, cui maculae in interiori latere. *Scapulae* albi. *Rectrices* 4 mediae nigrae, longiores acutae, laterales nigrae maculis et apicibus albidis, binæ spuriae vix observandae nigrae. *Foemina* caret rubedine capitis.

56. *Picus medius*, albo nigroque varius, crisso pileoque rubris. L. S. N. XII. T. I. p. 176. Fn. Su. 101. Lath. Ind. I. p. 229.

P. varius. Brill. Orn. 2. p. 52.

Middle Woodpecker. Penn. Britt. Zool. I. p. 244. t. 37.

Middle spotted Woodpecker. Arct. Zool. 2. p. 278.

Suecic nomina antecedentia.

Habitat in sylvis ubique.

Vix tertin parte præcedente minor, differt præcipue pileo rubro, et macula oblonga alba ad oculos incipiens et ad colli latera descendens, nigra circumdata. *Rectrices* 1, 2 ab apice albas nigro-fasciatae, 3 nigra maculis quatuor albis, 4, 5 albae immacolatae. *Foeminae* caput nigrum, at ætate provectior interdum maculis rubris ornatur.

57. *Picus minor*, albo nigroque varius, vertice rubro, crisso testaceo. L. S. N. XII. T. I. p. 177. Fn. Su. 102. Lath. Ind. I. p. 229.

P. varius minor. Brill. Orn. 2. p. 55.

The Lesser spotted Woodpecker, or Hickwall. Will. Orn. p. 138.

Less spotted Woodpecker. Penn. Britt. Zool. I. p. 245. t. 37. Arct. Zool. 2. p. 278.

Petit Epeiche. Buff. Av. 7. p. 62.

Habitat in Scaniae sylvis.

Magnitudo *Palleris*. *Vertex* ruber maris, albus foeminae. *Nucha* nigra ut et *Colli tergum*, quo nigredo per lineam nigram jungitur. *Frons* testacea ut et *collum* subtus ac *Abdomen*. Macula alba supra oculos. *Tempora* testacea et debinc linea latiuscula cum stria nigra ad nigrum dorsum tendunt. *Alae* nigrae ordinibus sex macularum albarum. *Dorsum* nigrum albo-maculatum

vel

vel fasciatum. *Rectrices* 4, 5 acutae nigrae, 1, 2, 3 rotundatae feminigrae, maculis parvis nigrijs in alba parte.

58. *Picus tridactylus*, albo nigroque varius, pedibus tridactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 177. Fn. Su. 103. Act. Ac. Suec. 1740. p. 214. Lath. Ind. I. p. 245.

P. varius cayennensis. Brill. Orn. 2. p. 57.

Three-toed Woodpecker. Penn. Arct. Zool. 2. p. 273. Edw. Av. 3. t. 114.

Epeiche ou Pic varié ondé. Buff. Av. 7. p. 78.

Habitat in sylvis Dalecarliae, Uplandia, Sudermaniae, Westrogothiae.

Pileus maris luteus, foeminae niger albo-lineatus. *Collum* supra et lateribus nigrum, et a sinu oris linea alba descendit, et alia a postico oculi cantho, quae in nucha conjungitur, et in aliis speciminibus usque ad caudam per dorsum descendit. *Dorsum* nigrum. *Pectus* et *Abdomen* alba nigro-maculata. *Remiges* nigri maculis albis. *Rectrices* alarum nigrae, interdum albo-maculatae. *Rectrices* 12. 1, 1 spurias 2, 2, 3, 3 apice rotundatae, nigrae maculis albis ab utraque rachidis latere, reliquas acutae, nigrae et immacolatae. *Digiti* tres tantum, pollice majore.

Obs. Iyngi, Picis, Upupae, Cerniæ rectrices tantum decem tribuuntur, at nonnullis harum revera duodecim, licet extrema utrinque adeo parva, ut difficile observetur: forte et reliquis idem numerus, quod ulterius examinari debet in vivis avibus vel nuper necatis. *Spurias* has dixi.

S I T T A.

Rostrum subulatum, teretiusculum, rectum, porrectum, integerrimum, mandibula superiore paulo longiore: apice compresso.

Lingua emarginata lacera.

Nares vibrillis tectae.

Pedes ambulatorii.

59. *Sitta europaea*, reatricibus nigris: lateralibus quatuor infra apicem albis. L. S. N. XII, T. I. p. 177. Fa. Su. 104. Lath. Ind. I. p. 261.

Sitta. Brill. Orn. I. p. 474.

Nuthatch or *Nutjobber*. Will. Orn. p. 142.

Nuthatch. Penn. Britt. Zool. I. p. 255. t. 58.

Sittelle ou *Torchepot*. Buff. Av. 5. p. 460. t. 20.

Suecis Nötwäcka, Nötpacka.

Habitat in tectis, parietibus, truncisque arborum, larvis insectisque victitans. Nuces pro hyeme colligit, perfodit. Nidum firuens, reperto congruo foramine arboris, illud limo oblinat, ut commode intrare tantum possit.

Cyphus cinereum, linea atra latitudine rostris a naribus ad nuquam. *Irides* fulvae. *Lingua* cartilaginea, plana, trifido-lacera. *Collum*, *Dorsum*, *Tectrices* alarum superiores et *Uropygium* cano-coerulescentis. *Gula*, *Pectus*, *Abdomen* alba ad rufum vergentia. *Tectrices* inferiores reatricum et abdominis latera maculis ferrugineis et albis tincta. *Remiges* cinerei 17, primi 6 a basi ad quartam sero partem albi. *Tectrices* subalares albido-cinereae macula alba. *Cauda* integra mollis. *Reatrices* 12, quarum 4 extremae signatae sunt macula alba apicem verticaliter ad dimidiam partem secante, 2 proximae nigrae apice intus albae, sequentes 2 nigrae apice

cinereae, intermediae dorso concoloris. *Pedes* flavescens.

U P U P A.

Rostrum arcuatum, convexum, subcompressum obtusiusculum.

Lingua obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Pedes ambulatorii.

60. *UPUVA Epops*, cristata, variegata. L. S. N. XII, T. I. p. 183. Fa. Su. 105.

U. Epops, nigricante et rufo-albo variegata, subtus rufescens, crista rufescente apice nigra, cauda nigra fascia alba. Lath. Ind. I. p. 277.

Upupa. Brill. Orn. I. p. 285. Charl. Onom. p. 92. t. 95. Exerc. p. 98. t. 99.

The Hoop or *Hoopoe*. Will. Orn. p. 145.

Hoopoe. Penn. Britt. Zool. I. p. 257. t. 59. Arct. Zool. 2. p. 285. Edw. Av. 7. t. 345.

La Hupe ou *Papue*. Buff. Av. 6. p. 459.

Suecis Hårfoegel. Scania Popp.

Habitat in sylvis, sono proprium nomen recitans, unde facile dignoscitur. Ova ponit 2—7 cinerea in cavis arborum, in terra, in sepium foraminibus. Vermibus in insectis victitans illa etiam in stercore, cadaveribus quaerit, et nidum haud ab excrementis purgat, unde foetor Avis. Terrefacta cristam erigit.

Rostrum nigricans. *Crista* alta, plicatilis, sordido aurantia, apicibus nigris. *Collum* et *Pectus* flavescunt. *Dorsum* albo, nigro flavoque mixtum. *Abdomen* albidum. *Tectrices* alarum ferrugineae. *Remiges* nigri, 1 brevior 2—6 aequales fascia transversa nivea, 7 brevior macula magna nivea in interioro latere, 8 margine

exteriore maculis tribus niveis triangularibus et una lineari versus apicem, 9—10 fasciis quatuor albis transversis, 18 macula alba versus apicem. *Rectrices* 10 aequales, nigrae fascia alba versus basin ex macula singulae pennae lunulata: extrema utriusque a latere interiore macula nivea.

C E R T H I A.

Rostrum arcuatum, tenue, subtrigonum, acutum.

Lingua acuta.

Pedes ambulatorii.

61. *CERTHIA familiaris*, grisea, subtus alba, remigibus fulcis macula alba, *rectricibus* decem. L. S. N. XII. T. I. p. 134. Fr. Su. 106. Lath. Ind. I. p. 280.

Certhia. Briss. Orn. 2. p. 2.

Creeper. Will. Orn. p. 144. Penn. Britt. Zool. I. p. 260. t. 59.

European Creeper. Penn. Arct. Zool. 2. p. 285.

Le Grimpeur. Bull. Av. 5. p. 481. t. 21.

Succis Krypare. Scnis Trädskrypare.

Habitat in arborum truncis, inque earum rimis legitur Insectorum ova et larvas, hominem minus metuens quam aliae aviculae. Ova usque ad viginti.

Supra variegata ex fusco, ferrugineo et albo; singula enim penna in medio maculam oblongam albam habet, quae ab uno latere pallide ferrugineo, ab altero fusco circumdatur. *Subtus* alba. *Remiges* fulci apice albidis, a quarto ad penultimum maculam transversam flavidam habent, unde in composita ala fascia serrata ascendens. Sub hac aliquid nigri. *Rectrices* 10, acutae. *Cauda* cuneata, rigida, flavescenti-nigricans, margine exteriore albedo.

3. A N.

3. A N S E R E S.

A N A S.

Rostrum lamelloso-dentatum, convexum obtusum.

Lingua obtusa, ciliata.

62. *ANAS Cygnus*, rostro semicylindrico atro, cern flava, corpore albo. Lath. Ind. 2. p. 833.

A. Cygnus. L. S. N. XII. T. I. p. 194. I. 2. Fr. Su. 107. 2.

Cygnus ferus. Briss. Orn. 2. p. 139.

Wild Swan, Elk, Hooper. Wild Orn. p. 556.

Wild Swan. Penn. Britt. Zool. 2. p. 562. Edw. Av. 3. t. 150.

Whistling Swan. Penn. Arct. Zool. 2. p. 541.

Cygne sauvage. Bull. Av. 9. p. 5.

Habitat in mari inter Scaniam et Seelandiam. In lacu fere exsiccato Rörshöj prope Malmogiam pullos quotannis excludit, quos volatu aptos secum in mare ducit.

Minor sequente 15—16 libr., totus albus interdum in dorso cinerei quid habens. *Rostrum* ad nares usque nigrum; basis vero et spatium inter rostrum et oculos flava, qualem etiam colorem habent *palpebrae*. *Pedes* nigri.

Conjuncti hanc cum sequente a Larva, distinguant omnes mentiores. Diversas earum stationes observare non licuit, cum una vel utraque aestate sit fluviatilis vel lacustris.

63. *ANAS Otus*, rostro semicylindrico rubro, basi tuberculo carnoso nigro, corpore albo. Lath. Ind. 2. p. 834.

Anas Cygnus. L. S. N. XII. T. I. p. 194. I. 2. Fr. Su. 107. 2.

Cygnus.

Cygnus. Briss. Orn. 2. p. 450.

Tame Swan. Will. Orn. p. 355. Penn. Britt. Zool. 2. p. 564. Edw. Av. 3. t. 150. caput.

Mute Swan. Penn. Arct. Zool. 2. p. 543.

Cygne. Buff. Av. 9. p. 5. t. 1.

Succis Tam Swan.

Habitat An haec vel praecedens quae Lapponias fluvios inhabitat?

Praecedente major, ad 20 libras. *Rostrum* rubrum margine et ungue nigris. Ad basin rostri *Gerya* nodosa nigra. Spatium inter rostrum et oculos triangulum nigrum.

64. *ANAS Tadorna*, rostro simo, fronte compressa, capite nigro-virescente, corpore albo variegato. L. S. N. XII, T. I. p. 195. Fn. Su. 115. Lath. Ind. 2. p. 854. Linn. it. Scan. 212.

Jugas. Linn. it. Gottl. p. 214.

Tadorna. Briss. Orn. 2. p. 453.

Sheldrake or Burrough Duck. Will. Orn. p. 365.

Sheldrake. Penn. Britt. Zool. 2. p. 539. Arct. Zool. 2. p. 572.

Tadorne. Buff. Av. 9. p. 205. t. 14.

Succis Grafgas, Brandgas. Gottlandis Jugas.

Habitat in mari Baltico et occidentali. Plumae molles-
simae ut in *Anate* mollissima.

Mas. *Rostrum* rubrum basi caruncula compressa, verno tempore imprimis conspicua. *Caput* et suprema *Collis* pars nigro-virescens, inferior vero alba. *Pectus* et *Humeri* fascia lata ferrugineo-fulva. *Tectrices* alarum et media *dorsis* pars alba. *Scapulae* superiores nigrae, inferiores albae. *Abdomen* album longitudinaliter nigrum.

grum. *Remiges* primores nigri, secundarii 12 latere exteriore viridi-aurei, reliqui albi. *Tectrices* caudae albae. *Cauda* alba, apice nigra excepto ultimo rectricum pari unicolore. *Uropygium* flavicans. *Pedes* carnei. *Femora* supra genua nuda.

Foemina, minor, alba. *Caput* et *Collis* superior pars subcinerea. *Venter* longitudinaliter cinereo-maculatus. *Remiges* versus apices ferruginei, hinc macula transversa alarum lata ferruginea. *Rostrum* anseris domestici, sed magis sinum.

Varietatem memorat Brunn. Orn. bot. p. 12. remigibus exceptis extremis apice albis.

Foeminam mari simillimam omnibus, coloribus minus vividis ait LATHAM l. cit.

65. *ANAS Spectabilis*, rostro basi gibbo compresso; carina pennacea nigra, capite canescente. L. S. N. XII, T. I. p. 195. Fn. Su. 112. Fabr. Fn. Groenl. 39. Mus. Carll. 2. t. 39. Lath. Ind. 2. p. 845.

Anas freti Hudsonis. Briss. Orn. 2. p. 450.

King-Duck. Penn. Arct. Zool. 2. p. 554.

Greyheaded Duck. Edw. Av. 3. t. 154.

Hav-Orre. Leem. Lapl. 274. t. 98.

Den puchelnebbede Ejderfugl. Fabricius: Nat. Hist. Selsk. Skrift. 2. 2. p. 56. t. 9. foem.

Canard à tete grise. Buff. Av. 9. p. 253.

Habitat in mari Baltico et superiore rariss.

Mas. *Rostrum* fuliginoso rubrum, medio flavescens, basi caruncula gibba, compressa, rubra, quae crista pennacea nigra dividitur in duas orbitas. *Caput* supra canum. *Genae* viridescens. *Area* circa oculos parva nigra, quae nigredo interdum modo sub oculos cernitur. *Supra oculos linea alba*, quae canum capitis sequitur.

sub

Sub gula linea atra incipit, quae versus nucham tendit. Collum, Pectus, Dorfi initium alba, interdum cum flavedine. Macula alarum anterior et Uropygii lateralis alba. Pedes rubri vel flavi. Reliqua nigra. Remiges secundarii deorsum falcati ex observatione SPARMASII.

Foemina vix minor, caruncula nulla, carina autem pennacea latior, quae ceram rugosam dividit. Rostrum nigrum. Pedes obliquiores. Tota Avis ex brunneo nigroque maculata. Singula penna brunnea medio nigra; pallidiora tamen sunt latera capitis, colli et gula. Abdomen subfulcum. Remiges etiam, sed 15—20 apice albi, ut etiam tectrices proximae, unde fasciae binae albae in ala. Cauda fusco-nigricans.

Mares juniores foeminae saepe concolores, caruncula caret. Tab. 40. Mus. Cariss. ad aliam speciem pertinet. FAVNICUS juniorem Marem Anatis Mollissimae suspicatur.

66. ANAS fusca, nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis. L. S. N. XII. T. I. p. 196. Fn. Su. 109. Lath. Ind. 2. p. 348.

Swärta. It. Gottl. p. 215. 271. N. Act. Succ. 1785. p. 391.

Anas nigra major. Brill. Orn. 2. p. 472.

Aldromandus his Black Duck. Will. Orn. p. 365.

Velvet Duck. Penn. Britt. Zool. 2. p. 383. 1796. Arct. Zool. 2. p. 555.

Double Murreuse. Buff. Av. 9. p. 242.

Sjö-Orre, Anas fera fusca. Gunner: Act. Nid. I. p. 259. t. 5.

Swärta Swärta; Mas Swärta; Wermdönsfåns.

Habitat in utroque Mare.

Mos. Magnitudine circiter Anseris minoris. Rostrum anserinum flavum vel incarnatum lateribus flavum,

ad

ad basin vero nigrum et gibbum. Macula alba pone oculos vel sub. Caput et Collum nigra viridi-nitentia. Corpus totum nigrum. Remiges primores nigri, uno vel altero e secundariis albo et tectricibus etiam, unde macula alba. Cauda brevis. Pedes rubri membrana nigra.

Foemina. Rostrum fuscum absque gibbo. Pone oculos macula albida. Corpus fuscum pennarum apicibus pallidioribus. Remiges 10 primores nigri, 11 niger macula alba. 12—20 albi apicibus obscuris. 21 similis 11. Pedes et cauda maris.

67. ANAS nigra, rostro basi gibbo, corpore toto nigro.

L. S. N. XII. T. I. p. 196. Fn. Su. 110. Lath. Ind. 2. p. 348.

Anas nigra. Brill. Orn. 2. p. 471.

Black Diver or Scoter. Will. Orn. p. 366.

Scoter. Penn. Britt. Zool. 2. p. 384. Arct. Zool. 2. p. 556.

Macreuse. Buff. Av. 9. p. 234. t. 16.

Habitat aestate in Lapponia. Prope Lund capta d. 3. Oct. 1783.

Mas totus niger, at Caput et Collum purpurascens-nitida. Rostrum nigrum medio flavum, basi caruncula compressa bifida viridi-nigrescente (PENNYANT) rubra (LASSÉ, Nois), ungue caret aequae ac foemina. Cauda subcuneiformis, rectricibus 16 acutis. Pedes nigrescentes.

Foemina fusca, caret gibbo rostri, abdomine pallide maculato.

68. ANAS Marila, nigra, humeris cinereo-undulatis, abdomine speculoque alarum albis. L. S. N. XII. T. I. p. 196. Fn. Su. 111. Lath. Ind. 2. p. 353.

Glaucium minus striatum. Brill. Orn. 2. p. 470.

H

Scap

Scaup Duck. Will Orn. p. 365. Penn. Britt. Zool. 2. p. 596. t. 100. Arct. Zool. 2. p. 565.

Le Millouian. Buff. Av. 9. p. 229.

Kagolha. Lepechin it. 3. p. 223. t. 10.

β. Anas fraenata, fulco-ferruginea, speculo alarum, abdomine capitisque annulo ad rostri basin albis. Mus. Carll. 2. t. 33. foemina.

Habitat in Lapponia D. C. SOLANDER.

Magnitudo vix Anatis Boschae. Rostrum crassum. Nigra sunt Rostrum, Caput, Collum, Pectus, Thorax, Cauda, Uropygium, Crissum, Remiges extus, Pedes. Alba macula Alarum, Abdomen quod pollice nudatum aequae ac femora. Dorsum ex albo vel cinereo et nigro undulatum. Remiges primores primi nigri, sequentes intus albidii, secundarii albi apice nigri.

Foemina fusca, thorace et anterioribus corporis griseo-fuscis. Speculum alarum album utrinque nigrum.

69. *ANAS ruficollis,* capite dorso alis caudaque nigris, jugulo rufo fascia alba circumdato, macula inter rostrum et oculos alba paroticaque rufescente.

A. ruficollis, supra nigra, corpore subtus macula ante oculos strigataque longitudinali colli utrinque albis. Lath. Ind. 2. p. 341.

Anser ruficollis. Pall. Spicil. Zool. VI. p. 21. t. 4. ejusd. it. Ross. 3. p. 701.

Redbrensted Goose. Penn. Arct. Zool. 2. p. 571.

Habitat. — Viva capta sub initio Octobris 1793 prope Lund. Mox cicur. Frumentum recusabat, at Brasicae foliis concisis vescabatur.

Bene satis cum descriptione ill. PALLAS 1. cit. data convenit, at in nonnullis differt nostra. Sic minor multo, 20 poll. longa et pond. 1½ librae, nec cum Anate canadensis

densi comparanda. Forma anatina nec anserina, qualem offert figura Pall. Frontis albedo nulla. Nigredo mentum tantum subtus occupat nec sub collo descendit. Magna macula alba inter basin rostri et oculos. Alia major ab oculis ad medium colli descendit, quae tamen quoad maximam partem tegitur macula grisea medio rubicunda. Color Juguli ferrugineo-cinnamomeus taenia alba nigro irregulariter striata cingitur. Cauda aequalis nigra rectricibus XV. apice parum albis. Femora albo nigroque variegata. Foete foemina et specimen ill. PALLAS MBL.

70. *ANAS Anser,* rostro semicylindrico, corpore supra cinereo subtus pallidioro, collo striato. L. S. N. XII. T. I. p. 197. Fn. Su. 114. Lath. Ind. 2. p. 341.

n. Anser sylvestris. Brill. Orn. 2. p. 432.

The common wild Goose. Will. Orn. p. 358.

Grey Lag. Penn. Britt. Zool. 2. p. 570. Arct. Zool. 2. p. 546.

Oye sauvage. Buff. Av. 9. p. 30. t. 2.

Succis Wildgås, Grågås.

β. Anser domesticus. Brill. Orn. 2. p. 431.

The tame Goose. Will. Orn. p. 358. Penn. Britt. Zool. 2. p. 571.

Succis Tam Gås; mas Gåskarl. Scanis Gasse; Pul-lus. Scanis Gåsling.

Habitat a praecipue in Lapponiae fluviis aestate, primo vere accedens, versus hyemem discedens. *β.* ubique praesertim in Scania domesticus.

Pondus 9—10 libr. Rostrum rubrum lateribus flavum, ungue albedo. Caput et Collum cinerea. Humeri et Interseapulum fulco-cinerea striata. Dorsum inferius vel cinereum vel canum albo pennarum margine. Remi-

ges primores nigri rachi alba. *Latere* fusco-cinereo-friata. *Abdomen* cinereum. *Crissum* et regio inter femora alba. *Uropygium* fusco-cinereum. *Rectrices* 18 extimae albae, interiores uropygio concolores albae spicibus.

71. *ANAS albifrons*, cinerea, fronte alba. Lath. Ind. 2, p. 842.

A. Erythropus foemina. Fn. Su. 116.

A. ferus. Brünn. Orn. boz. p. 15. no. 53. 54.

Anser septentrionalis sylvestris. Brill. Orn. 2. p. 433.

White-fronted Goose. Penn. Britt. Zool. 2. p. 576. t. 94. caput. Arct. Zool. 2. p. 548.

Habitat in boreali Sueciae parte.

Pond. 5—6 libr. *Rostrum* altius, pallide flavum, ungue albedo. *Frons* alba. *Caput* et *Collum* cinereo-fusca, vertice obscuriore. *Tectrices* alarum griseae fusco-marginatae. *Pectus* cinereum maculis obscurioribus. *Abdomen* album maculis majoribus nigris. *Tectrices* caudae albae. *Cauda* obscura albo-marginata. *Pedes* fulvi.

Non credo huc pertinere *the laughing Goose*. Edw. Av. 3. t. 153. sed potius ad *Anatom segetum* Lath. vel *Beaugoose Penn.*

72. *ANAS Erythropus*, cinerea supra nigro alboque undulata, collo nigro, facie abdomineque albis. Lath. Ind. 2. p. 845.

A. Erythropus mai. Fn. Su. 116.

Bernacle. Brill. Orn. 2. p. 411.

Bernacle or Clakis. Will. Orn. p. 359.

Bernacle. Penn. Britt. Zool. 2. p. 577. Arct. Zool. 2. p. 552.

Anas Helsingen. Ol. et Pov. it. Isl. I. p. 548. t. 33. Suecis Fjällgås.

Habitat

Habitat in Helsingiae, Lapponiae alpibus.

Mira circa hanc avem confusio. Quatenam avis sit *Helsingegans Clus.* Exot. p. 368, mihi saltem dubium. Si enim circulus albus, quem commemorat, caput vel collum cingat, haud dixit, nec tergum cyanei coloris cum nostra quadrat. *Equ. à Linné* antecedentem pro hujus foemina habuit, anatomia vero D. WALBAUM docuit sexu non tantum differre. Aut itaque diversae sunt species, aut *A. albifrons* junior est hujus speciei proles.

Rostrum, *Caput*, *Collum* ad sternum usque nigra. *Frons*, *Tempora*, *Gula* alba. *Dorsi* pennae cinereae apicibus nigris, margine albis. *Pectus*, *Abdomen*, *Cauda* subtus alba. *Femora* cinerea. *Remiges* cinereo-fusci. *Rectrices* nigrae. *Tectrices* caudae superiores albae. *Pedes* nigri.

73. *ANAS Bernacle*, fusca, capite collo pectoreque nigris collari albo. L. S. N. XII. T. I. p. 198. Fn. Su. 115. Fn. Groenl. 41. Lath. Ind. 2. p. 844.

Brenta. Brill. Orn. 2. p. 442.

Brentgoose. Penn. Britt. Zool. 2. p. 579. Arct. Zool. 2. p. 551. Will. Orn. p. 366.

Le Cravant. Bull. Av. 9. p. 87.

Calmarienfibus Prutgås. Blekingis Taffacka.

Habitat . . . Vere et autumno extremas Oras Blekingiae et Calmariae transmigrat lapidissima hujus generis habita.

Magnitudo anseris minoris. *Corpus* totum fusco-fuliginosum. *Rostrum*, *Caput*, *Collum*, *Pectus* nigra. *Collare* angustum album, ad latera nigro-maculatum latius, in mare antice, in foemina postice integrum. *Remiges* et *Rectrices* supra atrae, in junioribus fuscae, subtus fuscae. *Venter* et *Latere* fusca marginibus pennarum

rum pallidioribus. *Pedes nigri. Alba sunt Abdomen pone pedes, tectrices inferiores caudae et latera Uropygii.*

74. *ANAS mollissima*, rostro cylindrico, cera pollice bifida rugosa. L. S. N. XII. T. I. p. 198. Fn. Su. 117. Fn. Groenl. 42. Brunn. Ejder Fugl. Beskrif. 1763. c. fig. Orn. bor. p. 14. 15. Mus. Carlss. I. t. 6. Lath. Ind. 2. p. 845.

Anser lanuginosus sive Eider. Briss. Orn. 2. p. 441.

Wormius his Eider or soft-headed Duck. The Cuthbert Duck. Will. Orn. p. 362.

Eider. Penn. Britt. Zool. 2. p. 581. t. 95. Arct. Zool. 2. p. 553.

Great black and white Duck. Edw. Av. 2. t. 98.

Oye à duvet ou Eider. Buff. Av. 9. p. 103. t. 6.

Suecis Mas Gudunge, Eider; Foem. Åda. Scanis Åra, Bottngås. Pullus biennis Hellinge.

Habitat in mari Balthico et occidentali, juniores variant colores, sed quadriennis non ultra.

Magnitudo minoris Anseris. Corpus maxima ex parte album, exceptis capitis pileo atro-holosericeo pone bipartito: antice tripartito, angulos versus sinus cerae maxillae superioris emittente. Sternum, Abdomen, tota pars postica atra. Femora, Uropygium, Remiges et Rectrices (16.) nigra. Capitis postica pars juxta pileum viridescit. Pectoris antica pars ex albo incarnata.

Foeminae corpus totum scolopacinum seu cinereum maculis testaceis et nigris undulatum. Linea alarum transversa alba angustissima.

75. *ANAS clypeata*, rostri extremo dilatato - rotundato; ungue incurvo. L. S. N. XII. T. I. p. 200. Fn. Su. 119. It. Gottl. p. 167. Lath. Ind. 2. p. 856.

A. cly-

A. clypeata. Briss. Orn. 2. p. 450.

The Shoveler. Will. Orn. p. 370.

The broadbilled, redfooted Duck of Aldrovandus. Ibid. 371.

Phasianus marianus. Charl. Exerc. p. 105. icon.

Shoveler. Penn. Britt. Zool. 2. p. 596. Arct. Zool. 2. p. 557.

Souchet. Buff. Av. 9. p. 191.

Suecis Skedand, Brodnäbba.

Habitat in mari Balthico.

Mas. Caput nigro-coeruleum nitens. Collum, Pectus alba. Dorsum ferrugineum. Abdomen brunneum. Crissum nigrum? Alae albo-coeruleoque variegatae macula viridi-sericea. Remiges nigri: secundarii fascia alba. Rectrices 14 albae, intermediis nigris. Pedes croci.

Foemina corpore toto scolopacino, macula alarum viridi-aenea inter duas lineas albas transversas. Rostrum utriusque sexus ampliatum rotundatum apice adunco obtuso, maxillarum marginibus ciliatis, denticulis paleaceis alternantibus.

Obi. In Syst. Nat. ed. XII. hanc cum sequente quidem conjunxit Equ. à Linné, auctoritate Nob. PRONANT autem sejungo donec certius sit eas re vera unius esse speciei.

76. *ANAS platyrhynchos*, macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente. Fn. Su. 42.

A. rubens, fusca, jugulo et pectore rubro-fuscis, speculo-alarum purpureo albo marginato, cauda brevi alba. Lath. Ind. 2. p. 857. an?

Gesneri Muggent. Will. Orn. p. 575. an?

A broadbilled Duck with yellow feet. Ibid. p. 371. an?

Redbreasted Shoveler. Penn. Britt. Zool. 2. p. 597.

Habitat

Habitat in fluviis.

Mas. *Macula* alarum violacea nitida utrinque nigra, extra nigredinem utrinque alba. *Foemina* macula alarum ut in mare, sed in medio magis coerulea. *Pectus* in utroque rufescit. *Alae* cinereo-fuscae, at basis et apex cinereae. *Remiges primores* 10 immaculati, 11—20 fusci apice albi, latere exteriore violaceo nitido; horum tectrices fuscae versus apicem albae, ipso apice nigrae. *Dorsum* fuscum totum margine ferrugineo. *Subtus* ferruginea maculis obsolete fuscis. *Gula* pallida ferruginea immaculata. *Rectrices* fuscae lineolis serpentinis inaequali flexu pallidis. *Pedes* rufescentes.

Gaudam albam dicunt à LINNÉ, PENNANT, rectrices vero verbis nuper allatis depingit ille; forte uterque ad tectrices caudae albas rectrices fere obtegentes respexit.

Num sola aetate haec a priori disfert.

77. *ANAS strepera*, speculo alarum rufo, nigro, albo. L. S. N. XII, T. I. p. 200. Fa. Su. 121. Lath. Ind. 2. p. 859.

Strepera. Brill. Orn. 2. p. 452.

The Gadwall or Gray. Will. Orn. p. 374.

Gadwall. Penn. Britt. Zool. 2. p. 603. Arct. Zool. 2. p. 575.

Chipeau. Buff. Av. 9. p. 187. t. 12.

Suecis Skrikand.

Habitat in Aquis dulcibus.

Rostrum nigrum. *Caput* rufescens maculis nigris. *Collum*, *Pectus* et *Humeri* albo-nigroque lineata. *Abdomen* sordide album. *Uropygium* et *Criussum* nigra. *Remiges* fusci. *Speculum* nigrum, antice rufum, postice album. *Cauda* cinerea margine alba. *Pedes* rubri.

Foemina similis mari, at colores minus lucidi, et pectus rufo-ferrugineum nigro-maculatum.

78. *ANAS Clangula*, nigro-alboque varia, capite tumido violaceo, sinu oris macula alba. L. S. N. XII, T. I. p. 201. Fa. Su. 192. It. Gottl. 49. Lath. Ind. 2. p. 867.

Clangula. Brill. Orn. 2. p. 470.

The golden Eye. Will. Orn. p. 368. Mas.

Smaller reddish-headed Duck. Ibid. 369. Foem.

Goldeneye. Penn. Britt. Zool. 2. p. 587. Arct. Zool. 2. p. 557.

Le Garrot. Buff. Av. 9. p. 222.

Suecis Knipa. *Suecis* Dopping.

Habitat in Aquis. Egregie urinatur. Victitat Cochleis et Conchis. Nidificat in cavis arboribus. Sub rigidissimo frigore hyemis 1788 viva capta ad nostras aedat.

Mas. *Caput* magnum, fere cristatum, violaceo-nigrum, macula subrotunda alba ad sinus Oris. *Oculi* aenei. *Rostrum* nigrum. *Dorsum* nigrum, sed linea alba dorsum ab alis distinguit. *Remiges* 1—10 nigri 11—15 nigri apice albo, 14—21 albi, 22—24 nigri. *Collum*, *Pectus*, *Abdomen* et omnia subtus, excepto capite, alba. *Cauda* obtusa, subfurca, nigra, rectricibus 16. *Femora* nigricantia. *Pedes* rubri membrana nigra.

In aliis gula alba et remiges 1—11 nigri, 12—20 plus minus albi, 21—24 iterum nigri.

Foemina. *Caput* caesio-rufescens. *Rostrum* nigrum magis quam in ceteris compressum apice uncinato. *Colli* latera nigricantia. *Dorsum* et *Latera*, *Caudaque* fusca sunt. *Alae* albo-cinereae, remigibus 1—11 nigricantibus totis, 12—14 interiore latere albis, 15—20 omnino albis, 21 latere exteriore albo. *Tectrices* remigum posteriores albo-nigroque variae. *Pectus* antice et ad latera

latera cinereum cauis marginibus seu lineolis transversis
Abdomen album.

79. ANAS Glaucon, corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari. L. S. N. XII. T. I. p. 201. Lath. Ind. 2. p. 368.

A. Glaucon, iridibus flavis, capite griseo, collari albo. Fr. Su. 123.

Glaucon. Briss. Orn. 2. p. 468.

The Glaucon or Morillon of Bellonius. Will. Orn. p. 368.

Morillon. Penn. Britt. Zool. 2. p. 588. Arct. Zool. 2.

p. 573.?

Suecis Brunnacke.

Habitat in maritimis frequens.

Caput, *Iugulum* et *latera* castanea. *Nucha* viridinitens. *Humeri* fusci marginibus pennarum castaneis. *Dorsum* fulco-striatum. *Alae* obscure cinereae speculo ex tribus pennis azureo, infra hoc nigris apice albis. *Supra* speculum linea nigra, et supra hanc fascia alba lata. *Cauda* obscure cinerea tectricibus supra et infra fulco-albo-ferrugineoque maculatis. *Foemina* magis grisea sub rostro albescit. *Speculum* fere nigrum viridinitens albo utrinque septum. *Dorsum* fulcum. *Abdomen* album. *Pedes* grisei. LINNÆ.

Mas. *Caput* sordide nigrum. *Oculorum* irides flavæ, *macula* alarum alba. *Foemina* *Caput* sordide fulcum, in alis loco maculae pennae 5 distinctae albae. *Rostrum* nigricat, *Iris* oculorum glauca. *Collare* album. *Pectus* ad sternum usque nebulosum. *Cauda* et *Alae* nigrae. *Dorsum* fulco-nigrum. *Pedes* et *Tibiae* sordida, *palmæ* atrae. à LINNÆ.

Ab his iterum diversa PENNANTI descriptio. Num ætate ita variant?

80. ANAS Penelope, cauda acutiuscula, crisso nigro, capite bruneo fronte alba, dorso cinereo undulato. L. S. N. XII. T. I. p. 202. Fr. Su. 124. Lath. Ind. 2. p. 369.

A. fistularis. Briss. Orn. 2. p. 464.

Common Wigeon or Hewer. Will. Orn. p. 375.

Wigeon. Penn. Britt. Zool. 2. p. 601. Arct. Zool. 2. p. 574.

Canard Siffleur. Buff. Av. 9. p. 169. t. 10. 11.

Suecis Wriand, Blesand, Gräsand.

Habitat in mari.

Mas. *Caput* et *Collum* supra brunnea. *Front* albida. *Rostrum* nigrum imprimis apice. *Dorsum* cinereo nigroque undulatum. *Pectus* in aliis rufescens, in aliis griseo-testaceum, rarius nigro-maculatum. *Macula* alarum alba, magna ad basin alae, dein nigra, tum azurea, demum nigra. *Pedes* nigri. *Cauda* acutiuscula rectricibus mediis nigris acuminatis, reliquis cinereis.

Foemina. *Caput* ferrugineum nigro-maculatum. *Dorsum* fulcum pallide undulatum. *Pectus* et *Abdomen* albida. *Rostrum* et *Pedes* cinerei. *Alae* macula carent, lineis duabus albis pictae.

81. ANAS acuta, cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato. L. S. N. XII. T. I. p. 202. Fr. Su. 126. Lath. Ind. 2. p. 364.

A. longicauda. Briss. Orn. 2. p. 458.

The Sea Pheasant or Cracker. Will. Orn. p. 376.

Pintail. Penn. Britt. Zool. 2. p. 598. Arct. Zool. 2. p. 566.

Canard à longue queue. Buff. Av. 9. p. 199. t. 13.

Suecis Stjertand.

Habitat

Habitat in maritimis tempore verno.

Mas. Caput et Colli dimidium fordide fuscum, lateribus capitis pallidioribus. Iuxta aures linea pallida in collo superiore deliquescens. Gula albo-maculata. Dorsi initium flavo-fuscum, ceterum albo nigroque undulatum. Latera colli, Pectus, Abdomen albida. Speculum violaceum antice ferrugineum, postice nigrum et album. Cauda cuneata cinerea, subtus nigra: rectricibus intermediis longioribus nigris. Pedes nigri.

Foemina fusco-ferruginea maculis nigris.

62. *ANAS HYEMALIS*, rostri fascia rubra, rectricibus duabus longissimis, speculo alarum nullo. ODMAN: N. Act. Ac. Succ. 1783. p. 314.

A. hyemalis, cauda cuneata; rectricibus intermediis longis, corpore albo, pectore, dorso aliisque nigris, L. S. N. XII. T. I. p. 202. FN. Su. 225. FN. Groenl. 45. Mohr. Hist. Nat. Isl. p. 23. Brünn. Orn. bor. 75-79.

A. glacialis, cauda acuminata elongata, corpore nigro subtus albo. L. S. N. XII. T. I. p. 203. Lath. Ind. 2. p. 864.

A. longicauda ex Insula Terrae Novae. Brill. Orn. 2. p. 461.

Swallowtailed Sheldrake. Will. Orn. p. 364.

Longtailed Duck a variety. Penn. Britt. Zool. 2. t. 99.

Longtailed Duck from Newfoundland. Edw. Av. 6. t. 280.

Canard à longue queue de Terre Neuve. Buff. Av. 9. p. 202.

Sueci Winter Al.

A. longicauda islandica. Brill. Orn. 2. p. 460.

Sharptail'd Island Duck of Wermius. Will. Orn. p. 364.

Anas

Anas islandica Havellda. Worm. Mus. p. 502.

Anas Havellda. Ol. et Pov. iz. Island. p. 549. t. 56.

Troförer. Ström: Act. Nidr. 5. p. 540. t. 8. f. 1.

Longtailed Duck. Penn. Britt. Zool. 2. p. 599. t. 98. Arct. Zool. 2. p. 566.

Longtailed Duck from Hudson's Bay. Edw. Av. 3. t. 156.

Sueci Sommar Al. Utraque varietas, Allögel, Aler, Aller.

Habitat in maritimis Sueciae hyeme a tempore Michaelis ad primum Ver. Fictus testacea. Rev. ODMAN historiam ejus extricavit, et binas imprimis numerat varietates. Suspiciatur idem fig. Ol. et Povellff. ad priorem varietatem pertinere.

Winter-Al

Mas. Caput et Collum nigra macula capitis utrinque magna alba. Area oculorum cinerascens. Rostrum semicylindricum, obtusum, nigrum, medio incarnatum. Nares oblongae. Lingua apice trilobo obtuso, lateralibus lobis brevioribus. Dorsum nigrum. Sterni regio nigra cum dorso nigredine conjuncta. Alae nigrae, subtus cinerae. Speculum nullum. Cauda cuneiformis, rectricibus 14 acutis, lateralibus utrinque albis: intermediis duabus longissimis atro-violaceis. Abdomen a medio album. Latera pulchre cana. Pedes plumbei.

Foemina paulo minor. Rostrum nigrum interdum cingulo pallido, interdum nullo. Regio oculorum alba. Vertex et macula colli utrinque lateralis fusca. Versus pectus albedo collum cingit collaris instar latioris. Pectus fusco et griseo mixtum sensim canescit, donec excipitur abdomine albo. Humeri fusco-rufo et cinereo varii. Scapulae breves. Remiges fulci tectricibus concoloribus griseo-variis. Dorsum, Uropygium nigra, cinereo transversaliter irrorata. Cauda cuneata brevis: rectricibus

cibus mediis fuscis, lateralibus sensim albescensibus.
Pedes plumbei.

Sommar. Al.

Mas. Rostrum praecedentis maris. Genae pallide fuscae. Nucha, Colli dorsum et Inguum alba. Latera Colli superioris fascia obscura deorsum tendente. Pectus et Dorsum fusco-gilva. Scapulae albae, longae, angustae, acutae. Tectrices alarum et Remiges priores nigricantes, secundarii ferrugineo-rufi. Abdomen album, Rectrices 4 mediae nigrae, et 2 harum longiores, reliquae albae. Pedes obscuri. Pennant.

Foemina. Collum et Vertex nigra albo-irrorata. Rostrum fascia rubra. Area oculorum cinerea, margine vel supercilio albo. Gula albicans. Pectus imum cum abdomine alba. Dorsum fusco-cinereum maculis ferrugineis sparatis. Cauda brevis, fusca, lateraliter alba. Remiges fusci. Pedes plumbei.

D. MORA omnes varietates simul vidit, et vix duos mares similes observavit. Dignoscitur optime rectricibus intermediis maris elongatis et fascia rubra rostri.

83. ANAS ferina, cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crasso uropygioque nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 203. Fa. Su. 127. Lath. Ind. 2. p. 362.

Penelope. Brill. Orn. 2. p. 462.

Poher. Pochard, or great redheaded Wigeon. Will. Orn. p. 367.

Pochard. Penn. Britt. Zool. 2. p. 609. Arct. Zool. 2. p. 360.

Le Millouin. Buff. Av. 9. p. 216.

Habitat in Aquis dulcibus.

Mas.

Mas. Mandibula superior plumbea ungue nigro: inferior nigra. Irules rutilae. Caput et Collum castanea. Pectoris et Dorsi suprema pars nigra: inferior pars, tectrices alarum, scapulae et regio subalaris dilute grisea lineolis nigris. Remiges nigro-cinerei. Rectrices 12 unicolores cinereo-fuscae. Abdomen cinereo-fuscoque varium. Uropygium et Crissum nigra.

Foeminae. Caput pallide rufo-fuscum. Pectus saturatius. Tectrices alarum cinereo, Dorsum maris. Abdomen cinereum.

84. ANAS Querquedula, macula alarum viridi, linea alba supra oculos. L. S. N. XII. T. I. p. 203. Fa. Su. 125. Lath. Ind. 2. p. 372.

Querquedula. Brill. Orn. 2. p. 473.

Garganey. Will. Orn. p. 377. Penn. Britt. Zool. 2. p. 604. t. 101. Arct. Zool. 2. p. 476.

La Sarcelle. Buff. Av. 9. p. 260.

Habitat in lacubus.

Mas. Rostrum plumbeum, Vertex fuscus striatus. Nenti macula nigra. A singulo oculo linea alba decurva. Capiti latera et Collum superne pallide rufescentia striis minutis albis. Pectus pallide fuscum maculis lunulatis nigris. Abdomen album, postico et Uropygium maculatum. Alarum tectrices griseae: inferiores albis apicibus. Remiges primores cinerei. Speculum viride margine utroque nigro. Scapulae longae, angustae albo-cinereo-nigroque longitudinaliter striatae. Cauda fuscescens rectricibus 14. Pedes plumbei.

Foemina cinereo-fusca, speculo nullo, macula alba supra oculos. PENNANT.

85. ANAS Crecca, speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos. L. S. N. XII. T. I. p. 204. Fa. Su. 129. Lath. Ind. 2. p. 372.

A. Cir.

- A. Circus*. Brünn. Orn. bor. p. 18. n. 83.
Querquedula minor. Briff. Orn. 2. p. 475.
Teal. Will. Orn. p. 377. Penn. Britt. Zool. 2. p. 606.
European Teal. Penn. Arct. Zool. 2. p. 577.
Petite Sarcelle. Buff. Av. 9. p. 265. t. 17. 18.
Suecis. Årta, Årta. *Westrobothniens*. Kråka. *Scanis*.
 Kricka, Krikand.

Habitat in lacubus et fluviis, sapore praesantissima multis.

Inter Anates Sueciae facile minima 11 — 15 unc. pond. Caput ferrugineum, linea a rostro ad oculos alba, ubi bifurcatur et ramo altero oculum superascendit, altero vero infra oculum descendit; intra hanc bifurcationem macula viridi-coerulea nitens ab oculo versus colulum descendit. Rostrum nigrum sinuum. Corpus totum supra lineis nigris albisque undulatum. Remiges 1 — 10 sulci, 11 — 13 apicibus albis et horum quinque latere anteriore nigro, at 16 — 19 viridi nitentes anteriore latere, 20 et sequ. anteriore latere nigri. Speculum viridi sericeum supra et infra nigrum, antice et postice album. Tectrices alarum fuscae, infimae albae. Pectus album maculis rotundis nigris. Abdomen albidum. Crissum nigrum lateribus album. Rectrices 16 fuscae margine albae, intermediis acutis. Pedes nigri unguibus acutis.

Foemina fusco-cinerea nigro-maculata, speculo alarum viridi.

86. *ANAS Circus*, speculo alarum varii coloris, linea superciliari alba, rostro pedibusque cinereis. L. S. N. XII. T. I. p. 204. Fn. Su. 129.
Querquedula aestiva. Briff. Orn. 2. p. 477.
Summer Teal. Will. Orn. p. 378.

Sarcelle

- Sarcelle d'Été*. Buff. Av. 9. p. 268.
 Habitat in aquis dulcibus.
Pectus rufescens. Genae et Gula castanea. Speculum nigro-virens supra infraque nigrum, margine antico et postico album. LINNÉ.
 Mas. Supra cinereo-fuscus marginibus pennarum candicantibus, subtus albo-rufescens, abdomine griseo-maculato. Taenia candida supra oculos. Rectrices 16, reliqua ut Linné.
 Foemina. Supra cinereo-fusca marginibus pennarum rufescentibus. Subtus mari similis. Taenia supraocularis candida. Genae et Gula albedo variegatae. Speculum viride subtus album. BAISSON.
 Etiam forma Tracheae differt a *Crocca*, quae cum conjungunt PENNANT, LATHAM. Conf. Berlin. Schrift. 4. B. p. 600. etc. tab. 18.
 87. *ANAS histrionica* fusco-albo-coeruleoque varia, auribus, temporibus, linea gemina collari fasciaque pectorali albis. L. S. N. XII. T. I. p. 204. Brünn. Orn. bor. p. 19. (mas.). Fn. Groenl. 46. Mohr H. N. Isl. 24. t. 1. Lath. Ind. 2. p. 349. (mas. et foem.)
A. minuta grisea auribus albis, remigibus primoribus nigrescentibus. L. S. N. XII. T. I. p. 204. Brünn. Orn. bor. p. 20. foem.
A. torquata ex insula Terrae novae. Briff. Orn. 2. p. 457.
Querquedula freti Hudsonis. Ibid. p. 485.
Harlequin's Duck. Penn. Arct. Zool. 2. p. 560.
Dusky and spotted Duck. Edw. Av. 2. t. 99.
Little brown and white Duck. Edw. Av. 3. t. 157.
Canard à collier de Terre neuve. Buff. Av. 9. p. 250.
Canard brun. Buff. Av. 9. p. 252.
Strøm Önd og Brindusa. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 549. t. 54.

I

Anas

Anas torquata. S. G. Gmelin it. 2. p. 179. t. 14.

Die kleine Kaszarka. Lepech. it. 2. p. 133. t. 5.

Habitat in mari occidentali rarius.

Rostrum basi nigrum, medio plumbeum, apice pallide-violaceum. Caput, Collum, Pectus nigro-coerulea. Macula alba ad sinum oris, a qua supra oculum ad nuquam usque linea ferruginea. Iuxta aures alia macula alba, infra quam linea alba decurrit ad latera colli. Sub hac collare album. Ante alas ab utroque latere pectoris fascia alba. Abdomen obscure cinereum lateribus ferrugineis. Scapulares longae albo-nigroque striatae. Remiges primores nigri, secundarii a latere exteriori violacei. Versus flexuram alae macula rotunda alba, et alia infra hanc ex 2 l. 3. tectricum apicibus albis. Ad Uropygii latera macula ovata alba. Cauda acuta nigra.

Formina, multo minor mare. Toti fusco-murina, abdomine pallidiore, maculata. Frons, Gula, Oculorum et aurium regio albida. Alae et cauda dorso concolores, tectrices vero alarum inferiores abdomini.

88. *Anas ferruginea*, fusco-rufa; abdomine pallidiore, rostro pedibusque coeruleis.

A. ferruginea, fusco-rufa, abdomine albo, rostro dilatato pedibusque pallide coeruleis. Lath. Ind. 2. p. 866.

A. ferruginea, cinereo-ferruginea, capite ferrugineo, macula alarum magna alba. Lindroth Mus. Grill. p. 15. au?

A. rufa, rostro pedibusque cinereis. Fn. Su. 134.

Ferrugineus Duck, Penn. Britt. Zool. 2. p. 601. t. 99. Arct. Zool. 2. p. 576.

Habitat in fluviis rarius.

Supra

Supra pulchre rufa, subtus pallidior. Abdomen albidum. Rostrum depressum et pedes pallide coeruleiscentes, at palmarum nigrae. PENNANT.

Quaerit LATHAM, an de foemina *An. Stelleri*?

89. *Anas Alandica*, rostro pedibusque nigris, supra albo-nigro-ferrugineoque varia, subtus cinerea maculata, cauda fasciata.

A. Alandica, subtus sordide alba, supra nigro-ferrugineo-alboque varia, scapularibus plumis nigris margine ac lineis disci albo-ferrugineis, antice in angulum coalescentibus, variegata, rostro pedibusque nigris. Mus. Carlsf. 3. t. 60.

Anas Sparrmanni, Lath. Ind. 2. p. 876.

Sueciae Sjöand.

Habitat in mari Baltico circa insulas Alandiae.

Capillitium ferrugineum nigro-maculatum. Latera capitis, Cervix, Gula, Jugulum cinerea fusco-punctata. Juguli inferior pars ferrugineo-nigroque maculata. Pectus et Abdomen sordide alba. Inter scapulas, Scapularum et aliquot Hypochondriarum pennae nigrae margine subferrugineae, et in disco taeniae duae pallidiores versus apicem in angulum coeuntes. Tectrices alarum supra et infra fuliginoso-fuscae marginibus albicantibus. Remigum primorum extimus sordide albidus apice fusco, reliqui latere exteriori et apice fusco-nigricantes, interiori fusco-albidi. Uropygium ferrugineum ac albidum nigro-maculatum. Crissum elongatum album. Cauda ferruginea, fasciis nigris, subaequalis.

An ab hac diversa *Anas Shoorra*. Leem Lapp. p. 266. Lapmark Duck. Penn. Arct. Zool. 2. p. 576?

90. *Anas Boschas*, rectricibus intermediis (maris) recurvatis rostro recto. L. S. N. XII. T. I. p. 205. Fn. Su. 131. torque alba. Lath. Ind. 2. p. 850.

- a. Anas fern.* Briss. Orn. 2. p. 447.
The common wild Duck or Mallard. Will. Orn. p. 571.
 Mallard. Penn. Britt. Zool. 2. p. 591. Arct. Zool. 2. p. 565.
Wild Ducks. Penn. Britt. Zool. 2. t. 98.
Canard sauvage. Buff. Av. 9. p. 115. t. 7. 8.
Suecis Wildand, Grafand, Elinacke,
β. Anas domestica. Briss. Orn. 2. p. 443.
The common tame Duck. Will. Orn. p. 580.
Suecis Tam And, Hem And.
Mas. Andrake, Ankbonde. *Scanis* Andrick.
Foemina Anka. *Pallus* Scanis Alling.

Habitat *a.* in lacubus, fluviis, paludibus. *β.* hospitatur mansueta ubique coloribus varia, cristata et sine crista.

Mas. Rostrum flavo-virescens. Caput obscure viridi-aureo nitente. Collum album. Pectus ferrugineum. Sternum et Abdomen cinerascens striis undulatis minutissimis confertis. Dorsi initium pectori concolor. Scapulari albae fusco-friatae. Alae supra subfuscae, subtus albae. Speculum obscure coeruleum, supra et infra nigrum, antice et postice album. Remiges primores 1 - 10 cinerei, secundarii subfusci, quorum 11 - 21 apice albi, 12 - 20. in medio violacei, exterius nigri, apicibus vero albis. Tectrices horum 11 - 20 cinereae in medio albae, apice nigrae. Rectrices 24, quarum 4 intermediae nigrae recurvae. Pedes miniati.

Foemina. Supra fusca marginibus pennarum ferrugineis, subtus dilute rufa fusco-maculata. Speculum coeruleum utrinque nigrum, dein album.

91. *ANAS Fuligula*, crista dependente, corpore nigro, abdomine speculoque alarum albis. L. S. N. XII. T. I. p. 207. Fa. Su. 132. Lath. Ind. 2. p. 369.
Glaucium minus. Briss. Orn. 2. p. 469.
The tufted Duck. Will. Orn. p. 565. Penn. Britt. Zool. 2. p. 585. Arct. Zool. 2. p. 575.
Penit Morillon. Buff. Av. 9. p. 227. 231. t. 15.
Suecis Wigge.
 Habitat in mari.

Rostrum et Pedes plumbei. Corpus totum nigrum excepto abdomine a pectore caudam versus albo. Speculum album. Remiges primores fuliginosi, secundarii albi apicibus nigris. Uropygium et cauda fusca, rectricibus 14. *Foemina caret crista capitis.*

Junior Avis obscure ferruginea lateribus capitis juxta rostrum pallide flavis, et haec est A. latirostris Brunn. Orn. bor. 91. secundum PENNANT.

92. *ANAS Stelleri*, crista nuchae obsoleta maculaque viridi, corpore albo, remigibus secundariis atro-coeruleis: intimis deorsum falcatis acutis.
A. Stelleri Pallas Spicil. Zool. VI. p. 35. t. 5.
A. dispar Mas, crista occipitali abbreviata sinuagdinata, remigibus aliquot secundariis coeruleis antrosum falcatis apicibus albis. Mus. Carlsf. 1. t. 7.
A. dispar foemina, ferruginea, fusca nigroque undulata, alarum maculis duabus parvis albis. Mus. Carlsf. 1. t. 8.
A. dispar alba, subtus ferruginea, occipitis macula fronteque virescentibus, orbitis, gula, jugulo, collaris dorsoque nigris. Lath. Ind. 2. p. 366.
Western Duck. Penn. Arct. Zool. 2. p. 564. t. 23.
 Habitat . . . in flumine Ostrogothico occiduum par Museum Carlsfionianum servat.

Ma. Colore variare videtur, uti indicant descriptiones Auctorum citatae. *Rostrum* nigrum. *Caput* et *Collum* supra albo, subtus nigra. *Area oculorum* nigra. *Macula* inter rostrum et oculos viridis. *Nacha* viridis crista parva obsoleta. *Collare* nigro-violaceum (in Specimine D. PALLAS forte juniore deest). *Dorsum* nigrum. *Pectus* obsolete ferrugineo-flavescent. *Abdomen* nigrescens. *Alarum* tectrices albæ. *Remiges primores* decem fusco-nigricantes, *secundarii* 11 — 20. toti atro-coerulei nitidi apicibus albis, 21-23. latere exteriori huius concolores: interiore albi, angusti, scuti, dorsum falcati. *Cauda* subtus fuscescens, supra nigra. *Pedes* nigrescentes.

Fœmina tota plumis fusco-ferrugineis macula nigricante insignitis vestitur. *Caudæ* idem color. *Remiges primores* nigricantes, *secundarii* nonnulli apicibus albescent, unde macula posterior alba, sic etiam *tectrices* aliquot, unde prior et major macula. *Remiges* nulli falcati. *Pedes* obscuri.

M E R G U S.

Rostrum denticulatum subulato-cylindricum, apice aduncum.

95. *Mercurus Merganser*, capite subcristato, supra albo-nigroque varius, subtus flavescent, pedibus rubris.

Merganser. Briss. Orn. 2. p. 423.

Goosander. Penn. Britt. Zool. 2. p. 556. t. 92. Arct. Zool. p. 546.

Ma.

M. Merganser, crista longitudinali erectiuscula, pectore albedo immaculato, reatricibus cinereis scapo nigricante. L. S. N. XII. T. I. p. 208. Brunn. Orn. bor. p. 71.

M. Mer-

M. Merganser mas, capite atro-viridi-nitente vix cristato, collo niveo, dorso cinereo, tectricibus niveis, remigibus anticis atris, pectore abdomineque flavescente, pedibus ruberrimis. ÖDMAN. N. Act. Ac. Suec. 1785. p. 54.

M. Merganser, subcristatus albus, capite, collo supremo, dorso remigibusque nigro-nitentibus; cauda cinerea. Lath. Ind. 2. p. 828.

M. ferrator. Berlin. Beschäft. 1. p. 170. 2. p. 551.

M. Asiaticus. S. G. Gmelin it. 2. p. 158. t. 20.

Goosander. Will. Orn. p. 535.

Harle. Buff. Av. 3. p. 267. t. 23.

Suecis Skrake, Körfogel, Wrakfogel, Wrakand, Fisk aud. Scanis Sjöbano.

Fœmina.

M. Castor, capite cristato cinereo, subtus ferrugineo, rostro pedibusque nigricantibus. L. S. N. XII. T. I. p. 209.

M. castor, cristatus cinereus, capite colloque supremo spadiceis, gula, remigibus intermediis abdomineque albis. Lath. Ind. p. 829.

M. Merganser fœmina, cinerea, capite cristato rufescente, gula alba, alis speculo albo-linea nigra diviso, pectore et abdomine flavescente, pedibus pallidis. ÖDMAN l. cit. p. 311.

Merganser cinereus. Briss. Orn. 2. p. 428.

The Dun-Diver or Sparling fowl. Will. Orn. p. 535.

Mergus Rubricapilla. Brunn. Orn. bor. p. 22.

Harle femelle. Buff. Av. 3. p. 272.

Suecis Skraka, Skräcka. Scanis Skallflukate.

Habitat in lacubus et fluviis. Nidificant aliae inter lapides sub fruticibus et vocantur *Stenskraka*, aliae in arborum cavis et vocantur *Trädskräcka*. ÖDMAN.

Ma.

Max. *Rostrum* nigrum denticulis quoque nigris, lateribus et oris sinibus rubris. *Caput* et *Colla* proxima pars supra nigra nitore viridi. *Pennae* pilei densi tumidique, ut cristam erectam, vix autem distinctam efficiant. *Dorsum* primo nigrum utrinque album, deinde cinereum. *Uropygium* album cinereo conspurcatum. *Remiges primores* 10 fusco-nigricantes, 11-14 latere exteriori nigri interiore albi, 15-20 toti albi, 21-27 albi linea longitudinali nigra. *Colla* inferior pars et tota avis subtus flavescens. *Rectrices* 13 cinerae. *Pedes* ruberrimi.

Foemina. *Rostrum* maris, sed minus. *Caput* rufofuscum, sub gula albidum, *crista* angustiore. *Collum* supra, *Humeri*, *Dorsum* cinerea. *Collum* subtus, pallide cinereum maculatum. *Pectus* et *Abdomen* pallide flavescantia. *Remiges* 25, horum 10 *primores* nigricantes, 11-20 similes maris; *rectrices* autem horum proximi albi, reliqua alae cinerea. *Rectrices* 12 obscurae cinerae. *Pedes* pallidiores.

Diversas species iterum facit LATHAM, alii juniorum tantum varietatem β . credunt.

94. *Mergus Serrator* *crista* dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, *rectricibus* fuscis cinereo-variegatis. L. S. N. XII. T. I. p. 208. Fabr. Fn. Groenl. 48. Lath. Ind. 2. p. 329.

M. Merganser, *crista* dependente, capite nigro-coeruleo, collari albo. Fn. Su. 155. it. Gottl. 166. mar.

M. Serrator, *crista* dependente, capite nigro maculis ferrugineis, macula alari alba nigro-bifida. Fn. Su. 136. it. Gottl. 271. foemina.

Merganser cristatus, Briss. Orn. 2. p. 424.

The Serula, Will. Orn. p. 336.

Redbreasted Merganser, Penn. Brit. Zool. 2. p. 558. t. 95. Arct. Zool. 2. p. 537.

Red-

Redbreasted Goose, Edw. Av. 2. t. 95.

Harle kuppe, Bull. Av. 8. p. 275.

Mergus Merganser, Toppönd, Grafönd. Ol. et Pov. it. Isl. I. p. 550. t. 37.

Mergus cristatus, Brünn. Orn. bot. p. 25. mar.

Mergus ferratus, ibid. p. 25. foem.

Gottlandis mar Ard, foemina Pracka.

Habitat ubique in aquis.

Rostrum obscure rubrum, supra longitudinaliter nigrum. *Caput* adulti maris nigrum nitore viridi-aureo, *crista* postice dependente longitudinaliter capitis. *Palpebrae* albae, *Collum* album, *cervico* longitudinaliter nigra. *Pectus* ferrugineum maculis nigris deliquescentibus; ad utrumque pectoris latus *pennae* albae nigro-marginatae. *Dorsum* nigrum, *Uropygium* et *latera* tenuiter cinereo-undulata. *Cristum* niveum, *Rectrices* 16—18 fusco-cinerae. *Alae* nigrae speculo albo. *Remigum secundariorum* medii una cum *rectricibus* albi, basi nigri: intimi quatuor albi, latere interiore nigro-marginati. *Ala spuria* nigra. *Pedes* rubri. Juniores aves *caput* habent fusco ferrugineum, *dorsum* pallidius nigro-maculatum, *collum* plus minus flavo-ferrugineum punctis nigrescentibus, *Cervicem* longitudinaliter nigrescentem. *Mares* adulti nondum colore perfecti et foeminae annoae *caput* nigrum parum viridi-nitentem macula utrinque ferruginea habent. PALLAS Berlin. Belsch. 2. p. 553.

Foeminae. *Crista* minor. *Jugulum* et *Pectus* cinereo-undulata. *Abdomen* album, *Dorsum* et *cauda* cinerea undulata. *Remiges primores* nigrescentes, *secundarii* nigri dimidiato-albi, interiores primoribus concolores. *Speculum* album linea 1 l. 2 nigra divisum.

Obs. Varie differunt Auctor. descriptiones, quod ex diversa avis descriptae aetate pendet.

95. *Mergus Albellus*, crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris; alia variegatis. L. S. N. XII. T. I. p. 269. Fn. Su. 157. Lath. Ind. 2. p. 851.

Mergus cristatus minor fuit *Albellus*. Briss. Orn. 2. p. 425.

The other *Albellus* of *Aldrovand.* Will. Orn. p. 557. *Smew*. Britt. Zool. 2. p. 559. Arct. Zool. 2. p. 559. la *Picte*. Buff. Av. 9. p. 275.

β. *M. minutus* capite laevi griseo, fascia oculari nigra, macula suboculari alba. L. S. XII. T. I. p. 209.

M. minutus, capite griseo laevi. Fn. Su. 158.

M. glacialis. Brunn. Orn. bor. p. 24.

M. albellus, ibid. p. 24.

Mergus stellatus. Briss. Orn. 2. p. 428.

Redheaded Smew. Penn. Arct. Zool. 2. p. 560.

Minute Smew. Penn. Arct. Zool. 2. p. 540.

Habitat in mari Balthico rarius.

Alba sunt Caput, Crista, Collum, Pectus, Abdomen, macula oblonga et fascia transversa alarum. Nigra macula lateralis capitis, crista subtus et nucha, Dorsum, Alae. Cineres Rostrum, Pedes, Cauda. In β caput ferrugineum.

Mergus minutus *Lin.* Specie ab *Albello* non differre certum videtur, an vero foemina vel tantum junior *Auis* adhuc non evictum est. *Cel. LATHAM.* *Mergus minutus* Fn. Suec. ab illo *System.* diversum facit, licet dubie.

ALCA.

ALCA.

Rostrum edentulum, breve, compressum, convexum, sulcatum saepius transverse. *Mandibula* inferior ante basin gibba.

Nares pone rostrum.

Pedes tridactyli, palmati, compedes.

96. *ALCA Torda*, rostro compresso ancipiti sulcato, lineae utrinque albae ad oculos. L. S. N. XII. T. I. p. 210. N. Act. Ac. Succ. 1788. p. 214. Fahr. Fa. Groenl. 50.

A. Torda, rostri fulcis quatuor: linea utrinque alba a rostro ad oculos. Fn. Su. 159. Lath. Ind. 2. p. 795. it. Gottl. p. 236.

Alca. Briss. Orn. 2. p. 383.

Razorbill, *Auk*, *Murre*. Will. Orn. p. 525.

Razorbill. Penn. Britt. Zool. 2. p. 509. t. 82. Arct. Zool. 2. p. 509. Edw. Av. 7. t. 358. f. 11.

Pinguin. Buff. Av. 9. p. 590. t. 27.

Gottlandis Tord. *Angermannis Mule.* *Roslogis Tordmule.*

Habitat in Insula Carolina Gottlandiae, in Insula Bonden Angermanniae, juxta Nämön Sudermanniae etc. Ovum 1.

Magnitudo Cornicis colore toto prono corpore nigro, subtus vero pectore, abdomine, tectricibus inferioribus alarum albis, unde linea alarum alba. *Remiges primores* 11 nigri, *secundarii* 15 nigri apicibus albis. Ab oculis ad summum marginem rostri linea alba utrinque decurrit. *Rostrum* cultratum, obtusissimum fulcis 4 in superiore maxilla, at 2 in inferiore, transversum exaratum, quorum secundus, interdum bini, albus est. *Maxillae inferioris apex* incurvus. *Nares* tectae plumis albis.

albis. *Pedes nigri. Cauda cuneata. Uropygium album. Rectrices 10* (12 Brill.) *quarum medium par angustius.*

In pullis primi anni nullum sulcum rostri observari potuit. *Leche* alium Februario mense vidit, qui linea alba capitis carebat, quale specimen etiam nobis ad manus est, Januarii mense captum.

Alca Balthica. Brünn. Orn. bor. p. 25 hujus varietas. FABRICIUS, ÖDMAN.

97. *ALCA Pica*, rostro laevi compresso, corpore toto subtus apicibusque remigum posticorum albis. L. S. N. XII. T. I. p. 210. Fabr. Fn. Groenl. 41.

A. unifulcata. Brünn. Orn. bor. p. 25.

Blackbilled Auk. Penn. Britt. Zool. 2. p. 511. Arct. Zool. 2. p. 510.

Peit Pinguin. Buff. Av. 9. p. 396.

Habitat in mari arctico.

Magnitudo præcedentis, vel potius major. *Rostrum* nigrum magis elongatum et angustum, vix unifulcatum. *Supra* tota nigra, *subtus* alba. *Nares* tectæ plumis nigris. *Pedes* nigrescentes.

Varietas tantum præcedentis junior secundum LATHAM.

98. *ALCA impennis* rostro compresso - ancipiti fulcato, macula ovali utrinque ad oculos. L. S. N. XII. T. I. p. 210. Fn. Su. 140. Fabr. Fn. Groenl. 52. Lath. Ind. 2. p. 710.

Alca major. Brill. Orn. 2. p. 382.

Anser Magellanicus, l. Pinguin. Worm. Mus. p. 300. l. 301.

Pinguin, Hoyers Gaisfugel. Will. Orn. p. 322.

Great Auk. Penn. Britt. Zool. 2. p. 507. t. 81.

Ner-

Northern Pinguin. Edw. Av. 3. t. 147.

Grand Pinguin. Buff. Av. 9. p. 313. t. 29.

Habitat in mari norvegico rarius.

Magnitudo Anseris, *supra* tota, *capite* et *jugulo* nigris, *subtus* alba. *Rostrum* fulcatum. *Macula* magna alba oblonga a rostri basi ad oculos. *Alae* minutae, volatui ineptae. *Collare* album pingit WORMIUS.

Juniorum rostra haud fulcata.

99. *ALCA arctica*, rostro compresso - ancipiti fulcato, sulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque albis, palpebra superiore mucronata. L. S. N. XII. T. I. p. 211. Fabr. Fn. Groenl. 53. Lath. Ind. 2. p. 792.

A. arctica, rostro compresso - ancipiti quadrifulcato, oculorum orbita temporibusque albis. Fn. Su. 141.

Fratercula. Brill. Orn. 2. p. 380.

Coulterneb, Puffin, Guldenhead, Botlenose etc. Will. Orn. p. 325.

Puffin. Penn. Britt. Zool. 2. p. 512. Arct. Zool. 2. p. 511. Edw. Av. 7. t. 353. f. 1.

Macareux. Buff. Av. 9. p. 358. t. 26.

Alca deleta. Brünn. Orn. bor. p. 25. *Pullus.*

Norwegis Lunda. Nautis Grönlandsk Papegoya.

Habitat in rupibus et præcipitiis montium maris atlantici, præsertim in insulis, cum non nisi pacato mari piscari possit. Nidificat in scopulo, unico in hoc genere semper ovo.

Rostrum basi nigrum sulco 1. antice rubrum sulcis 4. In gibbere mandibulae inferioris appendicula membranacea. *Palpebra superior* (non omnibus specimenibus Fabr.) mucronis instructa. Tota avis *supra* et *jugulo* nigra. *Genae tumidae, Pectus, Abdomen* alba. *Sinus oris* macula alba. *Rectrices* 16. *Pedes* fordide rubri.

100.

100. *ALCA Alle*, rostro laevi conico, abdomine toto subtus remigumque pollicorum apicibus albis, pedibus nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 211. Fn. Su. 142. Brünn. Orn. bor. p. 26. Mohr Hist. Nat. Isl. p. 29. Lath. Ind. 2. p. 795.

Uria minor. Briss. Orn. 2. p. 378.

The small black and white Diver. Will. Orn. p. 343. Edw. Av. 2. t. 91.

Little Auk. Penn. Britt. Zool. 2. p. 517. t. 82. Arct. Zool. 2. p. 512.

Petit Guillemot. Buff. Av. 9. p. 354.

Peder Dricker. Gunner: Act. Nidros. 1. p. 261. t. 6.

Alca Hofárdill. Ol. et Pov. it. Isl. 2. p. 984. t. 35.

Nautis Grönlands Dufwa.

Magnitudo minoris Columbae. *Rostrum* breve, conicum, subtus plumis ad $\frac{2}{3}$ in medio longitudinaliter confutum, nigrum. *Nares* rotundatae. *Vertex* quasi depressus. Tota avis *supra* nigra praeter lineam alarum albam. *Ingulum* et *Colla* latera ex nigro cinereoque tenuissime mixta. *Macula* parva supra oculos. *Gula*, *Genae*, *Pectus*, *Abdomen*, *Crianium* alba. *Pedes* nigri. *Lineolae* albae doti non in omni specimine.

Alcas omnes hyberno tempore alio ludere colorum ordine alserit O. FABRICIUS.

PROCELLARIA.

Rostrum edentulum, subcompressum, mandibulis aequalibus: superiore apice adunco, inferiore apice compresso-canaliculato.

Nares cylindro supra basin rostri decumbente truncato.

Pedes palmati, ungue postico sessili absque digito.

101. *PROCELLARIA pelagica*, nigra, uropygio albo. L. S. N. XII. T. I. p. 212. Fn. Su. 143. Lath. Ind. 2. p. 826.

Stormwädersfogelen. Act. Reg. Ac. Suec. 1745. p. 95. t. 6.

Procellaria. Briss. Orn. 2. p. 398.

Stormfisch. Will. Orn. p. 395.

Stormy Petrel. Penn. Britt. Zool. 2. p. 555. t. 91. Arct. Zool. 2. p. 536.

The little Peteril. Edw. Av. 2. t. 90.

Oiseau de tempête. Buff. Av. 9. p. 327. t. 23.

Suecis Stormwädersfogel.

Habitat in mari super undas currens, instante procella proram puppamque navium petens, unde praefugia nautarum de instante tempestate, quam aviculac evitare conantur.

Magnitudo Hirundinis, tota nigra, in dorso magis saturate, in pectore et abdomine magis obscure, sed tectrices rostrum supra infraque albae apicibus nigris. *Rectrices* 12. aequales nigrae, alis breviores, obtusae. *Remiges* primores acuti. *Tectrices alarum* secundi ordinis apice parum albicant. *Pedes* nigri, femoribus seminudis. *Rostrum* nigrum.

102. *PROCELLARIA glacialis*, albicans dorso canescente. L. S. N. XII. T. I. p. 213. Fn. Su. 144. rostro pedibusque flavescens. Lath. Ind. 2. p. 823.

Procellaria. Martin: Act. R. Ac. Suec. 1759. p. 95. t. 3.

Procellaria cinerea. Briss. Orn. 2. p. 399.

Hafhest. Will. Orn. p. 395. Gunner: Act. Nidros. 1. p. 182. t. 1.

Fulmar. Penn. Britt. Zool. 2. p. 549. t. 91. Arct. Zool. 2. p. 534.

Fulmar ou Petrel, Puffin gris blanc. Buff. Av. 9. p. 302. t. 22.

Habitat in mari septentrionali intra circulum arcticum inhians Cetus, quorum lardum rostro excidit.

Corpus magnitudine Gallinae, album cum tinctura canescenti incarnata. Dorsum totum magis canescens. Remiges latere interiore magis albicantes, cauda longiores. Cauda rotundata alba rectricibus 16. Pedes rubri, compedes. Nares constant unico cylindro fusco, intus diviso. Rostrium rufescens, compressum, mandibulis ex 5 ossibus. Femora seminuda.

PELECANVS.

Rostrium rectum, apice adunco unguiculato.

Nares rima oblitterata.

Facies nudiuscula.

Pedes aequilibras, digitis omnibus quatuor simul palmatis.

103. PELECANUS Carbo, cauda rotundata, corpore nigro, rostro edentulo, capite laevi. Fabr. Fa. Groenl. 57. (subcrifatus) L. S. N. XII. T. I. p. 216. Fr. Su. 145. Lath. Ind. 2. p. 386.

P. Phalacrox. Brünn. Orn. bor. p. 31.

Cormorant. Will. Orn. p. 329.

Cormorant. Penn. Britt. Zool. 2. p. 608. Arct. Zool. 2. p. 581.

Cormoran. Buff. Av. 8. 310. t. 26?

Junior Avis Fabr.

Pelecanus Graculus, cauda rotundata, corpore nigro subtus fusco, rectricibus duodecim, rostro edentulo. L. S. N. XII. T. I. p. 217. Brünn. Orn. bor. p. 31. Lath. Ind. 2. p. 387.

P.

P. subtus fuscus, rectricibus duodecim. Fr. Su. 146.

Shag. Will. Orn. p. 332. Penn. Britt. Zool. 2. p. 581.

Phalacrocorax minor. Briff. Orn. 2. p. 496.

Petit Cormoran ou le Nigaud. Buff. Av. 8. p. 319.

Suecic Hafs Tjäder. Sennis Ålkrok, Ålkråka.

Habitat in mari, arboribus insidet. Nidificat in scopulis.

α. Rostrium supra nigricans, lateribus et subtus albicans. Ante oculos area angusta simul cum rictu oris gulaque flavescens. Caput vertice planiusculo. Collum longum. Tota avis nigra, sed gula quatenus plumis tecta alba, quae albedo etiam continuatur initio juguli pennis tenuissimis sparsis inter nigras. Tectrices alarum et Humeri cupri colore nitent. Supra femora utrinque macula magna alba, pennis ceteris tumidior. Remiges primores 10, secundarii 20, dein 5 l. 6 brevissimi, quos sequuntur 5 longitudine priorum. Rectrices 14.

Foemina minor sine maculis femorum.

β. supra niger, subtus fusco-cinereus. Rostrium fere nigrum. Rectrices 12.

P. Carbo et crifatus ab omnibus fere auctoribus confunduntur, etiam Graculus cum hoc [ab accuratissimo PENNANT, in Zool. Arct. l. cit. autem errorem correxit. P. Graculus judice autopta FABRICIO tantum junior est Carbo.

104. PELECANUS crifatus, crista suberecta, corpore atro immaculato, rectricibus duodecim. Fabr. Fa. Groenl. 58. Mohr Hist. Nat. Isl. p. 33. Brünn. Orn. bor. p. 31.

P. crifatus, corpore viridi-nitente subtus obscuro, rostro pedibusque obscuris, capite crifato. Lath. Ind. 2. p. 388.

K

P.

- P. cristatus*, *Topularsen*. Gunner: Act. Nidr. 3. p. 141.
T. 3. f. 7. 8. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 555. t. 39.
Phalacrocorax. Briss. Orn. 2. p. 495.
Shag. Penn. Britt. Zool. 2. p. 610. t. 102.
Crested Cormorant. Penn. Arct. Zool. 2. p. 583.

Habitat in mari boreali.

Minor praecedente, totus niger, immaculatus, crista capitis inſ. foeminis minus observanda, caeterum similes. Rectrices 12, Pulli similes pullis *P. Carbonis*.

105. *PELECANUS Bassanus*, cauda cuneiformi, corpore albo, roſtro serrato, remigibus primoribus nigris, facie caerulea. L. S. N. XII, T. I. p. 217. Fn. Su. 147. Fn. Groenl. 59. Lath. Ind. 2. p. 891.
Sula Bassana. Briss. Orn. 2. p. 492.
Soland Goose. Will. Orn. p. 328.
Gannet. Penn. Britt. Zool. 2. p. 612. t. 103. Arct. Zool. 2. p. 582.
Fou de Bassan. Buff. Av. 3. p. 376.

Habitat in Oceano Norwegico versus Marstrand. Ad littora non accedit pelagica avis.

Roſtrum coeruleum apice albido margine tenuissime ferratum. Facies ante, circa et sub oculos, gula ad latera nuda coerulea. Gula nuda nigrescens. Stria a sinu oris ad nucham nuda nigra. Corpus album. Remiges primores et tectrices parvae plurimum nigrae. Pedes coeruleo-fulvi.

Pulli primi anni fusci, punctis albis trigonis.

COLYMBUS.

- Roſtrum edentulum, subulatum, rectum, acuminatum.
Nares lineares ad basin rostri.
Lingua basi utrinque serrata.
Tibiae compressissimae.
Pedes palmati, tetradactyli, pone aequilibrium.
106. *COLYMBUS arcticus*, capite cano, collo subtus atro-violaceo: fascia alba interrupta. L. S. N. XII, T. I. p. 221. Lath. Ind. 2. p. 900.
C. arcticus, pedibus palmatis indivisis, jugulo nigro-purpurascente. Fn. Su. 150.
C. arcticus, capite et collo cinereis, gutturo nigro-violaceo, dorso nigro maculis quadrangularibus albis. Brünn. Orn. bor. p. 40.
C. arcticus Humber. Gunner: Act. Nidr. I. p. 240. t. 2. f. 1.
Loon. it. [Gottl. p. 241.
Lumme. Worm. Mus. p. 340. t. Q. q.
Mergus gutturo nigro. Briss. Orn. 2. p. 391.
Wormius his northern Doucher. Will. Orn. p. 343.
Blackthroated Diver. Penn. Britt. Zool. 2. p. 527. t. 85. Arct. Zool. 2. p. 520.
Speckled Diver or Loon. Edw. Av. 3. t. 146.
Le Lumme. Buff. Av. 3. p. 261.
Succis. Lom, Skarf.

Habitat in lacubus Sueciae. Nidificat in littore. Ova 2.

Magnitudo Anseris minoris. Caput et Cervix cinerea. Jugulum atrum violaceo et viridi resplendens. Colli Pectorisque latera lineis longitudinalibus nigris albisque alternis. Sub gula collare e maculis circiter 3 albis. Supra tota avis nigra maculis albis, subtus alba. Pedes rubentes.

107. *Colymbus septentrionalis*, collo subtus macula scutiformi ferruginea. L. S. N. XII. T. I. p. 220. Fabr. Fn. Groenl. 61. Lath. Ind. 2. p. 801.
C. arcticus. Fn. Su. 150. Variet. in descriptione allata.
C. Lumme, corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice ferrugineo. Brünn. Orn. bor. p. 59.
C. arcticus collo rufo. Gunner: Act. Nidrof. I. p. 244. t. 2. f. 2.
Mergus guttate rubro. Brill. Orn. 2. p. 390.
Redthroated Diver. Penn. Britt. Zool. 2. p. 526. t. 85. Arct. Zool. 2. p. 520.
Redthroated Ducker or Loon. Edw. Av. 2. t. 97.
Suecis Hafis Lom.

Habitat in mari Balthico, praesertim circa Alandiam.

Magnitudo circiter praecedentis. *Rostrum* fulco utrinque longitudinali, inter sulcos albescens. *Caput* et *Collis* latera cana vertice obscuriore. *Jugulum* macula scutiformi ferruginea. *Cervix*, sub jugulo et ad pectoris latera plerumque lineae longitudinales nigrae albaeque alternae. *Pectus* et *Abdomen* alba. *Crista* fascia nigra. *Supra* nigra maculis inaequalibus albis.

Juniores macula scutiformi et albis dorsis carent.

U R I A.

Rostrum rectum, subulatum, lateribus compressum, mandibula superiore versus apicem parum curvata.

Nares lineares ad basin rostri in fovea.

Lingua integra.

Tibiae carinatae.

Pedes palmati, tridactyli, pone aequilibrium.

108. *URIA Grylle*, corpore atro, tectricibus alarum albis. Fabr. Fn. Groenl. 60. N. Act. Ac. Suec. 1781. p. 228. Lath. Ind. 2. p. 797.

Colym-

- Colymbus Grylle*, pedibus palmatis tridactylis, corpore atro, tectricibus alarum albis. L. S. N. XII. T. I. p. 220. Fn. Su. 148.
Grylle. it. Gottl. p. 214.
Uria minor nigra, columba groenlandica vulgo dicta. Brill. Orn. 2. p. 379.
The Greenland Dove or Sea Turtle. Will. Orn. p. 526.
Black Guillemot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 521. Arct. Zool. 2. p. 516.
Petit Guillemot noir. Buff. Av. 9. p. 358.
Teistle, Columba Groenlandica major. Gunner: Act. Nidrof. 1. p. 257. t. 4.
Suecis Grisla. *Gottlandis Grylle*. *Scanis Ifte*.

Habitat in mari Balthico ad Gottlandiam et Bornholmiam, in occidentali ad Torckow etc.

Magnitudo minoris Anatis, adulta tota nigra praeter maculam alarum albam et pedes rubros. Erroneo *rostrum* in Syff. Nat. rubrum dicitur. At pedes junioris nigri aetate rubescunt.

Avis haec pro aetate plurimum variat, et hinc species multiplicarunt auctores.

- a. Uria grylloides*. Brünn. l. cit. est pullus primi anni.
b. Uria balthica. ibid. 115. 116.
Uria minor striata. Brill. Orn. 2. p. 379.
Spotted Guillemot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 85.
Suecis Sillknipa.
 est adultior avis subtus alba nigro-maculata, maculaque alari variegata.
 Hyeme canescere. *Caput* adulti, collum anteriorque dorsis pars *LINNE*, *FABRICIUS*, *MONA*.
 109. *URIA Troile* tota supra nigra, subtus remigibusque secundariis apice albis.

U. Troile.

U. Troile, corpore nigro, pectore abdomineque nigro, remigibus secundariis apice albis. Lath. Ind. 2. p. 796.

Columbus Troile, pedibus palmatis tridactylis, corpore nigro, pectore abdomineque nigro, remigibus secundariis apice albis. L. S. N. XII. T. I. p. 220. Fn. Su. 149. Mohr Hist. Nat. Isl. p. 37.

Guillem, *Guillemot* or *Seahen*, *Shout*, *Kiddaw*. Will. Orn. p. 324.

Uria et *Uria minor*. Brill. Orn. 2. p. 377 et 378.

Foolish Guillemot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 579. Arct. Zool. 2. p. 576.

Lesser Guillemot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 520. t. 83.

Guillemot, Edw. Av. 7. t. 359. f. 1.

Langwiren og *Martens Lumbé*. Gunner: Act. Nidr. 3. p. 133.

Alca vel *Columbus Languia*. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 355. t. 21.

Alca vel *Columbus Stuttgartia*. ibid. t. 22.

Uria Lomvia, *Troille*, *Swarthag*, *Ringua* et *Alga*. Brunn. Orn. bor. p. 27. 28.

Habitat in mari Balthico et occidentali.

Etiam haec multum variat, an aetate solum vel et sexu? Avis juxta Lund occisa magnitudine fuit Anatis minoris, supra tota nigra, Capite, Colla, Dorso, Alis praeter maculam ex apicibus remigum secundariorum albam, Cauda obscure nigro-cinerascente. Capitis vero et Colli latera, Pectus, Abdomen, Crissam et macula memorata alba. A cantho posteriore oculi ad nucham oblique ducta fascia nigricans. Haec omnia conveniunt cum icone Pennantiana et Descript. Gunneri; et alia ad Engelholm occisa fasciam non habuit, et sub gula inque jugulo maculae aliquot observabantur nigricantes. Alae etiam binis albis lineis maculisque nonnullis in tectri-

tectricibus pictae vident. Ex descriptionibus Auctorum et iconibus patet, alias etiam jugulo nigricante instructas esse. Nigredo etiam varia, in aliis perfecta, in aliis obscure cinerea ad nigrocinem vergens.

PODICEPS.

Rostrum odentulum, rectum subulatum, acutum.
Nares lineares.

Lingua apice leviter emarginata.

Pedes pone aequilibrium, tibiis compressissimis, pollice ferratis, digitis lobatis.

110. *Podiceps cristatus*, fulcus, subtus albus, capite rufo tumido, remigibus secundariis albis. Lath. Ind. 2. p. 780.

Columbus cristatus pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 222. Mohr Hist. N. Isl. p. 39. t. 2.

Columbus pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro, remigibus nigris, secundariis albis. Fn. Su. 151.

Columbus cornutus, Brill. Orn. 2. p. 370.

Greater crested and horned Doucher. Will. Orn. p. 340.

Great crested Grebe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 497. Arct. Zool. 2. p. 498.

Le Grebe cornu. Buff. Av. 8. p. 235. mas.

Le Grebe huppé. ibid. p. 235. foemina.

Le Grebe. ibid. p. 227. pullus.

Sueci Silkand.

Habitat in utroque mari.

Rostrum supra nigrescens, subtus fordide rufum, *Iris* ruberrima. *Crista* gemina fusca nuchae. *Collare* ex pennis deflexis tumidioribus, versus nucham brevius, ad latera longius, sub gula bifidum nigrum, versus nucham cinnamomeum, vel etiam saturate ferrugineum marginibus nigris. *Capitis* pileus rufo-fuscus. *Lora* nigra,

nigra, supra haec linea alba. *Cervix* et *Dorsum* fulcos fuliginosa. *Remiges* 27 primores nigrescentes, secundarii albi, tectricibus albis. *Alarum* margo anterior albus. *Collum* subtus pallide ferrugineum. *Gula*, *Genae*, *Pectus*, *Abdomen* alba. *Rectrices* nullae. *Ungues* planae.

111. *PODICEPS auritus*, fusco-nigricans, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis. Lath. Ind. 2. p. 781.

Colymbus auritus, pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis. L. S. N. XII. T. I. p. 222. Fu. Su. 152.

Colymbus cristatus. *Ses Ond*. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 550. t. 38.

Colymbus cornutus minor. Briss. Orn. 2. p. 371.

Colymbus auritus. Briss. Orn. 2. p. 371.

Didapper, *Dipper*, *Dobchick*, *Small Doucker*, *Loon*, *Ar-foot*. Will. Orn. p. 540.

Eared Grebe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 500. t. 79. Arct. Zool. 2. p. 499.

Eared Dobchick. Edw. Av. 2. t. 96. f. 2.

Petit Grebe huppé. Buff. Av. 3. p. 235.

Ostrobotnienfibus Fjorna. *Westrobotnienfibus* Skräulom.

Habitat in mari. Ova 4. l. 5. Haec in aqua ex culmis tradicibus nidum fixum, non libere natantem conficit, et incubat ovis, ut congeneres. Moura.

Præcedente minor. *Rostrum* nigrum, ad basin maxillae inferioris rubrum. *Irides* rubrae. *Caput*, *Gula* nigra. *Cristae* aurium ferruginosae, apice avellanaceo. *Cervix*, *Dorsum* fusco-fuliginosa. *Iugulum* et *Pectoris* initium avellanacea. Sub alis ferruginea. *Pectus*, *Abdomen* albo-sericea. *Cristum* nigrescens. *Remiges* 1-12 nigri, 12, 13 apicibus albis, 14—24 albi rachi plerumque nigra, versus apicem alba. *Rectrices* nullae.

112. *PODICEPS obscurus*, fusco-nigricans, subtus albus, macula utrinque inter rostrum et oculum, marginibus alarum remigibusque intermediis albis. Lath. Ind. 2. p. 782.

Colymbus minor. Briss. Orn. 2. p. 373.

Dusky Grebe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 501. t. 78. f. 2. Arct. Zool. 2. p. 498.

Black and white Dobchick. Edw. Av. 2. t. 96. f. 1.

Le petit Grebe. Buff. Av. 3. p. 232.

Habitat in mari occidentali rarius.

Caput et tota *Avis* supra fusco-nigricans. *Crista* nulla. *Lora* et *Irides* ruberrima. *Margo* alarum et *remiges* secundarii albi. *Iugulum* album. *Pectus* et *Abdomen* albo-sericea umbra hinc inde obscura. *Pedes* colore variant purpureo-incarnati LATHAM istus solum, verum extus viridescentes EDWARD, nigricantes NOBIS.

113. *PODICEPS rubricollis* subcristatus fuscus, gula genis regioneque aurium cinerascens, collo subtus pectoreque ferrugineo-rubris, abdomine remigibusque secundariis albis. Lath. Ind. 2. p. 783. B.

Colymbus Parotis capite laevi nigro, gulae, aurium ac subocularium regionibus albidis nigro-lineatis Mus. Cariss. 1. t. 9.

Colymbus auritus, Varietas 139. Brunn. Orn. bor. p. 42.

Rednecked Grebe. Penn. Arct. Zool. 2. p. 499.

Habitat in mari Balthico.

Iris citrina. *Caput* supra nigrum, ad latera et subtus album nigro-undulatum. *Cervix* nigrescens, reliquum *Colli* ferrugineum. *Pectus*, *Abdomen*, *Remigum* secundariorum apices albi. *Dorsum* nigrum. *Latera* *Cristum*, *Femora* extus fuliginosa. *Unguis* intermedius albus.

Varietatem *Colymbi* sui *subscripti* juniorem suspicatur BRUCHSTEIN *Vög. Deutschl.* 2. p. 791.

114. *PODICEPS minor*, fulvo-fuscus, corpore subtus, macula remigum uropygioque infimo albo-argenteis, collo subtus griseo-fulvo. Lath. Ind. 2. p. 784.

Colymbus auritus. L. S. N. XII. T. I. p. 222. *γ. an?*

Colymbus fluxinotilis. Briss. Orn. 2. p. 374.

Little Grebe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 501.

Le Grebe de la riviere ou Castagneux. Buff. Av. 3. p. 244. t. 20.

Habitat in fluviis. Nidus natans. Mus. Grill.

Minor reliquis. Caput fuscum pileo obscuriore in fulvum inclinante ut et *Dorsum*, *Collum*, *Pectus*, *Abdomen* cinereum. *Uropygium* argenteo-nitens. *Pedes* virescentes.

L A R U S.

Rostrum nudum, edentulum, rectum, cultratum apice subadunco; *mandibula inferior* infra apicem gibba, angulata.

Nares lineares antice latiores, in medio rostri sitae.

115. *LARUS tridactylus*, dorso canescente, digito postico mutico. ÖDMAN N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 113. Lath. Ind. 2. p. 817.

L. tridactylus albus, dorso cano, extremitatibus remigum nigris, pedibus tridactylis. Fabr. Fn. Groenl. 65.

L. Rissa albus, dorso cano, rectricibus albis totis. Brunn. Orn. bor. p. 48. L. S. N. XII. T. I. p. 224.

L. Rytfa, Ol. et Pov. it. Ial. 2. p. 709. t. 23.

Kryckic. Gunner: Act. Nidr. 3. p. 119.

Kiti-

Kitiwake. Penn. Britt. Zool. 2. p. 539. t. 89. Arct. Zool. 2. p. 529.

β. a. defcent.

L. cinerarius albus, dorso cano, macula pone oculos fusca. L. S. N. XII. T. I. p. 224.

Gavia cinerea minor. Briss. Orn. 2. p. 409.

Bellonius his Ashcoloured Gull. Tarrock. Will. Orn. p. 346.

γ. junior.

L. tridactylus albicans dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, pedibus tridactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 225. Fa. Su. 157.

Tarrock. Penn. Britt. Zool. 2. p. 540. Arct. Zool. 2. p. 533.

Larus junior Rytfa-Unge. Ol. et Pov. it. Ial. 2. p. 709. t. 24.

Habitat in utroque mari. Victus praeter Pisces etiam Mures, Onisci, Lumbrici etc.

Plur. Rev. ÖDMAN, qui Larorum historiam egregie illustravit, secutus sum. Erronee cit. *Cel. LATHAM* tab. 25. *Ol. et Pov.* quae Piscem tradit, et tab. 24. est adulta avis. In descriptione ad *Kitiwake Cel. PENNANT* omnino adultam avem intelligit, licet figuram *vari β.* dederit, maculam enim ad aures interdum adesse ait.

Magnitudo circiter Columbae. Primo anno obscurus, saepe maculatus; macula nigra ad utrumque aurem et alia lunata Cervicis, quae si *Olavio* fides quandoquidem in collare nigrum coeunt. *Rostrum* fusco-nigrum. *Tectrices* remigum nigrae et remigum apices. *Altero anno* collare evanescit, maculae aurium solae manent. Nigredo tectricum in album colorem mutatur, uti etiam rectricum. Tandem *adultis* maculae aurium pereunt et *alba* fit tota avis praeter *Dorsum* canum, *Irides* et *Remiges* nigros,

nigros, *Rostrum et Oculorum areas flavas. Loco digiti pollicis gibbus verruciformis muticus.*

116. *LARUS glaucus*, albus, dorso alisque canis, remigibus apice albis, rostro flavo angulo croceo. ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Su. 1783. p. 97. Lath. Ind. 2. p. 814.

L. glaucus, albus, dorso et alis canis, remigum extremitatibus albis. Fabr. Fn. Groenl. 64. Brünn. Orn. bor. p. 44.

L. argentatus albus, dorso alisque canis, remigibus primoribus versus apicem albis. Brünn. l. cit.

L. hyperboreus dorso dilute cinereo, extremitatibus remigum albis. Leem Lappl. p. 283.

Weisgraue Sturmnöwe. Walbaum: Berl. Schrift. 3. 2. p. 111.

Glaucous Gull. Penn. Arct. Zool. 2. p. 532.

Bürgermeister. Martens Spitzb. p. 60. t. L. lit. D. Suecis Grättrut.

Habitat in utroque mari. Ova 3 coerulescentia maculis 5 vel 6 nigris.

Magnitudo Anseris. Rostrum flavum 4 poll., apice valde adunco, inferior mandibula brevior, valde gibba angulo croceo. Nares sed Dorsum et Alae supra cana, Remiges omnes basi canis, primores tandem fusci nigrescunt apice albo; secundarii canis apicibus albis. Pedes pallide fulvi.

Pulli primo anno fordide fulvo-maculati, maculis sensim evanescentibus, carent quoque angulo rostri croceo.

117. *LARUS marinus* dorso nigro, pedibus rubris. ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Su. 1783. p. 101.

L. ma-

L. marinus albus, dorso nigro. L. S. N. XII. T. I. p. 225. Fn. Su. 155. Fabr. Fn. Groenl. 66. Brünn. Orn. bor. p. 45. Lath. Ind. 2. p. 813.

Mus. it. Gottl. p. 214.

L. maximus. it. Westrog. p. 156.

L. niger. Briff. Orn. 2. p. 405.

Great black and white Gull. Will. Orn. p. 344.

Blackbacked Gull. Penn. Britt. Zool. 2. p. 528. Arct. Zool. 2. p. 527. Zool. Scot. p. 40. t. 5.

Suecis Hafs-trut, Grä-trut. Scanis Hafs-måka, Måse.

Habitat in utroque mari. Ova 3 cinereo-viridescentia maculis et lituris nigris.

Magnitudo Anseris. Irides luteae. Palpebrarum margo aurantius: Rostrum flavescens macula mandibulae inferioris rubra nigraque (in pullo deest) Albus totus praeter Dorsum et Alas nigras apicibus remigum nigris. Pedes rubri.

Larus varius Brünn. l. c. p. 45. Briff. l. c. p. 406. est hujus pullus secundum FABRICIUM, verum *L. fusca* secundum ÖDMAN.

118. *LARUS fuscus*, dorso-fusco, rostri angulo fulvo, pedibus flavis. ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Su. 1783. p. 105.

L. fuscus albus, dorso fusco. L. S. N. XII. T. I. p. 225. Fn. Su. 154. Brünn. Orn. bor. p. 43. pedibus flavis. Lath. Ind. 2. p. 815.

L. griseus. Briff. Orn. 2. p. 405.

Herring Gull. Will. Orn. p. 345. Penn. Britt. Zool. 2. p. 535. t. 30. Arct. Zool. 2. p. 527.

Suecis Trutt, Ljuse, Sillmåka.

♀ pullus.

Gavia grisea. Briff. Orn. 2. p. 407.

Great

Great Grey Gull, or the Cornish Wagel. Will. Orn. p. 349.

Wagel. Penn. Britt. Zool. 2. p. 536. t. 88. Arct. Zool. 2. p. 528.

Habitat in mari et lacubus.

Præcedente minor. *Albus præter Dorsum et Alas supra fusco-cinerea. Remiges nigro-fuliginosi, primores eo magis versus apicem albi, quo principio propiores, nam prima penna alae nec albo apice in hac specie notatur; secundarii 10 — 30 inclusive nigri apicibus albis. Gibbus mandibulae inferioris croceo colore tingitur. Pedes flavi.*

♂. Iunior Avis primi anni scolopacino colore l. cinereo exalbido pallido maculatus. *Pedes cinerei. Rostrum nigrum absque cantho oris coccineo, nec palpebrarum annulo coccineo gaudet. Collum, Pectus cinerea. Remiges cinerei apicibus nigris, sed extimus nulla macula alba infra apicem scattet. Rectrices albae maculis fuscis, versus apicem nigrae, fummo margine albae.*

119. *Larus canus dorso cano pedibus flavis.* ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 109.

L. canus albus, dorso cano. L. S. N. XII. T. I. p. 224. Fn. Su. 153.

L. canus albus, dorso cano, remigibus primoribus extremitate nigris, quarta et quinta macula apicis nigra, extrema extus nigra. Lath. Ind. 2. p. 815.

Gavia cinerea minor. Briss. Orn. 2. p. 409.

Common Sea Mall. Will. Orn. p. 345.

Common Gull. Penn. Britt. Zool. 2. p. 538. t. 89. Arct. 2. p. 530.

Suecis Måse, Fiskmåse, Homåka. Scanis Fiskmåka. Gottlandis Mawe. Lappis Straule.

♂.

♂. *Gavia hyberna.* Buff. Orn. 2. p. 411.

Larus maculatus. Brünn. Orn. bor. p. 44. n. 146. 147.

Winter Gull. Britt. Zool. 2. p. 537. t. 86.

Magnitudo Columbae majoris. Albus præter Dorsum et Alas canas. Remiges primores pone apicem album macula nigra. Rostrum et Pedes flava.

♂. *Rostrum nigrum vel pallidum apice nigro. Caput maculis oblongis fuscis. Sternum maculis obsolete sparsis. Dorsum canum hinc inde maculatum. Remiges primores nigri, secundarii fusci apice pallidiores. Rectrices albae macula majore nigra infra apicem. Pedes lividi. Pullus.*

120. *Larus ridibundus dorso cano, capite fusco-nigricante, palpebris rostro pedibusque sanguineis.*

L. ridibundus, albidus capite nigricante, rostro pedibusque rubris. L. S. N. XII. T. I. p. 225. Lath. Ind. 2. p. 811.

L. ridibundus canescens, rostro pedibusque rubris. ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 120.

Gavia ridibunda phoenicopus. Briss. Orn. 2. p. 413.

Pewit or Black Cap, Crow, Birecrow. Will. Orn. p. 347.

Blackhead Gull. Penn. Britt. Zool. 2. p. 541. Arct. Zool. 2. p. 529. Zool. Scot. p. 41. t. 5.

Scanis Horsmåka ob sonum hinnitum Equi mentiens.

Habitat ad littora Scaniae rarius.

Major præcedente. Irides flavo-fuscae. Palpebrae sanguineae papillulis obsitae et circulo albo inclusae. Rostrum et Pedes sanguinea. Caput fusco-nigricans, in nucha et sub gula saturatius. Collum, Pectus, Abdomen, Crissum, Cauda, Uropygium alba. Dorsum, Alae canae. Remiges primores 6. basi nigri, primus etiam in latere exteriori, reliqui canis.

121. *Larus atricilla*, dorso cano, rostro rubro, capite pedibusque nigris, area oculorum alba.

L. atricilla albus, capite nigricante, rostro rubro, pedibus nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 225. Lath. Ind. 2. p. 815.

L. atricilla, canescens, rostro rubro, pedibus nigris. ÖDMAN: N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 120.

Gavia ridibunda. Briff. Orn. 2. p. 412.

Laughing Gull. Penn. Arct. Zool. 2. p. 528.

Mauette riesse. Buff. Av. 8. p. 433.

Habitat in mari Balthico.

Magnitudo precedentis. Rostrium rubrum. Caput et Cervicis pars nigra. Dorsum et Tectrices alarum cana. Remigum primorum apices nigri. Pedes nigri, ceterum tota alba.

Dubitium adhuc est, numne antecedentis sola varietas.

C A T A R A C T A.

Rostrium edentulum, rectum, apice aduncum, cera ad nares vestitum.

Nares in medio rostri margini propinquae, lineares, cerae quoad partem immerisae.

Lingua canaliculata, bifida.

122. *CATARACTA parasitica*, supra nigra, collo, pectore et abdomine albis, reatricibus duabus intermediis longissimis. Brunn. Orn. bor. p. 37.

C. parasitica, reatricibus duabus intermediis longissimis. Fabr. Fn. Groenl. 66.

C. Coprotheres corpore toto fusco, reatricibus duabus intermediis longioribus. Brunn. Orn. bor. p. 38. Inferior avis.

Larus

Larus parasiticus, reatricibus duabus intermediis longissimis. L. S. N. XII. T. I. p. 226. Fn. Su. 156.

Larus parasiticus, supra niger, collo, pectore et abdomine albis, reatricibus duabus intermediis longissimis. Lath. Ind. 2. p. 819.

Sterna reatricibus maximis nigris. Act. R. Ac. Suec. 1755. p. 291.

Stercorarius longicaudus. Briff. Orn. 2. p. 402.

Arctic Gull. Penn. Britt. Zool. 2. p. 533. t. 87. Arct. Zool. 2. p. 530.

Arctic Bird. Edw. Av. 3. t. 148. *adolefcent*, t. 149. *pullus*.

Labbe à longue queue. Buff. Av. 8. p. 445.

Tyv-joen. Gunner: Act. Nidros. 3. p. 103.

Die Polmwäse. Lepech. it. 5. p. 224. t. 11.

Suecis Swartlasse, Elof, Labbe, Struntjager.

Habitat in utroque mari, supra grad. 57. Mores et piscatura in Itin. Westrog. p. 182.

Magnitudo Cornicis. Nigra Pileus, Dorsum, Pedes. Nigrofusca Alae, Cauda. Alba tota subtus et circa collum. Reatrices 6. 6. ceteris 4 poll. longiores.

Juniores omnino fusci, subtus licet pallidiores. Huc spectat figura inferior. Penn. l. c. et t. 149 *Edward*.

123. *CATARACTA Shua*, supra fusca subtus cinereo-feruginea, cauda subaequali.

C. Shua corpore supra e fusco luteoque longitudinaliter maculato, macula alari alba, abdomine pallide lutescente immaculato, cauda subaequali. Brunn. Orn. bor. p. 35.

Larus Catarractes griseus, remigibus reatricibusque basi albis, cauda subaequali. L. S. N. XII. T. I. p. 226. Lath. Ind. 2. p. 818.

L

L.

curvi, compressi, acuti, nigri. *Digitus posticus* parvus ungue simili.

125. *STERNA nigra* cauda subforficata, corpore cano, capite rostroque nigro, pedibus rubris. L. S. N. XII. T. I. p. 227. Lath. Ind. 2. p. 810.

St. nigra cauda subforficata, corpore fulco, capite rostroque nigro, pedibus rubris. Fn. Su. 159.

Sterna minor. Briss. Orn. 2. p. 416.

The brown Tern. Will. Orn. p. 352.

Habitat Ultunae prope Upsaliam in minimarum insularum caecis, in Westrogothia, Scania.

Præcedenti nonnihil minor. *Caput* atrum. *Rostrum* nigrum, modico convexum, parum compressum. *Color* totius avis supra canus una cum *Gula*, *Pectore*, *Collum*, *Abdomen* fuliginosa. *Tectrices* alarum inferiores et inferiores caudae niveae. *Alae* cauda longiores. *Remiges primores* 1 — 10 acuminati, *secundarii* 11 — 25 obtusi, omnes unicolores. *Cauda* parum forcipata, rectricibus 12 alis concoloribus. *Pedes* rubri semipalmati. *Ungues* nigri rectiusculi, medius introsum marginatus.

Sterna atricapilla Briss. forte eadem avis.

126. *STERNA caspia* cauda forficata alba brevior, rostro coccineo, capillitio atro, pedibus nigris. OGDEN N. Act. R. Ac. Suec. 1782. p. 230.

St. caspia corpore supra plumbeo-cinereo, subtus colloque albo, rostro coccineo, capillitio pedibusque nigris. Lath. Ind. 2. p. 803.

St. caspia, cauda brevior forficata, corpore subtus colloque albis, dorso alisque plumbeo-cinereis, rostro coccineo, capillitio ac pedibus nigris, remigibus apice nigricantibus. Mus. Carlsf. 5. t. 62.

St.

St. leucophaea subtus nivea, capite nigro, remigibus primariis tectricibusque alarum fulcis niveo roro quasi candicantibus. Pallas N. Comm. Petrop. XIV. p. 582. t. 22. f. 2.

St. Tschegraeva superne ex albo cana, inferne nivea, capillitio nigro albedine irrorato, rostro coccineo, pedibus nigris. Lepechin: N. Comm. Petrop. XIV. p. 500. t. 15. f. 2.

Larus Atricilla. N. Comm. Petrop. XV. p. 478. t. 22. f. 2.

Caspian Tern. Penn. Arct. Zool. 2. p. 526.

Rostlagis Skrånmåse.

Habitat ad littora Rossagiae, rarior avis. *Ova* 3 alba maculis parvis nigris.

Major *Sterna* Hirundine. *Rostrum* intense rubrum. *Caput* supra atrum, in junioribus albo-maculatum. *Lora* alba. *Pectus* et *Abdomen* nivea. *Dorsum* subcanescens. *Alae* cinerascens remigibus extimis apice nigris. *Cauda* alba, brevis. *Pedes* nigri omnino palmati.

Rostrum in junioribus album. SPARRMAN.

127. *STERNA nubilosa* subtus alba, supra nigro-albo cinerascensque varie fusca, cauda forficata, rostro pedibusque nigris. Mus. Carlsf. 5. t. 65.

In Finlandiae maritimis unicum Specimen a D. Doct. GRÖNDAHL occisum inter plurimas *Sternas* primae speciei. Junior certe avis cujuscunque demum sit speciei. Ad *Sternam* *Boysii* refert Cel. LATHAM. Juniores *St. Hirundinem* facile crederet, nisi defectus capillitii nigri, quod teste OLAFSEN mature satis apparet, aliter suaderet.

Longitudo 16 poll. *Rostrum* strictum, subulatum. *Front*, *Genua*, *Gula*, *Jugulum*, *Pectus*, *Abdomen* alba. *Linea* inter oculos et rostrum, *Vertex*, *Cristam* cinereo-nebulosa. *Cervix* nigro-maculata. *Interscapulum* et

Dor-

Dorsum fuliginosa cinereo-undulata. *Remiges primæres* supra nigri; subtus fulci, *secundarii* fulci. *Cauda* supra nigricans, subtus fulca, rectricibus 10, intermediis quatuor subæqualibus.

4. GRALLAE.

PLATALEA.

Rostrum planiusculum, apice dilatato, orbiculato, plano.

Pedes tetradactyli, semipalmati.

128. PLATALEA *Leucorodia* corpore albo, gula nudiuscula fulva, occipite cristato.

Pl. *Leucorodia* corpore albo, gula nigra, occipite subcristato. L. S. N. XII. T. I. p. 231. Fn. Su. 160. Lath. Ind. 2. p. 667.

Platea. Briss. Orn. 2. p. 300.

Spoonbill. Will. Orn. p. 288. Penn. Britt. Zool. 2. p. 634. Append. t. 9. Arct. Zool. 2. p. 441.

La spatule. Buff. Av. 7. p. 448. t. 24.

Suecis Pelikan.

Habitat in Westrobothnia et Lapponia aestate rarius. *Victus* Amphibia, Pisces, Insecta. Nidificat in arboribus.

Rostrum atrum (forte pro ætate variat. Cf. *Worm. Mus.* p. 310.) macula fulva supra apicem. Alia ejusmodi macula in utraque gena. *Crista* pone dependens. *Cutis* subnuda fulva ad latera mandibulae inferioris et sub gula, quae in exuviis fæctis nigra evadit. *Irides* flammæae. *Linea* depressa a naribus basin rostri circumdat. *Lingua* brevis cordata. *Pedes* nigri, præterea tota avis alba.

ARDEA.

ARDEA.

Rostrum rectum, longum, subcompressum, acutum, sulco e naribus versus apicem exaratum.

Nares lineares.

Pedes tetradactyli.

129. ARDEA *Grus* occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, tectricibus intimis laceris. L. S. N. XII. T. I. p. 234. Fn. Su. 161. Lath. Ind. 2. p. 674.

Grus. Briss. Orn. 2. p. 307.

Crane. Will. Orn. p. 274. Penn. Britt. Zool. 2. p. 629. tab. App. 6. Arct. Zool. 2. p. 455.

La Grue. Buff. Av. 7. p. 286. t. 14.

Suecis Trana.

Habitat passim in campis humidis.

Rostrum viride. *Capitis* pileus niger occipite nudiusculo papilloso, pone hoc macula triangula cinerea. *Tempora* alba. *Gula* et dimidium *Jugulum* fulca. *Corpus* canum. *Remiges* nigri tectricibus ultimis longioribus, laxioribus, dependentibus, laceris. *Cauda* nigricans. *Femora* seminuda. *Pedes* nigri.

130. ARDEA *Ciconia* alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis. L. S. N. XII. T. I. p. 235. Lath. Ind. 2. p. 676.

A. Ciconia alba remigibus nigris, cute sanguinea. Fn. Su. 162.

Ciconia alba. Briss. Orn. 2. p. 305.

The Common or white Stork. Will. Orn. p. 286.

White Stork. Penn. Arct. Zool. 2. p. 455.

Cigogne blanche. Buff. Av. 7. p. 253. t. 12.

Suecis Storck.

Habitat

Habitat in Gothia, rarius tamen supra Scania. Nidificat super tectis, caminis, turribus, altis decollatis arboribus. Edit Serpentes, Ranas, non vero Bufones.

Alba sunt Caput, Collum, Venter, Cauda, nigri Remiges, rubra Rostrum, Pedes. Palpebrae nigrae basi rubra. Cutis sanguinea, minus in jugulo rubra. Lingua brevissima.

131. ARDEA nigra, nigra, orbitis nudis, pectore abdomineque albo. L. S. N. XII. T. I. p. 235. Lath. Ind. 2. p. 677.

A. nigra pectore abdomineque albis. Fn. Su. 163.

Ciconia fusca. Briss. Orn. 2. p. 304.

Black Stork. Will. Orn. p. 286. Penn. Arct. Zool. 2. p. 456.

Cigogne noire. Buff. Av. 7. p. 271.

Suecis Odenfwala.

Habitat in Suecia rarius, sed transmigrat versus arcticum. Victus Pisces, Scarabaei, an Ranae?

Nigra sunt Caput, Collum usque ad Sternum, Dorsum, Alae, Cauda, ita tamen ut seneco colore niteant. Pectus et Venter alba. Femora seminuda una cum Rostrum Pedibusque in adultis rubra, in junioribus sordide viridia.

132. ARDEA Stellaris capite laeviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis. L. S. N. XII. T. I. p. 239. Fn. Su. 164. Act. Physiogr. Lund. 1. p. 305. Lath. Ind. 2. p. 689.

Botaurus. Briss. Orn. 2. p. 327.

Bittour, Bittern or Miredrum. Will. Orn. p. 282.

Bittern. Penn. Britt. Zool. 2. p. 424. Arct. Zool. 2. p. 451. Edw. Av. 3. t. 136.

Le

Le Bator. Buff. Av. 7. p. 411. t. 21.

Suecis Rördrom.

Habitat in paludosis.

Rostrum obsolete nigrum, validum, acutum. Nares oblongae valvula seu squama a latere superiore tectae, dehinc sulcus ad rostri apicem. Lingua angusta, trigona. Femora seminuda viridia. Ungues leviter arcuati, postico longiore. Remiges 22. Rectrices 12 obtusae. Color corporis supra rufo-testaceus maculis transversis, subtus vero dilutior maculis pennarum longitudinalibus. Capitis color luci objectus a rostro ad collum niger apparet. Iratus pennas dimittit more Tringae pugnacis. Mas maculis angustioribus pictus.

133. ARDEA cinerea fronte alba, occipite crista nigra dependente, corpore cinereo, collo subtus linea fasciataque pectorali nigris. Lath. Ind. 2. p. 691.

Junior.

A. cinerea occipite nigro laevi, dorso coerulecente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 236.

A. cinerea occipite crista pendula, dorso coerulecente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris. Fn. Su. 165.

Ardea. Briss. Orn. 2. p. 314.

Aldrowandus his third sort of ashecoloured Heron. Will. Orn. p. 278.

Common Heron Female. Penn. Britt. Zool. 2. p. 421. t. 61.

Heron. Buff. Av. 7. p. 342. t. 19.

Adulta quadriennis.

Ardea major occipite crista nigra dependente, corpore cinereo, collo subtus linea fasciataque pectorali nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 236.

A.

A. cristata. Brill. Orn. 2. p. 313.

The common Heron, or Heronshaw. Will. Orn. p. 277.

Common Heron, Male. Penn. Britt. Zool. 2. p. 421.

Heron hupé. Buff. Av. 7. p. 342.

Suæcis. Häger.

Habitat ad Aquarum ripas. Victitat Piscibus, Ratis, etiam aviculis. Nidificat in arboribus.

Junior Avis. *Rostrum* maxilla superiore nigra, inferiori carne. *Caput*, *Cervix*, *Dorsum*, *Remiges primariæ* coerulescenti-cana, *secundariæ* et *Alula* nigra. *Jugulum* et *Pectus* albida maculis oblongis nigris. *Femora* subtus flavescunt. *Pedes* viridi-nigricantes. *Digiti intermedii* unguis extrorsum serratus, *extimus* adnexus intermedio. Tandem capitis pennae elongantur et sensim nigrescunt, ut *crista* fiat pendula nigra. *Frontis* albescit. *Color* canus in cinereum mutatur, et fascia pectoralis apparet, maculis juguli evanescentibus. Conf. MATUSCHKA in *Berl. Schrift.* T. 5. p. 411.

134. ARDEA alba capite lævi, corpore albo, rostro fulvo, pedibus nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 239.

Fn. Su. 166. Lath. Ind. 2. p. 695.

A. candida. Brill. Orn. 2. p. 322.

The great white Heron. Will. Orn. p. 279.

White Heron. Penn. Britt. Zool. 2. p. 427. t. 62. Arct. Zool. 2. p. 445.

Heron blanc. Buff. Av. 7. p. 365.

Habitat — in Scania ad Aralköf olim visa.

Tota nivea. *Crista* caret. *Rostrum* luteum. *Lora* viridia. *Unguis* medius introrsum serratus.

TAN-

TANTALUS.

Rostrum longum, subulatum, teretiusculum, subarcuatum.

Facies nuda ultra oculos.

Lingua brevis, lata.

Saccus jugularis nudus.

Nares ovatae.

Pedes tetradactyli, basi palmati.

135. TANTALUS *Falcinellus*, facie nigra, pedibus coerulescis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo. L. S. N. XII. T. I. p. 241. Lath. Ind. 2. p. 707.

Numenius viridis. Brill. Orn. 2. p. 293.

Falcinellus. Will. Orn. p. 295.

Bay Ibis. Penn. Arct. Zool. 2. p. 460.

Courly verd. Buff. Av. 3. p. 29.

Habitat in Gottlandia.

Corpus castaneum maculis parvis fuscis albisque in capite et collo antico. *Facies* nuda nigra, *Rostrum* nigrum, *Pedes* cyanei. *Alae*, *Rectrices*, *Uropygium* violacea.

SCOLOPAX.

Rostrum teretiusculum, obtusum, capite longius.

Nares lineares.

Facies tecta.

Pedes tetradactyli, *digito postico* pluribus articulis insistente.

* *Rostrum* arcuato. NUMENII Lath.

136. SCOLOPAX *Arquata* rostro arcuato, pedibus coerulescentibus, alis nigris maculis niveis. L. S. N. XII. T. I. p. 242. Fn. Su. 163.

Num-

Numenius Arqunta cinerascens nigroque varius, pedibus coeruleis, alis nigris maculis niveis. Lath. Ind. 2. p. 710. It. Scan. p. 335.

Numenius. Briss. Orn. 2. p. 290.

Carlew. Will. Orn. p. 294. Penn. Britt. Zool. 2. p. 429. t. 63. Arct. Zool. 2. p. 462.

Le Courlis. Buff. Av. 3. p. 19.

Suecis Spof. *Scanis* Tullare, Longnäbba. *Venatoriibus* Brockfogel. *Sudermarvis* Windspole.

Habitat in paludibus et littoribus marinis.

Rostrum 5 pollicare nigrum. *Caput*, *Collum* et *Tectrices* alarum testacea, macula singulae pennae media subrhombica fusco-nigra. *Pectus* flavescens maculis oblongis fuscis. *Abdomen* simile, sed albidum magis. *Cristum* album. *Dorsum* versus uropygium album maculis oblongis fuscis. *Remiges* nigri latere interiore albo-maculato. *Rectrices* 12 testaceae fasciis 12 nigricantibus. *Pedes* plumbei.

137. *SCOLOPAX Phaeopus* rostro arcuato, pedibus coeruleis, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. L. S. N. XII. T. I. p. 243. Fa. Su. 169.

Numenius Phaeopus rostro nigro, pedibus coeruleis, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus, uropygio albo. Lath. Ind. 2. p. 711.

Numenius minor. Briss. Orn. 2. p. 291.

The Whimbrel. Will. Orn. p. 294. Penn. Britt. Zool. 2. p. 430. t. 64. Arct. Zool. 2. p. 462. Edw. Av. 6. t. 307.

Le Courlis ou petit Courlis. Buff. Av. 3. p. 27.

Suecis Små Spof, Mellan Spof, Quidbonde.

Habitat in paludibus.

Præcedenti minor. *Rostrum* 5 poll. nigrum. *Caput*, *Collum* et *Pectus* testacea maculis longitudinalibus acuminatis, inferioribus velut sinu arcuatis. *Venter* albus, pone femora maculae distinctae. *Dorsum* testaceum maculis transversis nigris, postico album. *Cauda* cinerea vel potius testacea fasciis fuscis. *Remiges* nigricantes rachi alba maculisque semiorbiculatis albis. *Pedes* plumbei.

Fœmina a b. *LECHE* descripta. *Caput* dilutius cinereum rachidibus obscurioribus, pileo fusco-cinereo. *Remiges* 26, quorum 1 rachi alba, 1 — 5 apice et exteriori latere nigri, 6 et sequentes non tantum a latere exteriori sed et interiore maculis 5 ad 12 albis. *Rectrices* 14 fasciis 8 pallidioribus totidemque obscurioribus alternis. *Uropygium* album lineis nigricantibus.

* * *Rostrum recto*. *SCOLOPAXES* Lath.

138. *SCOLOPAX fusca* rostro apice inflexo, corpore nigro-albo-nebuloso, uropygio alisque subtus albis. L. S. N. XII. T. I. p. 243. N. Act. R. Ac. Svec. 1783. p. 48. Lath. Ind. 2. p. 724.

Limesa fusca. Briss. Orn. 2. p. 280.

Dusky Snipe. Penn. Arct. Zool. 2. p. 471.

La Barge brune. Buff. Av. 7. p. 568.

Habitat in Uplandiae humidis.

Rostrum longissimum, gracile, aequale, apice laeve. *Mandibula superior* apicem versus parum inflexa, inferior versus basin incarnata. *Nares* lineares. *Supercilia* alba. *Caput* et *Cervix* fusco-grisea undulis parvis albis. *Dorsum* ex fusco et albo maculatum (pennis dorsi longioribus margine et apice maculis albis). *Alae* supra ex nigro, fusco et albo maculatae. *Uropygium* album. *Pectus* obscure cinereum albo et fusco variatum. *Remiges* fusci, primi rachi nivea, secundarii subtus albo-maculati.

lati. *Rectrices* breves, obtusae, fuscae fasciis albis. *Unguis* *posticus* brevissimus. *Tringae* littoreae valde affinis, ordine vero inter *Scolopaces* ad *Glottidem* accedit. **TENGHAI.**

139. *SCOLOPAX rusticola* rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis nigra. L. S. N. XII. T. I. p. 243.

Sc. rusticola castaneo-nigro-griseoque varia, subtus rufescens fasciis nigris, fascia capitis nigra, femoribus tectis. Lath. Ind. 2. p. 713.

Sc. rusticola rostro recto laevi, pedibus rufis, femoribus tectis, unguibus pollicum obsoletis. Fn. Su. 170.

Scolopax. Briss. Orn. 2. p. 284.

Woodcock. Will. Orn. p. 299. Penn. Britt. Zool. 2. p. 433. t. 65.

European Woodcock. Penn. Arct. Zool. 2. p. 470.

La Becasse. Buff. Av. 7. p. 462. t. 25.

Suecis Morkulla.

Habitat in appropriatis locis, volitans per noctes quasi viam strictissimam in ipso aere ita redituque continuo. Per hiemes in Anglia, Gallia, Belgio etc. habitat, inde matrimonio juncta vere discedit, victitat lumbricis, insectis, ideoque aestate deserit terras australes, et hieme boreales.

Corpus supra griseum strigis transversis nigris cum maculis saepe nigris temere sparsis; subtus albitat totum cum strigis nigris. Cauda brevissima, *rectricibus* nigris apicibus supra canis subtus niveis; margo lateralis exterior *rectricum* testaceo-variegatus. *Rostrum* rectum digitis duplo longius, ad latera rugosum, utrinque sulco exaratum; apex glaber; maxilla superior productior apice

apice subtus gibba. *Linea* nigra a rostro ad oculos. *Oculus* a rostro solito longius remoti, sub vertice. *Collum* subtus ferrugineum lineis 4 transversis nigris. *Venter* maculatus ut reliquum corpus. *Pedes* cinerei, ad genua tecti, breves. *Unguis* pollicis obsoletus.

140. *SCOLOPAX paludosa* rufa nigroque varia subtus albida nigro-undulata, loris superciliaribus nigris. Lath. Ind. 2. p. 714.

Becasse des Savanes. Buff. Av. 7. p. 481.

Habitat in Superiori Suecia. D. ASS. LISDROTH.

Rosticola minor. *Rostrum* *Pedesque* fulci. *Gula* albida. LATHAM.

141. *SCOLOPAX Gallinago* rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis quaternis fulcis. L. S. N. XII. T. I. p. 244. Fn. Su. 173.

Sc. Gallinago rostro tuberculato, corpore nigricante et fulvo vario subtus albo, frontis lineis fuscis quaternis. Lath. Ind. 2. p. 715.

Sc. Gallinago lineis frontis fuscis ternis, *rectricibus* lateralibus albis. Brunn. Orn. bor. p. 48. *foemina*.

Gallinago. Briss. Orn. 2. p. 285.

The Snipe or Snite. Will. Orn. p. 290.

Common Snipe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 448. t. 68. Arct. Zool. 2. p. 463.

La Beccasine. Buff. Av. 7. p. 483.

Suecis Horskök. *Venatoribus* Beccasina.

Habitat in carectis.

Rostrum longissimum pallidum, extimo atrum apice punctis inaequalibus excavatis. *Caput* testaceo-pallidum: lineis quatuor fuscis longitudinalibus, quarum exteriores per oculos ducunt. *Collum* griseum maculis fuscis.

fulcis. *Sternum et Venter alba*. *Alae nigro-cinereae* pennis nigricantibus, margine exteriori longitudinaliter pallide testaceo: disco punctato. *Remigum primus a latere anteriore totus albus*, *secundarii apicibus alben* linea alba transversali, hinc clausis alis linea alba. *Cauda brevis*, *rectricibus* (14 Penn.) *nigris fasciis ferrugineis*, *apice albidis*. *Femora seminuda*. *Digitus posticus unico articulo brevissimus*, et *intermedius longitudine tibiae*.

Foemina non nisi tribus fasciis capitis ornatur (Brünn.). *Remiges primores immaculati*. *Rectrices* (16 Brünn.) *quatuor laterales albae basi infima nigra*.

Obs. *Puncta tum elevata tum excavata in rostro harum avium vix nisi aliquo tempore post mortem observantur*.

142. *SCOLOPAX Gallinula* rostro recto tuberculato, pedibus virescentibus, loris fulcis, uropygio violaceo vario. L. S. N. XII. T. I. p. 244. Lath. Ind. 2. p. 715.

Gallinago minor. Brill. Orn. 2. p. 287.

Gid, Jacksnipe and Judcock. Will. Orn. p. 291.

Scolopax minima. Brünn. Orn. bor. p. 49.

Jacksnipe. Penn. Britt. Zool. 2. p. 451. t. 68. Arct. Zool. 2. p. 464.

Petite Beccafine. Buff. Av. 7. p. 490.

Suecis Rörfnäppa.

Habitat in humidis.

Præcedenti multo minor. *Corpus varium e testaceo, nigro-violaceo viridique nitente*. *Caput lineis luteis* (duabus latioribus) *nigrisque a rostro ad occiput ductis*. *Lora nigricantia*. *Rostrum fuscum*. *Pedes virescentes*. *Pectus maculatum*. *Uropygium violaceum albo-varium*. *Cauda fusca testaceo-marginata*, *rectricibus acutis*.

143. *SCOLOPAX Glottis* rostro recto basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus. L. S. N. XII. T. I. p. 245. Fn. Su. 171.

Sc. Glottis griseo-fusca, maculis nigricantibus varia, *supercilia*, *dorso infimo corporeque subtus albis*, *rectricibus albis fasciis fulcis*. Lath. Ind. 2. p. 720.

Limosa grisea major. Brill. Orn. 2. p. 279.

Greater Plover of Alderwood. Will. Orn. p. 445.

Greenshank. Penn. Britt. Zool. 2. p. 445. Arct. Zool. 2. p. 469.

La Barge variée. Buff. Av. 7. p. 503.

Suecis Glutt.

Habitat in paludibus.

Rostrum nigrum basi inferioris maxillae rubra. *Caput et collum cinerea lineis fulcis longitudinalibus*. *Supercilia alba*. *Dorsum pennis nigris margine griseis apicibus albis tectum*. *Pectus, Abdomen, Hypochondria, Crissum, Alarum tectrices alba immaculata*. *Remiges fulci latere interiore albo-maculati*. *Rectrices albae fusco-fasciatae*.

144. *SCOLOPAX Calidris* rostro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 245. Lath. Ind. 2. p. 722.

Sc. Totanus, rostro recto basi rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. Fn. Su. 167.

Totanus. Brill. Orn. 2. p. 261.

Redshank or Pool Snipe. Will. Orn. p. 299.

Redshank. Penn. Britt. Zool. 2. p. 446. t. 65. Arct. Zool. 2. p. 468.

Chevalier aux pieds rouges. Buff. Av. 7. p. 513. t. 28.

Scanis Rödbena.

Habitat ad paludes.

Rostrum capite longius subulatum laeve, a basi ad medium rubrum, deis nigrum, apice superiore deorsum, inferiore sursum laeviter flexo. *Caput, Collum, Dorsum* nigro-cinerea maculata. *Pectus* album nigris maculis. *Abdomen* album. *Femora* seminuda. *Pedes* longi, rubri, plantis parum palmatis. *Alae* cauda longiores, remigibus primoribus nigricantibus, *secundariis* 11 — 21 albis, *Cauda* brevis tectricibus fere occultata, albida transversim nigro-undulata.

145. *SCOLOPAX limosa* rostro subrecurvato basi rubro, pedibus fuscis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis. L. S. N. XII. T. I. p. 245. Lath. Ind. 2. p. 719.

Sc. *Limosa* rostro recto laevi, pedibus fuscis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis. Fn. Su. 172.

Sc. *Jardreha* rostro recto laevi, pedibus plumbeis, remigibus linea obliqua uropygioque albo, rectricibus macula nigra. Fabr. Fn. Groenl. 72.

Jardreha, Scolopax Jardreha. Ol. et Pov. it. Isl. 2. p. 984. t. 48.

Limosa. Brill. Orn. 2. p. 277.

The second sort of Godwit. Will. Orn. p. 295.

Lesser Godwit. Penn. Britt. Zool. 2. p. 444. Arct. Zool. 2. p. 467.

La Barge commune. Buff. Av. 7. p. 500. t. 27.

Habitat in Carectis.

Magnitudo Vanelli. *Caput, Collum, Pectus* flavescencia transverse fusco-maculata. *Rostrum* longissimum rubrum, versus apicem nigrum; basin ambiunt pennae albo-rufescentes. *Dorsum* fuscum. *Abdomen* albicans maculis cinereo-flavescens. *Latera* cinerea immaculata.

culata. *Remiges* nigricantes, 1 — 3 (capo albo, 5 — 15 a basi ad medium albi. *Rectrices* basi albae, magis exteriores.

146. *SCOLOPAX Lapponica* rostro subrecurvato flavescente, pedibus nigris, subtus tota rufo-ferruginea. L. S. N. XII. T. I. p. 246. Lath. Ind. 2. p. 718.

Sc. *Lapponica* rostro subrecurvato, pedibus nigris, pectore ferrugineo. Fn. Su. 174.

Limosa rufa. Brill. Orn. 2. p. 281.

Red Godwit. Penn. Britt. Zool. 2. p. 442. t. 67. Arct. Zool. 2. p. 466.

Redbreasted Godwit. Edw. Av. 3. t. 138.

La Barge rousse. Buff. Av. 7. p. 504.

Habitat in paludosis, imprimis Lapponiae.

Rostrum subadscendens flavum apice nigro. *Caput, Collum, Dorsum* nigricans maculis ferrugineis, *subtus* ferruginea immaculata, *jugulo pectorisque* obscuriore. *Supercilia* ferruginea a rostro supra oculos per collum descendunt. *Uropygiani* albedo-ferrugineum maculis nigris oblongis. *Rectrices* albae fusco-fasciatae. Variat plurimum colore plus minus subtus rufo, an aetate tantum vel et sexu?

T R I N G A.

Rostrum teretiufculum, longitudine capitis.

Nares lineares.

Pedes tetradactyli: *digito postico* uniaarticulato, a terra elevato.

147. *TRINGA pugnax* rostro pedibusque subrubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carnis (maris) L. S. N. XII. T. I. p. 247. Fn. 175. Lath. Ind. 2. p. 725.

Pugnax. Briss. Orn. 2. p. 273.

The Ruff, Reeve. Will. Orn. p. 302. Penn. Britt. Zool. 2. p. 457. t. 69. Arct. Zool. 2. p. 479.

Le Combattant ou Paou de Mer. Buff. Av. 7. p. 521. t. 29. 30.

Succis Brushano.

Habitat in paludosis praesertim Scaniae.

Coloribus adeo variant Mares, ut ex his nulla nota praeter *Tectrices alarum*, quae cinereo-fuscae, et *rectrices* 1. 1. 2. 2. quae his fere concolores et immacolatae ac 3. 5. 6. 6. quae fulco-nigroque fasciatae. Sub collo pennae elongatae verno et aestivo tempore in adultis et fasciculus cervicis ad utrumque latus divergentium penarum. *Rostri* et *Pedum* color etiam diversus inter flavum et rubrum.

Foemina caret fasciculo Cervicis et pennis juguli elongatis ac papillis faciei. *Colore* pallide fusca, dorso nigro-maculato pennis leviter albo-marginatis. *Cauda* fusca, *rectricibus* mediis nigro-maculatis, tribus exterioribus utrinque immaculatis. *Pectus* et *Abdomen* albida. *Pedes* sordide lutei.

148. *TRINGA Vanellus* pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. L. S. N. XII. T. I. p. 248. Fn. Su. 176. Lath. Ind. 2. p. 726.

Vanellus. Briss. Orn. 2. p. 236.

Lapwing, *Bastard Plover* or *Pewit*. Will. Orn. p. 307.

Lapwing. Penn. Britt. Zool. 2. p. 453. Arct. Zool. 2. p. 480.

Vanneau. Buff. Aves 8. p. 48. t. 4.

Succis Wipa, Kowipa. *Gotlandis* Blicke.

Habitat ubique in pratis depressis, copiose in Scania campestris. Prima omnium Grallarum quae redit, nunquam tota veris nuncia.

Mas.

Mas. *Caput* supra nigrum plumis longis pone reclinato-pendulis in cristam sub incessu erectam. *Rostrium* nigrum. *Gula* versus collum deorsum nigra. *Pectorale* nigrum. *Tempora* alba. Ad oculos *linea* nigra. *Collum* supra cinereum. *Dorsum* e brunneo-coeruleo-viridi-ferrugineo-violaceoque splendens. *Pectus* album. *Alarum tectrices* collo concolores, sed magis coeruleae. *Remiges* 24 nigri, *primores* 4 l. 5 apice albi, *secundarii* versus basin. *Cauda* aequalis *rectricibus* 12 albis a medietate exteriori nigris apicibus pallidis, exceptis 1. 1. totis albis macula nigra prope apicem. *Tectrices* caudae utrinque ferrugineae. *Pedes* rubri.

Foemina differt *gula* alba nec ut in mare nigra, coloribus minus viridis et crista brevior.

149. *TRINGA Gambetta* rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo. L. S. N. XII. T. I. p. 248. Fn. Su. 177. Lath. Ind. 2. p. 728.

Tr. variegata supra fusca luteo-maculata, subtus cinerascens, abdomine albo, *rectricibus* nigricantibus apice lituraque luteis. Brunn. Orn. hor. p. 54. *Totanus ruber*. Briss. Orn. 2. p. 262.

The Gambetta of Aldrowand. Will. Orn. p. 300.

Gambet. Penn. Britt. Zool. 2. p. 465. t. 70. Arct. Zool. 2. p. 477.

Habitat in paludosis.

Caput, *Dorsum*, *Pectus* cinereo-fusca sordide luteo-maculata, hoc vero magis pallidum. *Alarum tectrices* et *Interseapulum* cinereo-luteo-undulata. *Abdomen* album. *Remiges primores* fusci, primus rachi alba, interiores marginibus et striga lutea. *Cauda* fusca luteo-marginata strigaque *rectricum* lutea. *Pedes* flavi.

150.

150. *TRINGA Interpres* pedibus rubris, corpore albo-nigro-ferrugineoque vario, pectore ac domineque albo. L. S. N. XII. T. I. p. 248. Fn. Su. 178. It. Gottl. p. 217. Lath. Ind. 2. p. 739.

Arenaria. Brill. Orn. 2. p. 246.

Hebridal Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 467. Arct. Zool. 2. p. 472. Fn. Scot. p. 34. t. 3.

Turnstone. Will. Orn. p. 311. Edw. Av. 3. t. 141.

Tournepiere. Buff. Av. 8. p. 130. t. 10.

Gottlandis Tolck.

Habitat in Maris Balthici insulis incultis.

Magnitudo Turdi. *Rostrum* nigrum, brevius et fortius quam in congeneribus. *Caput* magna ex parte album cum maculis griseis. *Collum* l. *Pectus* anteriori macula nigra lata, a qua utrinque versus colli dorsum, et alia per oculos versus frontem, alia demum versus maxillae inferioris latera. Hanc nigredinem distinguit macula alba gulae, frontis, temporum, uuchae. *Pectus*, *Abdomen*, *Cauda* subtus, *Alae* subtus, *Dorsum* pone alba. *Alae* supra cinereae, *remigibus* (23) nigricantibus versus basin albis, at secundarii et apice et basi albi. *Dorsum* tegunt pennae longiores, latiores nigrae maculis ferrugineis. *Cauda* brevis, fusca. *Rectrices* basi apiceque albae, exceptis intermediis duabus. *Pedes* sanguinei, filii, unguibus nigris. *Femora* seminuda.

151. *TRINGA striata* rostro basi pedibusque flavis, rectricibus albis fusco-fasciatis, remigibus plurimis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 248. Fabr. Fn. Groenl. 75. Lath. Ind. 2. p. 735.

Tringa rostro basi pedibusque flavis, corpore fusco-undulato, abdomine albo. *Flore-Pist. Ström*: Act. Nidros. 3. p. 440. t. 7.

Tr.

Tr. maritima fusca cinereo-undulata, rectricibus lateralibus quatuor utrinque brevioribus, basi rostri pedibusque flavis. Brunn. Orn. bor. p. 54.

Totanus striatus. Brill. Orn. 2. p. 263.

Striated Sandpiper. Penn. Arct. Zool. 2. p. 470.

Chevalier roye. Buff. Av. 7. p. 516.

Habitat ad littora maris.

Rostrum nigrum basi luteo-rufescens. *Caput* et *Collum* grises, subtus pallidiora. *Gula* alba. *Ocularum* area alba. *Pectus* griseum marginibus pennarum albis. *Dorsum* fuscum marginibus pennarum cinerascens. *Latera* et *Abdomen* alba maculis cinereis. *Alarum tectrices* griseae maculis albis, *inferiores* nigrae apicibus albis. *Remiges* 1 — 5 nigri, 6 — 10 fusci apicibus albis, 11 — 20 grisei basi et apice albi, 21 etc. nigri. *Caudae* tectrices superiores nigrae, inferiores albo-griseoque maculatae. *Rectrices* 12. intermediae fuscae, proximae etiam sed apice albae, reliquae sensim pallidiores, omnes margine apicum albo. *Pedes* flavi.

152. *TRINGA hyperborea* rostro subulato apicibus inflexis, pedibus pinnatis.

Tr. lobata rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo ferrugineoque undulato. Fabr. Fn. Groenl. 75.

Mas.

Phalaropus hyperboreus cinereus, subtus utropygio fasciaque alarum albis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis. (*Mas.*) Lath. Ind. 2. p. 775.

Tr. hyperborea rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore cinereo, colli lateribus ferrugineis. L. S. N. XII. T. I. p. 249. Fn. Su. 179. *descriptio posterior*.

Tr. lobata. *Odisu Hani*. Mohr. Hist. Nat. Isl. p. 46. t. 5.

Phala-

- Phalaropus cinereus*, Briss. Orn. 2. p. 362.
Red Phalarope, Penn. Britt. Zool. 2. p. 492. t. 76. Arct. Zool. 2. p. 494.
The Cock Cootfooted Tringa, Edw. Av. 5. t. 143.

Foemina.

- Tr. lobata* rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo undulato. L. S. N. XII. T. I. p. 249.
Tr. lobata rostro subulato apice inflexo, pedibus virescentibus lobatis, abdomine albedo. Fa. Su. 179.
Phalaropus lobatus cinereo-coerulescens subtus albus, tectricibus alarum, remigibus rectricibusque nigricantibus margine cinerascens-albo. Lath. Ind. 2. p. 776.
Phalaropus, Briss. Orn. 2. p. 361.
Grey Phalarope, Penn. Britt. Zool. 2. p. 491. t. 76. Arct. Zool. 2. p. 494.
Grey Cootfooted Tringa, Edw. Av. 6. t. 308.

Pallus.

- Tr. lobata*, Brünn. Orn. bor. p. 31.
 Habitat juxta rivulos Lapponiae sub aestate, sub migratione insulas maris Balthici frequentans.
 Secundum LATHAM *Tringa Fulicaria* L. est foemina *Tr. hyperborea*, teste autem O. FABRICIO *Tringa lobata* L. *Tringa fulicaria* in Suecia non est observata, nec eam in Groenlandia vidit FABRICIUS.
 Mas. Vertex niger, fronte vix alba. Sub oculis linea nigra supra vero macula minuta alba. Caput subtus album. Temporum linea ferruginea ad collum descendens. Collum ferrugineum, vix nigro admixto. Pectus medio album, lateribus nigro adpersum. Dorsum nigrum margine pennarum ferrugineo. Remiges primo-

primores 1 — 5 nigri, 6 — 10 basi apiceque albi, secundarii magis magisque albi, ut duo intimi toti albi. Rachides omnium albae. Tectrices alarum nigrae, at secundarii proximae apice albae, unde linea alarum alba. Rectrices 12 nigrescentes, at 1. 1. margine extimo et apice 2. 2. — 5. 5. apice tantum, 6. 6. vix apice albae. Uropygium nigrum lateribus albo-punctatis. Crissum album.

Foemina differt vertice minus saturato nigro, fronte albo-nigroque varia. Temporum linea alba. Collum supra nigrum ferrugineo-undulatum, subtus lineis albis, cinereis et ferrugineis undatum. Pectus inferius et Abdomen alba.

Pallus: Latera Capitis et totus subtus albus. Cervix nigra.

155. *Tringa alpina* testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus. L. S. N. XII. T. I. p. 249. Fa. Su. 181. Lath. Ind. 2. p. 736.
Cinclus torquatus, Briss. Orn. 2. p. 268.
The North Country Dunlin, Will. Orn. p. 305.
Dunlin, Penn. Britt. Zool. 2. p. 471. Arct. Zool. 2. p. 476.
Brunette, Buff. Av. 7. p. 493.
Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore macula nigra, rectricibus intermediis longioribus.
Tringa alpina Loar Thraell. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 581. t. 41.

Habitat in littoribus marinis Lapponiae.

Magnitudo Sturni. Caput, Collum supra, Dorsum rufo-ferruginea saepe nigro-maculata. Jugulum et Abdomen alba. Sternum macula nigra majore vel pluribus

minoribus. *Remiges primores* fusci rachi alba, *secundarii* exteriores margine exteriori lateraque interiore albi. *Cauda* cinerea, *rectricibus* duabus mediis parum longioribus et obscurioribus.

154. *TRINGA Ocropus* rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine *rectricibusque* extimis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 250. Fn. Su. 180. Lath. Ind. 2. p. 729.

Tringa. Brisf. Orn. 2. p. 259.
Tringa, *Cinclus*, *Gallinula*, *Rhodopus* etc. Will. Orn. p. 300.

Green Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 468. Arct. Zool. 2. p. 475.

Becasseau ou Culblanc. Buff. Av. 7. p. 534.
Scanis Lerbens, Enkel Beccasin.

Rostrum pollicare, in avo viva puncta haud observanda. *Caput* et *Collum* obscure griseo-maculata, sultus pallidiora. *Dorsum* et *Alae* ex viridi fusca maculis albis variegata. *Abdomen* album. *Alae* sultus et *femora* nigra striis albis. *Rectrices* 1. 1. penitus candidae 2. 2. macula prope apicem alba, 3. 3. ductu albo non longe ab apice, 4. 4. ductibus duobus 5. 5. ductibus, duobus cum dimidio, 6. 6. ductibus quatuor. *Pedes* olivacei, digito medio et extremo membrana longitudine articuli dimidii coanexis. Nulla in coloribus *sexus* dissensio.

155. *TRINGA Glareola* rostri apice punctato, pedibus virescentibus, corpore fusco albo-punctato, pectore subalbido.

Tr. Glareola rostro laevi, pedibus virescentibus corpore fusco-albo-punctato, pectore subalbido. Fn. Su. 184. Lath. Ind. 2. p. 730.

Wood

Wood Sandpiper. Penn. Arct. Zool. 2. p. 482.

Habitat in paludibus sylvaticis.

Glareolam Ocropus in S. N. junxit a *Linno* forte ob colores dorfi pedumque subsimiles et denique ob puncta in utraque rostro sicato conspicua. Differunt tamen manifeste, et ni fallor sequens descriptio veram *Glareolam a b. LECHE LINNED* primum oblataam exhibet. *Glareola* D. MARCKWICK in Vol. I. *Transact. Linn.* p. 128. t. 2. ab hac differt, forte junior *Ocropus*. An *Tr. Ocropus* var. *Braun. Orn. bor.* p. 55 et 56 huic pertinet?

Pileus niger taenia ferruginea a rostro ad nucham divisus. *Linea* superciliaris pallida etiam a rostro ad nucham. *Stria* fusca a naribus sub oculis versus nucham. *Rostrum* nigro-fuscum versus apicem nigrum, et in hac parte puncta illa in siccatis conspicua sunt. *Mandibula* superior intus utrinque a basi ad $\frac{2}{3}$ denticulis reversis instructa. *Collum* a maculis parvis albis, fuscis et nigris variegatum. *Remiges* nigrescentes immaculati, sed *secundarii* apicibus albi. *Tectrices* alarum, *Remiges* tertiarum et *Rectrices* intermediae ex albo et nigro nebulosae. *Scapulares* longiores ipsam caudae basin tegentes latere exteriori pallide luteo-ferrugineae: interiore nigrae marginibus viridi-nitescens, prope rachin maculis oblongis fuscis. *Pedes* sordide virescentes, digitis nulla membrana junctis. *Longitudo* 7 poll. *Oculi* vertici propiores quam in ceteris, minus tamen quam in *Scolopace ruficola*.

156. *TRINGA littorea* rostro laevi, pedibus cinereis, remigibus fuscis, rachi primi nivea. L. S. N. XII. T. I. p. 251. Lath. Ind. 2. p. 731.

Tr. littorea rostro laevi, pedibus remigibusque fuscis, rachi primi nivea. Fn. Su. 185.

Tota-

Totanus cinereus. Briss. Orn. 2. p. 265.

Shore Sandpiper. Penn. Arct. Zool. 2. p. 431.

Chevalier varié. Buff. Av. 7. p. 517.

Habitat in paludibus.

Magnitudo Turturis. *Rostrum* nigrum capite longius, *Maxilla inferior* versus basin pallidior. *Oculorum* regio albicans, linea inter oculos et rostrum fusca. *Collum* fuscum lineis obliquis albicantibus. *Dorsum* fuscum maculis punctisve ferrugineis vel griseis. *Uropygium* album, pennae tamen versus basin nigricantibus. *Tectrices alarum superiores* dorso concolores, sed punctis vel maculis dilutioribus, *inferiores* exalbidae lineis transversis cinereis. *Pectus* et *Abdomen* albidum. *Caudae* tectrices inferiores albae. *Remiges nigri*, *secundarii* apice albescunt, *primus* rachi nivea gaudet. (varietatem commemorat *Brunniche* rachi nigra). *Rectrices* fusco et albo undulato-maculatae, exterioribus maxima parte albis: intermediis maxima parte fuscis. *Pedes* fusci.

157. *TRINGA Hypoleucos* rostro laevi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris: subtus albo. L. S. N. XII. T. I. p. 250. Fn. Su. 182. t. 1. f. 182.

Tr. Hypoleucos, rostro laevi, pedibus cinereis, corpore cinereo subtus albo. Lath. Ind. 2. p. 734.

Guinetta. Briss. Orn. 2. p. 260.

The lesser Tringa or Sandpiper. Will. Orn. p. 301.

Common Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 470. t. 71. Arct. Zool. 2. p. 474.

La Guinette. Buff. Av. 7. p. 540.

Suecis Snäppa. *Westmanis* Strandfittare.

Habitat ad lacus.

Rostrum lividum vix capite longius. *Caput*, *Cervix*, *Dorsum*, *Alae*, *Uropygium* et tota supra obscure vel ex fusco

fusco cinerea, lituris undulisque fuscis. *Linea* alba super oculos. *Gula*, *Abdomen*, *Femora*, *Cristum* alba. *Iugulum* album lineis longitudinalibus subfuscis. *Remiges* fusci, 1. immaculatus, 2 — 10 interiore latere albi, 11 — 20 apice quoque albo. *Rectrices* 4 intermedias fuscae eodem modo ac alae striatae: exteriores albo-nigroque maculatae. *Digitus* extimus medio adnectitur.

Max in pennae dorsi linea longitudinali nigra unco saepe laterali, in alis striata simplex transversa pennarum; in foeminae haec striatae duplicantur, etiam in dorso. *Longit.* 6½ poll.

158. *TRINGA Canutus* rostro laevi, pedibus cinerascens, remigibus primoribus ferratis, rectrice extrema alba immaculata. L. S. N. XII. T. I. p. 251. Fn. Su. 183. Lath. Ind. 2. p. 738.

Canutus. Briss. Orn. 2. p. 276.

Knet. Will. Orn. p. 302. Penn. Britt. Zool. 2. p. 461.

Fn. Scot. t. 3. Arct. Zool. 2. p. 473. *Edw. Av.* 6. t. 276.

Canut. Buff. Av. 8. p. 142.

Habitat juxta aquas, ubi currit, caudam Motacillae instar continuo motitans.

Rostrum fuscum capite paulo longius. *Macula* supra oculos alba. *Caput*, *Collum*, *Dorsum* fusco-nigro-griseoque undulata. *Gula*, *Iugulum*, *Pectus*, *Abdomen* alba. *Remiges* 20 fusci, *primores* in medio postice albi, *secundarii* in medio totaliter l. utrinque albi; apices in his albi, in primoribus minus manifeste. *Alae* subtus fascia quadruplici pinguntur. *Tectrices superiores* praesertim primae albicant apicibus. *Remiges* 1 — 6 margine exterioro versus apicem serrati. *Rectrices* fuscae 1 — 4 albo-variegatae, at 5 — 6 omni albedine expertes, griseo-

leo-maculatae. Femora leuiscuda. Pedes cinerascetes, digitus ultimus medio adnexus infimo articulo.

Denticuli marginales linguae octo, et faucis retrospectantes aliis speciebus etiam communes.

159. *TRINGA Cincus* rostro pedibusque nigris, loris albis, corpore uropygioque griseis fuscisque. L. S. N. XII. T. I. p. 251. Lath. Ind. 2. p. 735.

Cincus. Briss. Orn. 2. p. 267.

The Stint. Will. Orn. p. 305.

Purp. Penn. Britt. Zool. 2. p. 472. t. 71. Arct. Zool. 2. p. 475.

L'allouette de la mer. Buff. Av. 7. p. 548.

Habitat ad littora Roslagiae.

Magnitudo circiter Alaudae. Caput et Cervix cinerea lineis fuscis. Linea alba inter rostrum sesquipollicare nigrum et oculos. Gula alba. Jugulum fusco-maculatum. Dorsum fusco-cinereum. Pectus et Abdomen alba. Tectrices alarum et caudae obscure fuscae pallide vel albo-marginatae. Remiges latere exteriori fusconigricantes: interiore albo. Rectrices 2 intermediae fuscae, reliquae cinerascetes albo-marginatae. Pedes sordide virentes. Digiti nulla membrana juncti.

160. *TRINGA Squatarola* rostro nigro, pedibus virentibus, corpore griseo subtus albido. L. S. N. XII. T. I. p. 252. Fn. Su. 186. Lath. Ind. 2. p. 729.

Vanellus griseus. Briss. Orn. 2. p. 237.

Grey Plover. Will. Orn. p. 309.

Grey Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 456. Arct. Zool. 2. p. 477.

Le Vanneau Pluvier. Buff. Av. 8. p. 68.

Scania Augusti Snäpps.

Habitat

Habitat in Scania et Finlandia.

Rostrum nigrum bipollicare parum ascendens. Caput et Dorsum Supremum ex nigro, griseo et albo variegatum, praevalescente nigro. Collum dilutius variegatum. Gula et Capitis latera alba maculis oblongis fuscis. Abdomen, Crissum, Uropygium alba. Remiges primores 4 nigri, rachi primi alba, ceteri fuscescentes, omnes pallide marginati, secundarii praeterea maculis nigris ad marginem. Cauda alba fasciis fuscis irregularibus, in intermediis latioribus et crebrioribus. Pedes subvirescentes 60 incisuris transversis. Digitus medius et extremus membrana juncti.

161. *TRINGA grisea* rostro pedibusque nigris, corpore griseo, subtus albido, strigis fuscis.

Tr. grisea, subtus alba, collo subtus, uropygio et pectore fusco-undatis, rectricibus margine albo. Lath. Ind. 2. p. 733.

Calidris grisea. Briss. Orn. 2. p. 272.

Maubeche grise. Buff. Av. 7. p. 531.

Habitat in littoribus Roslagiae.

Magnitudo circiter Sturni. Rostrum $1\frac{1}{2}$ poll. Tota griseo-variegata, pennae colli remigibusque secundariis intra marginem circumferentia simplici, uropygii duplici fusca, abdominis linea brevi fusca versus apicem pennae. Remiges primores fusci, secundarii grisei albo-simbriati. Rectrices griseae margine albo et fascia obscuriore prope apicem. Pedes nigri.

162. *TRINGA cinerea* dorso alisque cinereis, lituris nigris alisque undulatis, rectricibus cinereis marginibus albis. Brunn. Orn. bor. p. 53. n. 179.

Tr. cinerea nigro-cinereo-alboque lunato-varia, pectore et abdomine albis, tectricibus caudae albo-nigro-

nigroque fasciatis, rectricibus margine albo. Lath. Ind. 2. p. 733.

Ashcoloured Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 462. Arct. Zool. 2. p. 474.

Habitat in Insulis maris Balthici, inque Scania rarius.

Caput cinereo-fuscum nigro-maculatum. *Collum* cinereum strigis fuscis. *Dorsum* et *tectrices* alarum maculis lunulatis ex cinereo-albo et nigro. *Remiges* primores fusci, secundarii cinerei albo-marginati. *Tectrices* caudae albae nigro-fasciatae. *Rectrices* 12 cinereae albo-marginatae. *Pectus* et *Abdomen* alba immaculata. *Pedes* viridi-nigrescentes, *digiti* sublobatis, membrana dentata.

163. *TRINGA Islandica* rostro subarcuato, subtus rufa albo-maculata, supra nigra maculis albis testaceisque.

Tr. Islandica rostro pedibusque fuscis, corpore subtus ferrugineo, remigibus secundariis margine albis. L. S. N. XII. T. I. P. 2. add. Lath. Ind. 2. p. 737.

Tr. ferruginea. Brünn. Orn. bor. p. 180.

Red Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 469. t. 72. Arct. Zool. 2. p. 476.

Aberdeen Sandpiper. Ibid. p. 469.

Habitat — Scania transmigrat.

Inter minores. *Rostrum* nigrum subulatum laeviter arcuatum. *Pileus* niger. Tota avis subtus rufa leviser albo-maculata. *Collum* supra testaceum nigro-maculatum. *Dorsum* nigrum maculis acutis albis testaceisque. *Alae* cinereae. *Tectrices* alarum superiores et *Rectrices* nigricantes albo-marginatae. *Tectrices* caudae utrinque albae fasciis nigris.

164. *TRINGA pusilla* rostro pedibusque fuscis, corpore subtus rufescente, rectricibus ultimis scapo albo, uropygio variegato. L. S. N. XII. T. I. p. 252. Lath. Ind. 2. p. 737.

Cinclus

Cinclus dominicensis minor. Briss. Orn. 2. p. 269.

Little Sandpiper. Penn. Britt. Zool. 2. p. 473. Arct. Zool. 2. p. 479. Gen. of Birds. ed. in 4. p. 65. t. 12.

Habitat in littoribus maritimis Roslagiae.

Tringilla domestica minor. *Caput, Cervix, Dorsum, Tectrices* alarum fusca, pennae nigro-pallideque ferrugineo-marginatae. *Pectus, Abdomen* alba. *Remiges* et *Rectrices* fuscae. *Pedes* nigri.

CHARADRIUS.

Rostrum teretiusculum, obtusum.

Nares lineares.

Pedes cursorii, tridactyli.

165. *CHARADRIUS Hiaticula* pectore nigro, fronte nigricante fasciola alba, vertice fusco, pedibus luteis. L. S. N. XII. T. I. p. 255. Fn. Su. 137. Fabr. Fn. Groenl. 73. Lath. Ind. 2. p. 743.

Pluvialis torquata minor. Briss. Orn. 2. p. 127.

Sea Lark Will. Orn. p. 310.

Ringed Plover. Penn. Britt. Zool. 2. p. 479. Arct. Zool. 2. p. 485.

Petit Pluvier à Collier. Buff. Av. 3. p. 90. t. 6.

Suecis Strandpipare. *Scania* Sandrulling. *Hollandis* Truls. *Lappis* Pago.

Habitat ad ripas ubique et in alpidibus Lapponicis frequens.

Rostrum croceum apice nigrum. *Caput* cinereo-fuscum, fronte alba, superciliis fascia atra. *Palpebrarum* margo fulvus. *Tempora* obscuriora. *Gula* et *Collum* alba, dein ad sternum usque macula nigra magna. *Dorsum, Alae, Cauda* cinerea. *Pectus* et *Venter* alba. *Pedes* flavi, in altero sexu fulvi. *Remiges* fusci, quorum 1

N

rachi

rachi alba, 5 — 19 apice albi. Rectrices fuscae, 6. 6. immaculatae, 5, 4, 3, apice albo, 2, apice et latere exteriori albis, extima tota alba macula interdum nigra. Mas magis quam foemina cinerascens, et albedo frontis major.

166. CHARADRIUS *Morinellus* pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba, pedibus nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 254. Fn. Su. 188. Lath. Ind. 2. p. 746.

Pluvialis minor l. *Morinellus*. Briss. Orn. 2. p. 225.

Morinellus Anglicanus. Briss. Orn. 2. p. 226.

The Dotterel. Will. Orn. p. 309. Penn. Britt. Zool. 2. p. 477. t. 73. Arct. Zool. 2. p. 487.

Petit Pluvier ou le Guignard. Buff. Av. 8. p. 87.

Peerce Læms Lapp. p. 260.

Suecis Pomeransfogel. *Leppis* Lahul.

Habitat ad Sernam orientalis Dalocathiae et Alpes Lapponiae, quo migrans Upsaliam mense Majo transit.

Magnitudo Turdi, foemina major mare. *Rostrum* nigrum. *Caput* maris nigricans, foeminae nigrum maculis albis. *Linea* alba a rostro supra oculos ad nucham tendens. *Gula* alba. *Collum*, *Dorsum* dilute cinereo-olivacea. *Pectus* et *latera* sordide aurantia superne (in mare) fascia alba supra nigro-marginata terminata. *Abdomen* maris nigrum, foeminae albo-nigroque varium. *Remiges* fusci, primo margine exteriori et rachi albis. *Cauda* fusco-olivacea apice nigro albo-marginata. *Pedes* virecentes.

167. CHARADRIUS *apricarius* pectore abdomineque nigro, corpore fusco-albo-luteoque punctato, pedibus cinereis. L. S. N. XII. T. I. p. 254. Fn. Groenl. 79. Lath. Ind. 2. p. 742.

Ch.

Ch. apricarius pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis. Fn. Su. 189.

Allwargrim. it. Oel. p. 72.

Pluvialis aurea Freti Hudsonis. Briss. Orn. 2. p. 224.

Allwargrim Plower. Penn. Arct. Zool. 2. p. 483.

The Spotted Plower. Edw. Av. 3. t. 140.

Pluvier doré à gorge noire. Buff. Av. 8. p. 85.

Suecis Åkerhöns. *Oelandis* Allwargrim. *Smolandis* Myrpytta. *Scanis* Ljungspole.

Habitat in campestribus Oelandiae, Smolandiae, Scaniae etc.

Magnitudo Columbae minoris. *Rostrum* longitudine capitis, nigrum, versus basin gibbum. *Tota avis* supra e nigro, fusco, luteo alboque pulchre maculata. *Fascia* alba frontis supra oculos ad aures ducta. *Collum* subtus, *Pectus* et *Abdomen* nigra. *Colli* latera versus thoracem alba. *Femora*, *Ala* subtus, *Cristum* albicant. *Remiges* nigricantes, *primores* 8, quorum extimus longior, reliqui ordine breviores, acuminati, in medio juxta rachin albi; *secundarii* fusci, obtusi, aequales apicibus albis, uti etiam *rectrices*. *Cauda* integra, *rectricibus* 12 fuscis, *lineis* lateralibus 8 utrinque flavescens. *Pedes* cinerei.

Mas differt colore temporum nigro ad nigredinem colli descendente.

Foemina pectore albo linea longitudinali nigra.

168. CHARADRIUS *pluvialis* corpore nigro viridique maculato subtus albedo, pedibus cinereis. L. S. N. XII. T. I. p. 254. Fn. Su. 190. Lath. Ind. 2. p. 740.

Pluvialis aurea. Briss. Orn. 2. p. 222.

Green Plower. Will. Orn. p. 308.

N a

Golden

Golden Plover. Penn. Britt. Zool. 2. p. 474. t. 72.

Arct. Zool. 2. p. 483.

Pluvier doré. Buff. Av. 8. p. 81. t. 5.

Dalecarliæ Åkerhöna. Scania Ljungwipa. Lappis Hutti.

Habitat prope alpes Dalecarlicas orientales, in Oelandiae et Scaniae campestribus etc. Sub fine Octobris et initio Septembris imprimis in Scania observanda.

Rostrum nigrum. *Caput*, *Collum* supra, *Dorsum*, *Tectrices* alarum nigris pennis margine maculis flavo-virescentibus pallidis. *Gula* albescens. *Collum* subtus a gula ad sternum e testaceo et fusco maculatum. *Pectus* et *Venter* alba. *Remiges* nigro-fuscis margine apicem albicante. *Alae* subtus albae. *Cauda* integra, rectricibus 12 fuscis, mediis flavo-viridi fasciatis. *Femora* cinerea, ut in antecedentibus seminuda. Ita etiam in indigenis digitus medius cum ultimo membrana ad primum articulum juncti.

Variat praeterea *Corpore* supra viridi-luteo maculis ramolis nigris, *pectore* ex flavo-viridi variegato, *remigibus* fuscis, 1 — 9 medio scapo albicante, 5 etc. basi extrorsum albidis. *Abdomen* nigrum vel nigro-alboque varium apud nos non observatur.

RECURVIROSTRA.

Rostrum depresso-planum, subulatum, recurvatum, acuminatum, apice flexili.

Pedes palmati tridactyli.

169. *RECURVIROSTRA Avocetta*, albo nigroque varia. L. S. N. XII. T. I. p. 256. it. Oel. p. 89. Fn. Su. 191. Lath. Ind. 2. p. 786.

Avocetta. Brill. Orn. 2. p. 504.

The Avocetta. Will. Orn. p. 321.

Scop.

Scooping Avocet. Penn. Britt. Zool. 2. p. 504. t. 80.

Arct. Zool. 2. p. 505.

L'Avocette. Buff. Av. 8. p. 466. t. 33.

Oelandis Skärfläcka. *Gottlandis Alfit.*

Habitat in Oelandiae extremo apice l. maxime australi littore praedii Ottenby, in Gottlandia et Scania. Victitat Insectis et Vermibus.

Aequo jure Anserum ordini adnumeratur haec Avis, ob pedum longitudinem et femora seminuda forte ad Grallas numerata.

Rostrum nigrum fere coriaceum, minime rigidum, capite circiter triplo longius, apice membranaceum. *Nares* oblongae, perviae. *Caput* supra et *Cervix* ultra medium nigra, reliqua capitis et colli cum *Pectore*, *Abdomine*, *Cauda*, medio *Dorsi* et plaga longitudinali duplici *Alarum* alba. *Latera Dorsi* et medium *Alae* longitudinaliter, margo et apices *Alarum* nigra. *Macula* in quibusdam parva alba supra et alia sub oculis. *Remiges primores* 8 nigri, sed versus basin albi ea proportionem, ut quo breviores eo magis albi, ut octavi solus apex macula nigra sit notata, reliqui remiges albi. *Tectrices* albae exceptis 5 primis apice nigris. *Cauda* brevissima. *Pedes* coerulescentes. *Femora* seminuda.

HAEMATOPUS.

Rostrum compressum, apice cuneo aequali.

Nares lineares.

Pedes cursorii, tridactyli, fissi.

170. *HAEMATOPUS ostrilegus.* L. S. N. XII. T. I. p. 257. Fn. Su. 192.

H. ostrilegus niger, corpore subtus fascia gulari et alarum uropygio caudaque basi albis, Lath. Ind. 2. p. 752.

Strand.

- Strandfjavar.* it. Oel. p. 38.
Ostralega, Pica marina vulgo dicta. Brill. Orn. 2. p. 221.
Sea Pie. Will. Orn. p. 297.
Pied Oystercatcher. Penn. Britt. Zool. 2. p. 482. t. 74.
 Arct. Zool. 2. p. 489.
La Pie de mer. Buff. Av. 8. p. 119. t. 9.
Gottlandis Marzpitt. Oelandis Strandkjura. Scapis Strandkasta.

Habitat ad littora Maris praesertim Oelandiae et Gottlandiae. Testaceis victitat. Venatoribus odiosa, nam clamore reliquas Aves de periculo monet.

Rostrum sanguineum, capite longius, compressum, praesertim apice cuneato. *Nares* oblongae, perviae. *Palpebrae* nudaе, circulo coccineo. *Iris* rubra, *pupilla* nigra. *Caput*, *Collam* usque ad sternum, *Dorsum* ad medium et *Alae* superae nigra. *Pectus*, *Venter*, *Dorsum* posterius, *Tectrices caudae* utrinque, *Femora* semivestita alba. *Remiges* nigri, at in media costa linea alba et latus interior albus, *secundarii* nigri versus basin et margine albi. *Tectrices spuriae* albae, unde fascia alarum obliqua longitudinalis alba. *Rectrices* albae a medio ad extremum nigrae. *Pedes* incarnati, *digiti* calle marginatis, medio extimoque nonnihil conjunctis.

F U L I C A.

Rostrum convexum, *mandibula* superiore margine supra inferiorum fornicata, inferior pone apicem gibba.

Nares oblongae.

Frons calva.

Pedes tetradactyli.

171. *FULICA atra* fronte incarnata, armillis luteis, pedibus pinnatis, corpore nigricante. L. S. N. XII. T. I. p. 193. Lath. Ind. 2. p. 777.
F. atra fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis. Fa. Su. 193.
Fulica. Brill. Orn. 2. p. 365.
The Coot. Will. Orn. p. 319.
Common Coot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 494. t. 77. Arct. Zool. 2. p. 496.
Foulque on Morelle. Buff. Av. 8. p. 211. t. 18.
 β. *Fulica Aethiops* tota nigra. Mus. Carlf. 1. t. 13.
Suecis Blasklacka. Scanis Blesand. Sudermannis Blæsa.
 Habitat in Aquis; victitat Piscibus, Insectis, Seminibus. Incessus Gallinae. Nidus natans.

Caput nigrum fronte calva albo-incarnata, interdum omnino alba. *Rostrum* carneum. *Irides* rubrae. *Corpus* supra fulco-nigrescens, subtus cinereo-fuliginosum, pectore undulato. *Remiges primores* nigri, *secundarii* fusco-cinerascentes apice albido, unde linea alarum alba. *Genus* pollice vel ad latera fulva. *Pedes* longi. *Digit* membrana lata sublobata marginati. *Ungues* longi acuti.

172. *FULICA aterrima* fronte alba, armillis rubris, pedibus pinnatis, corpore nigricante. L. S. N. XII. T. I. p. 258. Lath. Ind. 2. p. 778.
F. major. Brill. Orn. 2. p. 366.
Greater Coot. Will. Orn. p. 320.
Great Coot. Penn. Britt. Zool. 2. p. 495.
La grande Foulque. Buff. Av. 8. p. 220.
 Habitat — — — Mus. Grill.

173. *FULICA Chloropus*, fronte fulva, armillis rubris, pedibus simplicibus, corpore nigricante, Linn. S. N. T. I. p. 253.

Gallinula Chloropus, fronte fulva, armillis rubris, corpore nigricante, crisso albo, Lath. Ind. 2. p. 770.

Gallinula. Briff. Orn. 2. p. 558.

Common Waterhen or Moorhen. Will. Orn. p. 512.

Common Gallinule. Penn. Britt. Zool. 2. p. 489. t. 77. Arct. Zool. 2. p. 492.

Poule d'eau. Buff. Av. 8. p. 171. t. 15.

Sueciis Wattnhöna.

Habitat in Dalefwen, etiam in Scania vifa, Nidificat juxta aquas in arboribus.

Præcedente minor. *Rostrum* carneum. *Frons* fulva. *Caput*, *Collum* supra et *Dorsum* olivacea. *Subtus* cinerea, *Gula* et *Abdomine* albo-maculata. *Remiges* et *Rectrices* fuscae, *remige* primo albo. *Cauda* subtus alba. *Digiti* subtus plani, marginati. *Fœmina* minor, coloribus minus lucidis.

174. *FULICA Porphyrio* fronte rubra, armillis multis, pedibus simplicibus, corpore viridi subtus violaceo, L. S. N. XII. T. I. p. 250.

Gallinula Porphyrio. Lath. Ind. 2. p. 768.

Porphyrio. Briff. Orn. 2. p. 551.

Porphyrio or *purple Waterhen*. Will. Orn. p. 318. Edw. Av. 2. t. 87.

Poule Sultane. Buff. Av. 8. p. 194. t. 17.

Habitat. —

Magnitudo Gallinae. *Rostrum* longum, validum, rubrum. *Frons* rubra. *Irides* fulvae. *Caput*, *Cervix* violacea. *Gena*, *Gula*, *Jugulum* coeruleo-violacea. *Supra* viridis, *subtus* coerulefcens. *Pedes* longi rubri.

RAL-

R A L L U S.

Rostrum basi crassius, compressum, dorso attenuatum apicem versus, aequale acutum.

Nares oblongae.

Pedes tetradactyli fissi.

Corpus compressum.

175. *RALLUS Crex* alis tufco-ferrugineis. L. S. N. XII. T. I. p. 261. Fr. Su. 194.

Gallinula Crex grisea pennis medio nigricantibus, alis tufco-ferrugineis, corpore subtus albo-rufefcente. Lath. Ind. 2. p. 766.

Rallus Genistarum sive *Ortygometra*. Briff. Orn. 2. p. 253.

The Rail or Dakerhen. Will. Orn. p. 170.

Crake Gallinule. Penn. Britt. Zool. 2. p. 487. t. 75. Arct. Zool. 2. p. 492.

Rale de Terre, de Genet ou Roi des Cailles. Buff. Av. 8. p. 146. t. 12.

Sueciis Kornknarr, Anglnärpa. *Gotlandis* Seidreilwer. *Wefirogothis* Bjuggbit, aliis Snarrwacktel, Wacktelkung, Kornkrika.

Habitat inter segotes et gramina in fertilissimis pratis aestate, ubi stridulo sono gemino *Crex Crex* continuo auditur. Edit Lumbricos, Insecta, Semina. Lapillos etiam devorat gallinarum more.

Caput ratione corporis parvum. *Rostrum* utrinque basi sinuatum, subincarnato-lividum. *Irides* rufescentes. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Cauda* testacea maculis majusculis nigris, singula penna nigra marginibus testaceis. *Remiges* ferruginei, supra et infra: at *primores* in fuscum vergunt et *intimi* vel *tertiarii* duos ordines punctorum minorum alborum habent. *Rectrices* bre-

ves

ves ferrugineae. Gula et macula pone oculos cana. Pectus griseum. Abdomen et Latera ferruginea maculis fuscis, (color exustus) albo-undulata, qualis etiam cauda subtus. Femora supra genua nuda livida.

Character consistit in rostro fere gallinaceo naribus perviis, pedibus tetradactylis, digitis rostro longioribus. Ingluvies nulla.

176. RALLUS aquaticus alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro subtus fulvo. L. S. N. XII. T. I. p. 262. Fn. Su. 195. Lath. Ind. 2. p. 755.

Wandhönen. Act. Nidros. 2. p. 540. t. 12.

Rallus aquaticus. Brill. Orn. 2. p. 251.

Water Rail, Bilcock or Brook Ouzel. Will. Orn. p. 514.

Water Rail. Penn. Britt. Zool. 2. p. 484. t. 75.

Rale d'eau. Buff. Av. 6. p. 154. t. 13.

Habitat in Carectis.

Rostrum longum nonnihil arcuatum fuscum, mandibula inferiore flavo-rubra. Caput, Cervix, Dorsum, Alae, Cauda supra nigro-fuscoque maculata. Jugulum, Pectus cinerea marginibus pennarum pallide testaceis. Abdomen fasciatum ex ferrugineo, nigro et albo. Cauda cuneata brevis. Remiges primores fusco-faliginosi. Pedes fusci, digitis marginatis. Ungues subulati, arcuati.

177. RALLUS Porzana reatricibus binis intermediis albo-marginatis, rostro pedibusque subolivaceis. L. S. N. XII. T. I. p. 262.

Gallinula Porzana fusco-olivacea nigro albidoque variegata et maculata, reatricibus duabus intermediis albo-marginatis. Lath. Ind. 2. p. 772.

Rallus

Rallus aquaticus minor. Brill. Orn. 2. p. 252.

Gallinula Ochra Geineri. Will. Orn. p. 516.

Spotted Gallinule. Penn. Britt. Zool. 2. p. 486.

Petit Rale d'eau, ou Maronette. Buff. Av. VIII. p. 157.

Habitat in Suecia superiore ad ripas. Mus. Grill.

Rostrum viridescens apice fusco. Pedes fusco-olivacei. Caput supra nigrum maculis olivaceis. Colli latera griseo-maculata. Linea occipitis et nuchae nigra albo-punctata. Rectrices acutae nigrescentes fasciis olivaceis.

5. GALLINAE.

O T I S.

Rostrum mandibula superiore fornicata.

Nares ovatae.

Lingua bifida.

Pedes cursorii tetradactyli.

178. OTIS Tarda maris mandibula inferiore utrinque mysticibus pennatis.

O. Tarda maris capite juguloque utrinque cristato. L. S. N. XII. T. I. p. 264.

O. Tarda nigro rufoque undulato-maculata subtus albida, capite maris juguloque utrinque cristato. Lath. Ind. 2. p. 658.

Otis. Brill. Orn. 2. p. 216.

The Bustard. Will. Orn. p. 178.

Great Bustard. Penn. Britt. Zool. 1. p. 284. t. 44.

The Bustard Cock. The Hen Bustard. Edw. Av. 2. t. 73. 74.

Outarde. Buff. Av. 2. p. 1. t. 1.

Suecis

Sueci Trapp.

Habitat in campis arenosis Scaniae passim.

Gallopavone major mas scil. 4 ped. long. Ad basin mandibulae utrinque *mystaces* retroverlas pennaceas ultra 3 pollices longas gerit, quae in foemina dimidio minores desunt. *Caput* et *Collum* cinerea in mare, in foemina *Vertex* fulvus nigro-striatus, reliquum *caput* ferrugineum. *Dorsum*, *Alae* ferrugineo-lutea fasciis nigris pennarum; *Pectus*, *Abdomen*, *Criſsum* alba. *Remiges primores* nigri, *secundarii* albi macula apicum nigra. *Rectrices* 20 dorso concolores fasciis nigris. *Femora* supra genua nuda. *Pedes* cinerei. *Callus* sub planta loco quarti digiti. *Plumae* totius corporis sub pennis pulcherrime roseae.

Obs. Huic avi singularia sunt *Saccus gularis* ingens pro aqua, et *Ventriculus* reliquarum granivorarum abfimilis.

179. Otis *Tetrax* mandibulis imberbibus, collo maris nigro torque albo.

O. *Tetrax* capite juguloque laevi. L. S. N. XII. T. I. p. 264. Fn. Su. 196.

O. *Tetrax* nigro-rufo-alboque variegata subtus alba, capite juguloque laevi. Lath. Ind. 2. p. 659.

Otis *Anas Campestris* vulgo dicta. Briff. Orn. 2. p. 218.

The French *cannepetiere*. Will. Orn. p. 179.

Lesser *Bustard*. Penn. Britt. Zool. 1. p. 286. Arct. Zool. 2. p. 321.

The Little *Bustard*. Edw. Av. 5. t. 251. foemina.

Peùte *Ouarde* ou *Cannepetiere*. Buff. Av. 2. p. 40.

Habitat in Suecia rarius tempore vernali.

Magnitudo Tetr. Tetricis. *Rostrum* Gallinae. *Caput* ex nigro et ferrugineo maculatum. *Collum* maris nigrum

grum torque albo duplici dimidiato subopposito. *Corpus* supra ex ferrugineo et nigro striatum. *Remiges primores* basi albi, praeterea nigri, 7 — 10 fascia nigra infra apicem, 11 — 22 albi punctis aliquot linearibus nigris, 23 — 28 dorso concolores. *Rectrices* 18, quarum intermediae ex ferrugineo et nigro fasciatae, reliquae albae (PENNANT) omnes fasciatae (BRISSON) fasciis duabus linearibus nigris in tres areas aequales divisae, reliquae duae albae lineis undulatis nigris LAMK'. *Corpus* subtus album.

Collum foeminae dorso concolor.

P A V O.

Caput pennis revolutis tectum.

Pennae uropygii elongatae ocellatae.

180. PAVO *crissatus* capite crista compressa, calcaribus solitariis. L. S. N. XII. T. I. p. 267. Fn. Su. 197. Lath. Ind. 2. p. 616.

Pavo. Briff. Orn. I. p. 79.

Peacock. Will. Orn. p. 158.

Paon. Buff. Av. 2. p. 288. t. 10.

P. Pavo *albus*. Briff. Orn. 1. p. 81.

Paon *blanc*. Buff. Av. 2. p. 323.

Sueci Pifogel.

Hospitatur cultus in variis locis, olim vulgarior.

M E L E A G R I S.

Caput carunculis spongiosis tectum.

Gula caruncula membranacea longitudinali.

181. MELEAGRIS *Gallopavo* capite caruncula frontali gularique, maris pectore barbato. L. S. N. XII. T. I. p. 268. Fn. Su. 198. Lath. Ind. 2. p. 618.

Gallo-

- Gallo - Pato.* Briss. Orn. 1. p. 41.
Turkey. Will. Orn. p. 159. Penn. Arct. Zool. 2. p. 291.
Dindon. Buff. Av. 2. p. 132. t. 3.
 Suecis Kalkon.
 Hospitatur ubique cultus.

PHASIANUS.

- Genae cutē nuda laevigata.*
182. PHASIANUS *Gallus caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente.* L. S. N. XII. T. I. p. 270. pennis colli linearibus elongatis apicē membranaceo. Lath. Ind. 2. p. 625.
Ph. Gallus cauda compressa adscendente. Fn. Su. 199.
Gallus Domesticus. Gallina Domestica. Briss. Orn. 1. p. 45.
Dunghill Cock and Hen. Will. Orn. p. 154.
Cog Commun. Buff. Av. 2. p. 63. t. 2.
 Suecis Höns. Mat. Tupp. Scanis Tocke, Hans. Foemina Höna.
8. *Gallus cristatus.* Briss. Orn. 1. p. 45.
 Suecis Toffshöns, Topphöns.
7. *Gallus pentadactylus.* Briss. l. c. p. 46.
 Suecis Dubbla Sporrhöns, Tycka Höns.
2. *Gallus patavinus.* Briss. l. c. p. 46.
 Suecis Spanska Höns.
6. *Gallus Anglicus.* Briss. l. c.
 Suecis Engelska Höns.
3. *Gallus Puvilio.* Briss. l. c.
 Suecis Dwärghöns.
9. *Gallus plumipes.* Briss. l. c. p. 47.
 Suecis Fjösvente Höns.

3. *Gallus erippus.* Briss. l. c.
 Suecis Krullhöns.
1. *Gallus Persicus.* Briss. l. c. p. 43.
 Suecis Gumphöns.
 Hospitatur ubique cultus.

TETRAO.

- Macula prope oculos nuda papillosa.*
183. TETRAO *Urogallus pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis.* L. S. N. XII. T. I. p. 273. Fn. Su. 200.
T. Urogallus fulco - rufus; capite colloque cinereis, gula abdomineque nigris, axillis albis. Lath. Ind. 2. p. 634.
Urogallus major. Briss. Orn. 1. p. 51.
Cock of the Mountain or Wood. Will. Orn. p. 172.
Wood Grouse. Penn. Britt. Zool. 1. p. 262. t. 40. 41. p. 312. Arct. Zool. 2.
Tetrao ou Grand Cog de Bruyere. Buff. Av. 2. p. 191. t. 5.
 Suecis Tiäder - tupp - höns. Smolandis Fjäderhanehöns.
- Habitat in sylvis caespitosis paludum inter arbores acerosas Pini et Abietis.
- Rostrum albo-coeruleoescens. Caput nigrum, pennis sub gula in brevis barbae modum laxatis. Palpebra inferior plumis albis brevibus ramosis raris aspersa, superior similis, sed rubens, utraque margine sanguinea. Supra superiorem fasciis sanguinea papillosa. Colli pennae laxae nigrae ex fasciis plurimis tenuibus albidis griseae. Pectus atrum aeneo-nitens. Abdomen atrum maculis sparsis candidis irregularibus. Latera collo similis, etiam Dorsum, at fulco parum contaminatum. Alae subtus albae,*

albae, supra fuscae nigro tenuissime undulatae, ad basin alulae albae. *Remiges* subfusco-fuliginosi, *primores* 10, 1 unicolor, 2 fere, 3 — 7 margine exteriori albidis; *secundarii* 21, nigrescentes, exteriori latere fusco-undulato, apicis margine albicante, *uropygium* dorso concolor. *Rectrices* nigrae subinde albo-maculatae, omnes truncatae, 2 spuriae breviores tenuissime undulatae, apicis margine albo. *Criſsum* et *Femora* albo nigroque varia. *Pennae* femorum ad apices radiis longis setosis. *Tibiae* fusco-plumatae ad digitos usque. *Digiti* similes *Tetricis*, unguibus nigris.

1831. **TETRAO** *Tetrix* pedibus hirsutis, cauda bifurca, remigibus secundariis versus basin albis. L. S. N. XII. T. I. p. 274. Fn. Su. 202.

T. *Tetrix* nigro-violacea, cauda bifurca, remigibus secundariis versus basin albis. Lath. Ind. 2. p. 635.

Urogallus minor. Brisſ. Orn. 1. p. 52.

Heathcock, *Blackgame or Grouse*, Will. Orn. p. 173.

Blackcock. Penn. Britt. Zool. 1. p. 266. t. 42.

Black Grouse. Penn. Arct. Zool. 2. p. 314.

Petit *Tetras ou Coq de Bruyere à queue fourchue*. Buff. Av. 2. p. 210. t. 6.

Suécis, Orre, Orrtupp-höna.

β. T. *Tetrix* femina, varietas sordide alba ac obsoleta ferrugineo-undulata, rostro nigro, pedibus ferrugineis. Mus. Carſſ. 3. t. 66. Blom: N. Act. R. Ac. Suec. 1785. p. 230.

γ. T. hybridus cauda bifurca subtus albo-punctata. Fn. Su. 201. Mus. Carſſ. 1. t. 15. Act. R. Ac. Suec. 1744. p. 181.

Spurious Grouse. Penn. Arct. Zool. 2. p. 314. Suppl. p. 62.

Suécis Rackelhane. Roslagis Roslare.

δ. T.

2. T. *Eriopus* cauda bifurca, corpore albo-nigroque variegato, tibiis digitisque albo-lanatis.

T. *Tetrix* mas varietas corpore nigro alboque variegato, macula pectorali maxima atro-nitenti. Mus. Carſſ. 3. t. 63.

Habitat = ubique in sylvis praesertim acerosis, β. prope Hedemora, γ. in sylvis Sueciae et Finlandiae passim patre *Tetrice*, matre *Urogallo*, δ. in Norrlandia observata, forte hybrida proles patre *Tetrice* et matre *Lagopode*.

Mas, Niger, sed *Collum* et *Dorsum* obscure coeruleo nitore splendentia. *Nares* pennae minutis obiectae, *Remiges* nigri, sed *secundarii* a basi ad medium et apicibus albi. *Pennae*, *Alulae* et *Tectrices* primorum etiam basi albae. In flexura inter brachium et cubitum macula alba. *Tectrices* inferiores alarum albae. *Uropygium* album. *Femora* et *Tibiae* pennae cineris vel cinereo-fulcis usque ad digitos vestitae. *Digiti* impennes marginati et utrinque ciliati. *Cauda* rectricibus 16 nigris, tribus exterioribus utrinque extorsum curvatis ut et 4 et 5 sensim brevioribus, reliquis aequalibus.

Femina minor. *Macula* coccinea superciliaris minus conspicua. *Caput* et *Collum* ex ferrugineo et nigro maculata, *Dorsum* etiam, sed magis saturate. *Pectus* fusco-nigro et albo-maculatum. *Cauda* dorso concolor laeviter forficata, rectricibus 13. *Uropygium* album. *Remiges* latere interiore albo-maculati, tetricibus penultimis albis. *Pedes* maris.

γ. *Cauda* vix bifurca, sed *rectrices* extimae apicibus tantum recurvatae. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Pectus* qualia in α, at *tectrices* alae fuliginoso-fuscae albo-punctatae, et *uropygium* album maculis nigris. *Macula* humeralis alba ut in *Tetrice*. *Tibiae* pennatae, at *digiti* nudi.

Q

δ. Gula,

2. *Gula, Pectorale, Caudoque* (magis quam in *y. bifurca*) nigra. *Dorsum, Uropygium, Alarum tectrices* nigra, marginibus pennarum albis. Reliqua alba irregulariter nigro-maculata. *Tibiae et Digiti* usque ad unguis plumis vestiti. Ceterum similis *Tetrici mari*.

185. *TETRAO cachinnans* tibiis pennatis, digitis squamatis nudis, rectricibus XIV omnibus nigris, linea superciliari coccinea membrana concolore tecta.

T. Lagopus pedibus nudis squamatis calcaratis, tibiis pennatis, linea superciliari coccinea linea concolore tecta. *Montin. Phyl. Sällsk. Handl. 1. p. 155.*

T. Lapponicus dorso nigro ferrugineo-vario, collo ferrugineo nigro-maculato, pectore crissoque albis. *Lath. Ind. 2. p. 640.*

Rehusak. Penn. Arct. Zool. 2. p. 316.

Rieusak. Leems Lappl. p. 245.

Show Rype. Pontopp. Norg. Nat. Hist. 2. p. 149.

Suecis Snöripa, Skogs Ripa. Lapponibus Rehusak.

Habitat in borealibus Suecise provinciis et Lapponia, alpestris et sylvatica loca frequentans. Terrofacta avolans cachinnos edit. Ova 13 — 14 rufo-maculata.

Magnitudo minoris Gallinae. *Vertex* capitis elevatus. *Rostrum* nigrescens, convexum, compressiusculum, fere conicum: *mandibula superior* apice deflexo obtuso, *inferior* ad basin tetragona. *Nares* oblongae, tectae plumulis fetaceis nigris ferrugineisque. *Oculi* solito altius locati, nigri. *Palpebrae* albae, superiores macula oblonga coccinea, membrana ejusdem coloris tecta. *Capitis latera* obscurius ferruginea, *gula* obscuriore. *Vertex* niger maculis ferrugineis. *Collam* ferrugineam maculis transversis nigris, in *cervice* angustioribus, latioribus

ribus in jugulo. *Collum* a pectore distinguitur fascia transversa saturatiore, sub qua *Pectus* ad dimidium sterni collo concolor maculis nonnullis albis, dein una cum abdomine album. *Cristam* album maculis flavis. *Dorsum* nigrum ferrugineo-friatum apicibus quarundam pennarum albidis. *Alae* dorso concolores margine et subtus albae. *Remiges* albi 1 — 5 medio latiores, obtusi, 6 — 19 nonnihil breviores, dimidio latiores, aequales. *Tectrices* albae. *Scapulares* variegatae. *Cauda* alis multo longior, pedibus tamen brevior. *Rectrices* 14, 1. 1. — 6. 6. aequales, truncatae, nigrae, basi albae apicibus pallidis, *spinae* quatuor legitimis incumbentes breviores dorso concolores. *Femora* alba pallide ferrugineo-maculata. *Tibiae* pennis lordide albis tectae. *Pedes* tetradactyli, *digiti* basi membranula connexis, cinerei, nudi, squamis tecti. *Ungues* rectiusculi, subtrigoni, obtusi, cinerei. *MONTIN.* *Hycme* alba praeter rectrices.

186. *TETRAO Lagopus* tibiis digitisque lanatis, rectricibus XVI, intermediis duabus albis, superciliorum membrana nulla.

T. Lagopus cinereo-alboque varius, pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus maris apice albis, intermediis albis. *Lath. Ind. 2. p. 639.*

T. mutus pedibus tibiisque lanatis, linea superciliari coccinea nuda, cauda simplici truncata. *Montin. Phyl. Sällsk. Handl. 1. p. 155.*

Lagopus. *Roberg. Diff. Monogr. p. 21.*

Field Rype. Pontopp. Norg. Nat. H. 2. p. 149.

Giron. Leems Lappl. p. 245.

Suecis Ripa. Fiäll Ripa. Lapponibus Keron.

Habitat in folis alpiibus Lapponicis, nec in sylvestria loca descendit. Ova 9 ad summum 10 punctis

ctis nigris irrorata, serius quam praecedens. Nul-
lum sonum e terra se extollens edit.

Perdix vix major. Caput forma et colore prio-
ris, sed minus elevato vertice. Rostrum nigrum co-
nico-subtriangulum, breve, mandibula superiore magis
acuta, inferiore tetragona. Nares ovatae, antice subacutae
patulae, pollice plumis setaceis nigris aliisque tectae.
Oculi praecedentis situ et colore. Palpebrae albae, su-
perciliis coccineis, sed membrana supera nulla. Gula
rufa maculis obscure cinereis. Collum cinereo-nigre-
scentis striis pallide ferrugineis aliisque. Pectus superne
pallide ferrugineum vel testaceum maculis transversis ci-
nereo-nigricantibus aliisque vagis albis, inferius et Ab-
domen alba. Dorsum collo concolor maculis albis satu-
ratis ferrugineis aliisque testaceis. Alae supra dorso
similes, margine et subtus albae. Remiges albi 1 — 5
medio angustiores, 6 — 20. duplo fere breviores, at du-
plo latiores, apicibus rotundatis. Tectrices albae. Scu-
pulares 5 secundariis longiores dorso concolores. Cauda
dorsi longitudine dimidia, simplex. Rectrices XVI. aequa-
les, truncatae, 1. 1. — 7. 7. a basi ad tertiam partem
utrinque albae, dehinc nigrescentes margine extimo ex-
albido β . β . omnino albae, spuriae quatuor, quarum inter-
mediae longitudine legitimarum, exteriores breviores,
cinereo-nigrescentes striis obliquis parallelis ferrugineis.
Femora extus pennae longis pectore concoloribus, intus
plumis pilosis sordide albis. Tibiae et Digiti proprio
lanati seu plumis pilosis, minime pennae tecti. Ungues
ovati, obtusi, supra convexi, plumbei, subtus cavi
albi, versus apicem parum deflexi. MONTIS.

Obs. Donec Auctorum Lagopodes cum datis de-
scriptionibus comparentur Syonymia incerta. Utram-
que nostram avem sub specie Tetraonis Lagopodi com-
prehendit Gen. a Linné, neutra vero mihi videtur ge-
nuina

nuina Auctorum Lagopus. Num Tetrao Lagopuside la
Peyroule Act. Tolos. Vol. 1. sit Lagopus Fabricii Fu.
Groenl. 30 et Ptarmigan Penn. Britt. Zool. 1. p. 271.
nescio, quam dictus Liber ad manus non sit, hanc vero
avem ab utraque nostra diversam esse certum videbitur
descriptiones conferenti. Quantum ex descriptionibus
minus perfectis auctorum concludere potui, genuina La-
gopus et tibiis et digitis vestitis (an vero plumis vel pen-
nis) et macula nigra a rostro ad oculos, rectricibus XII
nigris apice albis ac duabus intermediis nigricantibus
cinereo-punctatis distinguitur. The white Partridge
Edw. Av. 2. t. 72 certe a nostris aliena; at si hanc ex
Norwegia acceperit Nob. PERRANT, tertia adhuc spe-
cies in Lapponia occurrit.

Omnes tres hyeme albescunt et pennae corporis
duplicatis eo tempore vestiantur.

187. TETRAO Bonasia tibiis hirsutis, rectricibus cine-
reis punctis nigris fasciaque nigra, exceptis inter-
mediis duabus, L. S. N. XII. T. I. p. 275. Fu. Su.
204.

T. Bonasia rufescens fusco-maculatus, rectricibus ci-
nereis punctis nigris fasciaque nigra, exceptis in-
termediis duabus. Lath. Ind. 2. p. 640.

Bonasia. Briss. Orn. 1. p. 53.

Hazelhen. Will. Orn. p. 175.

Hazelgrouse. Penn. Aret. Zool. 2. p. 517.

Gelinotte. Buff. Av. 2. p. 233. t. 7.

β . T. canus, corpore cano, fusco-undulato, rostro pe-
dibusque nigris. Mus. Carlsf. 1. t. 16. Lath. Ind. 2.
p. 640.

Succis Hjarps.

Habitat

Habitat inter Betulas praecipue, cujus amentis victitat, in borealibus imprimis Sueciae provinciis vulgaris, e Scania exulat.

Mas. Caput et Collum cinerea lineolis transversis fuscis, Gula nigra, Sub hac Jugulum albidum. Sub oculis versus aures a rostro macula oblonga alba. Supra aures alia macula alba ad finem superciliis coccinei. Nares plumis omnino tectae. Alae supra ferrugineae maculis nigris. Remiges 21. Dorsum cinereum punctis nigris. Abdomen album maculis magnis cordatis fusco-ferrugineis. Rectrices 16 longitudine pedum, quarum 1. 1. — 7. 7. cinereae nigro-punctatae, et versus apicem fascia lata nigra, apicibus albis, 8. 8. absque macula et fascia. Pedes ad digitos usque vestiti. Digni nudi marginibus ciliatis.

Foeminae tempora albicant. Gula minime nigra. Dorsum canum maculis longitudinalibus nigris, ceterum a capite cinereum lineolis transversis fuscis. Alae supra versus basin ferrugineo-et nigro-maculatae. Remiges primores cinerei 10, quorum 1 — 7. margine anteriore grisei; secundarii 10 cinerei a latere anteriore maculis dilute ferrugineis aspersi, at 8. 9. 10 immaculati. Rectrices 16 cinereo-nigro-maculatae; transversum versus apicem has omnes fascia nigra ambit, exceptis duabus intermediis.

Ni multum fallor *T. canus* mera est varietas *Bonasiae* licet singularis.

Tibiae in *Bonasia Gallorum*, Italicorum tantum ad dimidias antice plumosae, an alia species vel pro climate solum differunt?

180. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. L. S. N. XII. T. I. p. 276. Fa. Su. 205.

Perdix

Perdix cinerea calcarata, cinereo, rufo et nigro varia, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. Lath. Ind. 2. p. 645.

Perdix cinerea. Briss. Orn. 1. p. 61.

The common Partridge. Will. Orn. p. 166.

Partridge. Penn. Britt. Zool. 1. p. 274. Arct. Zool. 2. p. 319.

Perdix grisea. Buff. Av. 2. p. 401.

Saecis Rapphöns. Scania Åkerhöns.

Habitat in agris, praesertim Scania.

Caput supra griseum punctis oblongis albidis aspersum. Gula, Superciliarum regio et Facies rufescentia. Nares squama tectae. Macula sanguinea sub palpebra inferiore pone oculum ducta papillosa. Pectus cinereum lineolis tenuissimis undulatum in mare macula fulvo-brunnea sublineata notatum. Dorsum griseum maculis linearibus undulatis brunneis. Abdomen et Femora albidia. Alarum tectrices griseae maculis fusco-brunneis, rachi alba. Remiges 22. cinereo-nigri fasciis pallidis. Rectrices 18 ferrugineae. Pedes flavescentes. Mas calcaratus, foemina mutica.

189. TETRAO *Coturnix* pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. L. S. N. XII. T. I. p. 278. Fa. Su. 206.

Perdix Coturnix mutica, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. Lath. Ind. 2. p. 651.

Coturnix. Briss. Orn. 1. p. 69.

Quail. Will. Orn. p. 169. Penn. Britt. Zool. 1. p. 276. Arct. Zool. 2. p. 320.

La Caille. Buff. Av. 2. p. 449. t. 16.

Saecis

Suecic Wachtel.

Habitat in arvis.

Caput supra nigrum, linea a rostro ad nuquam pallida medio divisum, alia linea pallida supra utrumque oculum. Palpebrae maris rubentes. Area lata, longa, nigricans sub mandibula inferiore. Collum et Pectus pallide testacea maculis obtusa in singula penna utrinque solitariis. Abdomen albidum. Corpus supra tegitur pennis rachi linea flava notatis apice testaceis nigropunctatis. Remiges 18 exteriores fusci, interiores pallidiores a latere exteriori maculis dilute testaceis. Rectrices 12 breves fuscae rachi alba, ferrugineo-fasciatae. Pedes pallidi, nudi, digitis membrana basi connexis. Femina sub collo nullis maculis nigris gaudet.

6. P A S S E R E S.

C O L U M B A.

Rostrum rectum versus apicem descendens.

Nares oblongae, membrana molli tumida semitectae.

Lingua integra.

190. *COLUMBA Oenas* coerulescens, cervico viridi nitente, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante. L. S. N. XII. T. I. p. 279. Fa. Su. 207. Lath. Ind. 2. p. 539.

Oenas sive Vinago. Brill. Orn. 1. p. 20.

Swick Dove or Wood Pigeon. Will. Orn. p. 185. Penn. Britt. Zool. 2. Addit. Arct. Zool. 2. p. 329.

Rock Pigeon. Penn. Britt. Zool. 1. t. 45.

Suecic Skogs Dufwa, Wild Dufwa.

Habitat in sylvis, agros frequentans.

Rostrum

Rostrum carneum. Caput, Collum, Dorsum cinereo-caus, at latera colli et subinde Cervix viridi colore vario pulcherrime splendentia. Pectus purpurascens. Abdomen cinereum. Uropygium albidum. Remiges primores 1-4 nigricantes margine exteriori albi, reliqui cinerei. Tectrices alarum cinerae, apicibus nigris. Rectrices cinerae apicibus nigrae, at 1. 1. extus dimidiato-albae.

Hujus varietates domesticae

a. *Columba domestica*. Lath. Ind. 2. p. 539. Brill. Orn. 1. p. 15.

Pigeon commun. Buff. Av. 2. p. 501.

b. *Columba Livia* cinereo-coerulescens, fascia alarum duplici nigra, dorso inferiore albo. Lath. l. cit. Brill. l. cit.

Biset. Buff. l. c. p. 498.

γ. *Columba gutturosa* pectore inflato. L. S. N. XII. T. I. p. 280. Brill. l. c. p. 16. Lath. l. cit. p. 595.

Croppers. Will. Orn. p. 181.

Le Pigeon grosse-gorge. Buff. l. cit. p. 505. t. 17. 18.

Suecic Kroppdufwa, Kroppert.

δ. *Columba dasypus* pedibus hirsuto-pennatis. L. S. N. l. cit. p. 279. Brill. l. c. p. 14. Lath. l. c. p. 590.

Roughfooted Pigeon. Will. l. c.

Scanis Fiösbent Dufwa.

e. *Columba cucullata* pennis occipitis rostrato erectis. L. S. N. l. c. p. 280. Brill. 1. p. 15. Lath. l. c. 591.

Jacobines. Will. Orn. p. 181.

Pigeon nuanin. Buff. l. c. p. . . . t. 19.

Suecic Jacobin.

ζ. *Columba turbita* pennis in pectore recurvatis. L. S. N. l. c. p. 250. Lath. l. c. p. 592. Brill. Orn. 1. p. 15.

Turbits

- Turbitt*, Will. Orn. p. 182.
Le Pigeon Cravate, Buff. Av. l. c. p. 515. t. 23.
Scauis Messicks.
2. *Columba crista* pluinis minimis erectis per dorsum alasque dispersis. L. S. N. l. c. p. 280. (*hispida*)
 Lath. Ind. l. c. p. 591.
Pigeon frisé, Buff. Av. l. c. p. 519.
Succis, Krull Dufwa.
3. *Columba gyraux* sub volatu se gyraux. L. S. N. l. c. p. 280. Lath. l. c. p. 592. Brill. Av. 1. p. 17.
Tumblers, Will. Orn. p. 189.
Pigeon culbutant, Buff. Av. l. c. p. 517.
Scauis Tummelett.
4. *Columba laticauda* cauda erecta multipenni patula.
 L. S. N. l. c. p. 280. Lath. l. c. p. 592. Brill. Orn. 1. p. 18.
Broadtailed Shakers, Will. Orn. p. 181.
Pigeon-paon, Buff. Av. l. c. p. 512. t. 22.
Succis Krumhsjert.
5. *Columba frontalis* corpore albo, macula frontis caudaque concolore. Lath. l. c. p. 594.
Spot Pigeon, Will. Orn. p. 182.
Succis Kalott.
6. *Columba galeata* capite, remigibus reatricibusque concoloribus a corpore diversicoloribus. L. S. N. l. c. p. 280. Lath. l. c. p. 592. Brill. Orn. 1. p. 18.
Helmets, Will. Orn. p. 182.
Pigeon cuirasse, Buff. Av. 2. p. 515.
7. *Columba percussor* sub volatu se gyraux et alas fortiter percussans. Lath. l. c. p. 593. Brill. Orn. 1. p. 17.
Smiter Pigeon, Will. Orn. p. 182.
Succis Slag Dufwa.

8. *Columba hispanica* cera albido-furfuracea. L. S. N. l. c. p. 279. Lath. l. c. p. 590.
Columba romana, Brill. Orn. 1. p. 15.
Roman Pigeon, Will. Orn. p. 181.
Pigeon Romain, Buff. l. c. p. 510.
Spanka Dufwa, it. Westrog. p. 8.
 et quae sunt plures hinc inde observandae.
191. COLUMBA *Palumbus* reatricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utrinque albo. L. S. N. XII. T. I. p. 282. Fn. Su. 203. Lath. Ind. 2. p. 601.
Palumbus, Brill. Orn. 1. p. 20.
Ringdove, Will. Orn. p. 185. Penn. Britt. Zool. 1. p. 296. Arct. Zool. 2. p. 329.
Le Ramier, Buff. Av. 2. p. 539. t. 24.
Succis Ring Dufwa. *Scauis* Ringel Dufwa. *Oelandis* Sjutut.
- Habitat in sylvis.
- Rostrum apice flavescens. Caput cinereo-coeruleum. Colli latera a tergo viridi-aureo-nitida macula sublunata albida. Pectus pallide rubrum ex cinereo resplendens. Abdomen albidum. Dorsum canum. Alae cinereo-fuscae, macula transversa alba. Remiges nigrescentes, primores margine exteriori albidis. Rectrices aequales; extrorsum atrae, versus basin fuscae, in medio pallidiores. Pedes rubri.
192. COLUMBA *riforia* supra lutescens, lunula cervicali nigra. L. S. N. XII. T. I. p. 285. Lath. Ind. 2. p. 607.
Turtur torquatus, Brill. Orn. 1. p. 25.
The Indian Turtle of Aldrowand, Will. Orn. p. 184.

La Tourterelle à collier. Buff. Av. 2. p. 550. t. 26.
Suecis Turturudufwa.

Hospitatur hinc inde in domibus.

Rostrum nigricans. *Irides* rubrae. *Supra* ex albido sordide lutescens *collari* nigro dimidio, *subtus* albidum corpus. *Remiges* fulvescentes. *Rectrices* cinereae. *Pedes* rubri.

ALAUDA.

Rostrum cylindrico-subulatum, recta protensum, mandibulis aequalibus basi dorsum dehiscentibus.

Lingua bifida.

Unguis posticus rectior, digito longior.

195. *ALAUDA arvensis* reatricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis. L. S. N. XII. T. I. p. 287. Fn. Su. 209.

A. arvensis nigricante, griseo-rufescente et albido-varia, *subtus* rufo-alba, reatricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis. Lath. Ind. 1. p. 491.

Alauda. Briss. Orn. 1. p. 404.

The common Skie Lark. Will. Orn. p. 203.

Skye Lark. Penn. Britt. Zool. 1. p. 353. t. 55. Arct. Zool. 2. p. 394.

L'Alouette. Buff. Av. 5. p. 1. t. 1.

Suecis Larka, Åbselarka, Sånglarka.

Habitat in arvis, copiosissime in Scania campestri.

Rostrum tenue, convexum, maxillis subaequalibus non emarginatis. *Lingua* obtusa apice membranaceo acute bifido. *Corpus* totum fulco-testaceum, pennis fulcis

fulcis margine extimo pallide testaceo. *Abdomen* albicans. *Remiges* 16 fulci, quorum 3 exteriores subaequales, *primores* integri, *secundarii* emarginati, apicibus obsolete albicantibus, *Cauda* bifurca. *Rectrices* 12 fuscae, at 1. 1. alba margine interiore fusco, 2. 2. margine exteriori longitudinaliter albae. *Unguis* posticus digitum intermedium longitudine superat, rectus; laterales unguis inflexi: intermedius longus.

194. *ALAUDA pratensis* reatricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliarum alba. L. S. N. XII. T. I. p. 287. Fn. Su. 210.

A. pratensis viridi-fusca, reatricibus duabus extrorsum albis, linea superciliari albo. Lath. Ind. 1. p. 495.

A. pratensis. Briss. Orn. 1. p. 406.

Tit-Lark. Will. Orn. p. 206. Penn. Britt. Zool. 1. p. 357. Arct. Zool. 2. p. 395.

La Farlouse. Buff. Av. 5. p. 31. t. 5.

Suecis Anglärka.

Habitat in pratis, arboribus etiam insidet.

Rostrum pallidum. *Caput*, *Dorsum*, *Tectrices* alarum, *Pectus* scolopacina l. griseo-fusco-maculata. *Venter* albicat. *Lineola* albida supra oculos. *Remiges* fulci. *Rectrices* aequales, nigricantes, exceptis duabus extimis utrinque margine exteriori longitudinaliter albis. *Pedes* pallidi l. sordide luteoli. *Unguis* posticus longus.

195. *ALAUDA arborea* capite vitta annulari alba cincto. L. S. N. XII. T. I. p. 287. Fn. Su. 211. Lath. Ind. 1. p. 492.

A. arborea. Briss. Orn. 1. p. 405.

Wood Lark. Will. Orn. p. 204. Penn. Britt. Zool. 1. p. 356. Arct. Zool. 2. p. 395.

Le Coqulier. Buff. Av. 5. p. 25.

Sueci Trädlärika, Skogslärika.

Habitat in arboribus. Volat gregatim cantando.

Rostrum supra nigrum. *Caput* annulo albo fere cinctum. *Collum* subtus flavescens maculis fuscis. *Tota avis supra* grisea fusco-maculata. *Pectus* subrufescens. *Abdomen* albicans. *Remiges* fusci. *Rectrices* breves, fusci, at 1. 1. dimidiato-albicanes, sed oblique et apex totus albus, quae albedo angustior versus marginem anteriorem, 2. 2. 3. 3. 4. 4. apice macula alba cuneiformi. *Unguis* digito longior.

196. *ALAUDA campestris* rectricibus fuscis: inferiore medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescens. L. S. N. XII. T. I. p. 288. Fb. Su. 212. Lath. Ind. 1. p. 495.

A. campestris. Brill. Orn. 1. p. 408.

The Lesser Field Lark. Will. Orn. p. 207.

Field Lark. Penn. Britt. Zool. 1. p. 358. Arct. Zool. 2. p. 395.

La Spiulette. Buff. Av. 5. p. 45.

Sueci Fäldlärika.

Habitat in campis.

Magnitudo et facies Fringillae Spini. *Rostrum* nigrum mandibula inferiore rubedine tincta. *Linea* flavescens supra oculos versus occiput a rostro ducta. *Caput*, *Dorsum* grisea maculis nigris vel fuscis more scolopacino. *Uropygium* viridescens. *Gula* et *Pectus* flavescunt maculis nigris. *Abdomen* albicans. *Alarum* tectrices nigro-fuscae albo-marginatae. *Remiges* fusci, 1. albo-marginato, reliqui margine exteriori subviridi. *Rectrices* aequales, fuscae, a basi ad medium omnes albae, exceptis duabus intermediis. *Pedes* pallide fusci. *Unguis* pollicis intermedio paulo longior, at brevior quam in congeneribus.

197. *ALAUDA trivialis* rectricibus fuscis: extima dimidiato-alba, secunda apice cuneiformi-alba, linea alarum duplici alba. L. S. N. XII. T. I. p. 288.

A. trivialis nigricante et olivaceo varia, subtus albo-flavicans maculis nigricantibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice alba. Lath. Ind. 2. p. 495.

A. sepiaria. Brill. Orn. 1. p. 407.

Tit Lark that sings like a Grasshopper. Will. Orn. p. 207.

Grasshopper. Penn. Britt. Zool. 1. p. 582. Arct. Zool. 2. p. 419.

Alouette Pipi. Buff. Av. 5. p. 39. t. 4.

Sueci Piplärika.

Habitat in campis sepibusque. Vox Locustiae, etiam nocte audienda.

Rostrum tenue nigricans. *Caput* et *tota Avis supra* fusco-olivacea maculis nigris, *subtus* sordide flavescens nigro-maculata. *Remiges* fusci, secundarii emarginati. *Cauda* subcuneata. *Rectrices* acutae, fuscae, extima dimidiato-alba, secunda macula apicis cuneiformi. *Pedes* sordide albescens, *ungue* pollicis magis quam in congeneribus brevi et curvo.

Alaudam pratensem hujus marem annosum putat BECHSTEIN *Vög. Deutschl.* 3. p. 154 etc.

198. *ALAUDA cristata* rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato. L. S. N. XII. T. I. p. 288. Lath. Ind. 1. p. 499.

A. cristata. Brill. Orn. 1. p. 410.

The crest'd Lark. Will. Orn. p. 208.

Cochevi ou grosse Alouette huppé. Buff. Av. 5. p. 63.

Scania Topplärika.

Habitat in campis Scaniae, egregie cantillans, terrae plerumque insidens.

Rostrum

Rostrum nigrescens, mandibula inferiore pallida. *Supra* testacea maculis fulcis, *subtus* sordide alba, nigro-maculata in jugulo et pectore. *Pennae pilei* nigricantes in cristam semipollicarem erigendae. *Supercilia* pallida. *Remiges* fuscescentes. *Cauda* subaequalis rectricibus 1. 1. 4. 4. nigris, 5. 5. 6. 6. griseis, at extimae duae margine exteriori albo. *Pedes* cinerei, ungue postico quam medio longiore.

S T U R N U S.

Rostrum subulatum, angulato-depressum obtusiusculum, mandibula superiore integerrima, marginibus patentiusculis.

Nares supra marginatae,

Lingua emarginata acuta.

299. *Sturnus vulgaris* rostro flavescente, corpore nigro punctis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 290. Fn. Su. 215. Lath. Ind. 1. p. 321.

Sturnus, Brill. Orn. 1. p. 280.

Stare or *Starling*. Will. Orn. p. 196.

Stare. Penn. Britt. Zool. 1. p. 299. t. 46. Arct. Zool. 2. p. 551.

Etourneau. Buff. Av. 3. p. 176. t. 15.

Sueci *Stare*.

Habitat in cavis arborum, turribus, sub tectis etc. ubi nidificat. Volitat gregatim. Accedit post mediam aestatem in Scaniam campestrem. Victitat lumbricis, insectis, larvis. Hortis utilis. It. Scan. 63.

Rostrum flavum, in junioribus nigrescens. *Nares* squamula vel margine superiore dilatato semitectae. *Corpus* nigrum ex coeruleo-viridi-cupreo resplendens, penarum apicibus macula parva albida; in aliis ad flavedinem

vedinem in aliis ad rubedinem vergente. *Remiges* nigricantes, margine exteriori obsolete testaceo. *Cauda* integra, rectricibus nigris margine exteriori subgriseo. *Tectrices* caudae inferiores nigrae margine albo. *Pedes* rufescentes ungue postico majore.

Videtur affinis *Picaram* ordini.

200. *Sturnus Cinclus niger* pectore albo. L. S. N. XII. T. I. p. 290. Fn. Su. 214.

Turdus Cinclus fulco-nigricans, genis, gutture, collo inferiore et pectore niveis, ventre supremo fulco-rufescente, imo rectricibusque nigricantibus. Lath. Ind. 1. p. 345.

Macula aquatica. Brill. Orn. 1. p. 275.

Water Ouzel or *Water Cuck*. Will. Orn. p. 149. Penn. Britt. Zool. 1. p. 512. Arct. Zool. 2. p. 332.

Merle d'eau. Buff. Av. 3. p. 154. t. 11.

Sueci *Wattnsfare*, *Strömsfare*.

Habitat apud nos per totum annum, hyeme ad voragines fluviorum et cataractas degens, ubi fluentia descendit, insectis victitans, ascenditque dexteritate summa, licet filipes. Male inter *Tringas* relata avis, nec *Sturni* neque *Turdi* generi sat bene associata. Singularis fragilitas rostri in ave mortua, an quoque in viva?

Rostrum nigrum, compressiusculum, mandibula superiore carinata. *Nares* membrana tectae. *Caput* et *Collum* fulco-nigricantia (*picca* LINNÉ' forte pro aetatis differentia). *Dorsum* pennae tegitur apicis margine nigris, supra cinereis, unde ex nigro et cinereo undulatum apparet. A rostro ad sternum nivea. *Abdomen* in adulta ave ferrugineum. *Remiges* 17 nigri, apicibus

P

sub-

subalbidis. Cauda nigra brevis, quam Motacillae inlar motitat. Crissum cinereum. Pedes nigri antice pallidiores. Genas albas nonvidimus.

TURDUS.

Rostrum tereti-cultratum, mandibula superiore apice deflexo emarginato.

Nares nudae, superne membrana semitectae.

Faux ciliata.

Lingua lacero-emarginata.

201. *Turdus viscivorus* dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente. L. S. N. XII. T. I. p. 291.

T. viscivorus supra griseo-fuscus, subtus albo-flavicans maculis nigricantibus variis, rectricibus tribus extimis albo-terminatis. Lath. Ind. 1. p. 327.

T. viscivorus alis subtus flavescens, rectricibus tribus lateralibus apice albis. Fn. Su. 216.

Turdus major. Briss. Orn. 1. p. 213.

Misselbird or *Shrike*. Will. Orn. p. 187.

Misseltrush. Penn. Britt. Zool. 1. p. 301. Arct. Zool. 2. p. 342.

La Draine. Buff. Av. 3. p. 295. t. 19. f. 1.

Succis BjörkTrakt, Dubbel Kramsfoegel.

Habitat in sylvis et fruticetis, primo vere e summitate excellarum arborum cantillans.

Ceteris Turdis indigenis major. Rostrum fuscum basi flavum. Linea albicans per oculos. Gula alba punctis fuscis. Pectus et Abdomen flavicantia maculis nigris: superioribus trigonis, inferioribus rotundis. Caput cinereum maculis fuscis. Dorsum et Tectrices alarum superiores fusco-olivacea, haec autem apice albescens:

scentes; ultimae fuscae albo-marginatae. Dorsum postice flavescens. Remiges fusco-nigricantes basi interiore albi. Rectrices fusco-ferruginae tribus exterioribus apicibus albis. Pedes flavi.

202. *Turdus musicus* remigibus basi inferiore ferrugineis. L. S. N. XII. T. I. p. 292. Fn. Su. 217.

T. musicus supra griseo-fuscus, subtus albo-robescens maculis nigricantibus variis, remigibus basi interiore ferrugineis. Lath. Ind. 1. p. 327.

Turdus minor. Briss. Orn. 1. p. 214.

Mavis, *Throfile* or *Song Trush*. Will. Orn. p. 188.

Throfile. Penn. Britt. Zool. 1. p. 306. Arct. Zool. 2. p. 342.

La Grive. Buff. Av. 3. p. 280.

Succis Drossel.

Habitat in Sylvis. In cavernis egregie cantillat.

Minor praecedente, cui praeterea multum similia forma, colore, moribus, at Linea flavescens a rostro ad oculos, sicut nigricans a sinu oris versus gulam utrinque. Latere capitis maculata. Pectus rubedine inquinata maculis nigris. Tectrices remigum maculis triquetris ferrugineis, subalares flavo-ferruginae.

203. *Turdus pilaris* rectricibus nigris: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. L. S. N. XII. T. I. p. 291. Fn. Su. 215. It. Gottl. 258. Brünn. Orn. hor. p. 65. n. 232. 233.

T. pilaris, fusco-rufescens, subtus nigricante variis, rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. Lath. Ind. 1. p. 330.

Turdus pilaris sive *Turdela*. Briss. Orn. 1. p. 217.

Fieldfare. Will. Orn. p. 188. Penn. Britt. Zool. 1. p. 304. Arct. Zool. 2. p. 340.

La Litorne. Buff. Av. 3. p. 301. t. 19. f. 2.

Succis Kramfogel, 'Wintertraß.' *Uplandis et Scanis* Snöskata.

Habitat in Sylvis, maximis in arboribus nidificat, edit Baccas Juniperi, Sorbi etc. Alebatur Holmia ab Oenopola, bibebat e vitro vinum cum hospitiibus, capite calveſcebat; at dein per annum caveis inclusa, nec vino pota, plumas in capite recuperabat. (*)

Rostrum mollice convexum. *Mandibula superior* vix inferiore longior, flava, apice nigro utrinque emarginato: inferior maxima parte flava. *Nares* ovatae. *Palpebrae* nudaе margine luteae. *Macula* nigricans inter rostrum et oculos. *Caput* et *Tropygi* regio cana. *Dorsum* et *tectrices* alarum fusco-ferruginea, inferiores albae. *Remiges* 17. fusci. *Pectus* a gula ad sternum subferrugineum maculis nigris, quarum gula propiores minores oblongae, inferiores latiores. *Venter* albus maculis paucis fuscis. *Cauda* bifurca. *Rectrices* nigrae, extrema margine laterali interiore versus apicem albicante. *Pedes* nigricantes.

204. *Turdus iliacus*, alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus L. S. N. XII. T. I. p. 292. Fn. Su. 219. N. Act. R. Ac. Succ. 1785. p. 49.

T.

(*) Sic etiam *Pſitacum* vidi bibere obambulantiem et carnes coctas in deliciis habentem, omni aestate praeter caput plane depulsum factum, licet de caetero bene valeret; ab hoc vero alimanti genere seclusus primum vestitum recuperabat.

T. iliacus griseo-fuscus, subtus albidus maculis fuscis, alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus. Lath. Ind. 1. p. 349.

T. iliacus. Brill. Orn. 1. p. 216.

Reducing. *Suine pipe* or *Wandthrust*. Will. Orn. p. 189.

Reducing. Penn. Britt. Zool. 1. p. 307. Arct. Zool. 2. p. 342.

Le Mauvis. Buff. Av. 3. p. 309.

Smolandis Klera. *Uplandis* Klädra. *Westmannis* Talltraß. *Scanis* Fiallstaß.

Habitat in sylvis, etiam acerolis, e quarum cacumine tempore veris egregio cantillat. Nidificat in mediis arbusculis l. sepibus. Ova 6 coeruleo-viridia maculis nigris variis.

Rostrum nigrum in medio mandibulae inferioris rufo-fuscum. *Linea* alba a rostro supra oculos, recta. *Nares* semitectae. *Tempora* et *Pectus* ferruginea. *Caput*, *Dorsum*, *Alae*, *Cauda* fusco-fuliginosa, in dorso autem singula penna striata flava notatur. *Subtus* exalbidus maculis subrotundis fuscis. *Abdomen* et *Criſsum* alba. *Remiges* fusci, apice et interiore latere obscuriores, *secundarii* macula apicum ferruginea. *Alae* subtus ferrugineae. *Rectrices* fuscae apice et interiore latere nonnihil obscuriores.

205. *Turdus roseus* subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato. L. S. N. XII. T. I. p. 294. Fn. Su. 219. N. Comment. Petrop. XV. p. 478. t. 23. f. 1. Lath. Ind. 1. p. 344.

Merula rosea. Brill. Orn. 1. p. 228.

The Rose or *Carnation coloured Ouzel*. Will. Orn. p. 194. Edw. Av. 1. t. 20.

Rosecoloured Ouzel. Penn. Britt. Zool. 2. App. p. 627. t. 5. Arct. Zool. 2. p. 344.

La

La Merle couleur de Rose. Buff. Av. 3. p. 348. t. 22.
Habitat in alpinis Lapponicis. *Allerheim.*

Rostrum pallidum, basi inferiore nigra. *Caput,*
Crista dependens et *Collum* nigro-subviolacea. *Alae*
totae nigrae. *Cauda* nigra vix manifeste bifida. *Tectrices*
caudae inferiores apice albae: *Coepus* pallide immixtum
(sanguineum *Gmelin*). *Pedes* rubri. *Foemina* minor
coloribus minus splendidis.

206. *Turdus Merula ater*, rostro palpebrisque fulvis.
L. S. N. XII. T. I. p. 295. Fn. Su. 220. Lath. Ind.
1. p. 340.

Merula. Brill. Orn. 1. p. 221.

The common Blackbird. Will. Orn. p. 190.

Blackbird. Penn. Britt. Zool. 1. p. 308. t. 47. Arct.
Zool. 2. p. 345.

La Merle. Buff. Av. 3. p. 330. t. 20.

Succir Traß, Koltraß. *Scanis Solwårta.*

Habitat in Sylvis, Nemoribus, Juniperetis, hortis ne-
glectis.

Mas nigro *Rostrum* et *Palpebrarum* marginibus luteis.
Pedes fulci. *Remiges* 17 nigri. *Lingua* ciliata. *Foemina*
fuliginosa rostro ejusdem coloris, quale etiam in pullo
mare.

207. *Turdus torquatus nigricans*, torque albo, rostro
flavescente. L. S. N. XII. T. I. p. 296. Fn. Su. 221.
Lath. Ind. 1. p. 343.

Merula torquata. Brill. Orn. 1. p. 223.

Ring Ouzel. Will. Orn. p. 194. Penn. Britt. Zool. 1.
p. 310. Arct. Zool. 2. p. 344.

Merle à plastron blanc. Buff. Av. 3. p. 340. t. 21.

♂ Tur-

♂ Turdus nigricans torque fusco, rostro flavescente. Fn.
Su. ed. 1. 186. Lath. Ind. 1. p. 343. 56. ♀

Merula montana. Brill. Orn. 1. p. 223.

Rock Ouzel or Mountain Ouzel. Will. Orn. p. 195.

Habitat in sylvis montosis, hortos etiam visitans, Cerasi
fructum devastans.

Rostrum flavescens apice nigro, in aliis nigrum. *Coepus*
fuliginosum marginibus penarum supra fusco-cinereis.
Torques pectoris albus, in aliis cinerascens, in ♀
mare juniore fusco-rufescens, in foemina saepe evanes-
cens. *Remiges* primores 8 linea alba in exteriori latere.
In juniore ave haec linea non solum in omni remige,
sed etiam in tectricibus observanda.

A M P E L I S.

Rostrum rectum, convexum mandibula supe-
riore longiore, subincurvata, utrinque
emarginata.

Lingua acuta, cartilaginea, bifida.

208. *Ampelis Garrulus* occipite cristato, remigibus se-
cundariis apice membranaceo colorato. L. S. N. XII.
T. I. p. 297. Lath. Ind. 1. p. 363.

Lanius Garrulus remigibus secundariis apice membra-
naceo colorato, cauda integra. Fn. Su. 82.

Bombycilla bohemica. Brill. Orn. 1. p. 250.

Bohemian Chatterer. Will. Orn. p. 155.

Waxen Chatterer. Penn. Britt. Zool. 1. p. 314. t. 48.

Le Jaseur. Buff. Av. 3. p. 429. t. 26.

Succis Sidenhwants. *Uplandis Snötuppa.*

Habitat in sylvis, accedit instante hyeme; aestate mi-
grat in boreales terras ibique nidificat.

Rostrum

Rostrum nigrum basi setis nigris. *Caput* rufo-ferrugineum, pennis versus nucham longioribus in cristam erigendis. *Fascia* nigra a rostro supra oculos versus occiput. *Gula* nigra, *Collum*, *Dorsum*, *Alae* ex cinerco-rubentes. *Uropygium* cinereum. *Pectus* et *Abdomen* cinerea laevi rubedine tincta. *Remiges* nigri, horum omnes praeter 1 et 17 apice colorati, ita ut 2 — 4, 10 — 16 alba macula, 5 — 9 flavescendo notentur, 17 dorso concolor, *secundariorum* 11 — 16 appendiculo membranaceo scarlatino aucti. *Tectrices* alarum nigrae, *secundariae* apice albae. *Rectrices* 12 scotiusculae, nigrae apicibus macula citrina pictae, rachi rubiginosa. *Cristum* ferrugineum. *Pedes* nigri.

L O X I A.

Rostrum conico-gibbum frontis basi rotundatum versus caput. *Mandibula* inferior margine laterali inflexa.

Nares in basi rostri.

Lingua integra.

209. *LOXIA curvirostra* rostro forficato. L. S. N. XII. T. I. p. 299. Fn. Su. 224.

L. curvirostra rostro forficato, corpore versicolore, remigibus reatricibusque fuscis, oris exterioribus viridi-olivaceis, cauda furcata. Lath. Ind. 1. p. 370.

Loxia. Briss. Orn. 1. p. 401.

Shell-Apple or *Crossbill*. Will. Orn. p. 243.

Loxia vel *Curvirostra*. Charlet. Onom. p. 68. t. 68. Exercit. p. 76. t. 77.

The Crossbill, Cock and Hen. Edw. Av. 6. t. 303.

Crossbilled Grosbeak. Penn. Britt. Zool. 1. p. 319. t. 49. Arct. Zool. 2. p. 347.

Bec croise. Buff. Av. 3. p. 449. t. 27. f. 2.

Suecis

Suecis Korsnäs, Kägelnisware. Scanis et Westrogothis Korskrare.

Habitat in sylvis abietinis, victitans strobilis abietis, ubi conus primo dejicit rostro ab arbore liberatos, quotquot unquam valet, dein singulum per se arripit, pedibus tenet, uti Psittacus vel Sciurus, rostri forcice per singulas squamas frangendo semina investigat; et quod singulare, magnitudine et colore omnino conum Abietis refert, et structura rostri ad semina hujus sola edenda creata videtur; licet et semina Cannabae, baccas Juniperi, Sorbi, nuce Coryli edere et Poma seminum gratia destruere queat. Mira fortitudo parvae Avis, utpote quae bacillum ligneum crassitie digiti brevi mora levique negotio detruat.

Rostrum in aliis ad dextrum, in aliis ad sinistrum forficatum. *Nares* parvae plumulis setosis ferrugineis tottae. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Uropygium*, *Pectus* & cinereo et rubro cum fulvo nebulosa; foeminae vero sulphurea, ubi mas rubet. *Abdomen* albicans. *Cristum* fulcomaculatum. *Alae* et *Cauda* fusco-griseae. *Rectrices* exteriores margine exteriori in mate rubent, in foemina flavescunt. *Pedes* plumbei. *Unguis* pollicis exterioribus anticis major. Singulariter causam formae rostri explicavit Burron.

210. *LOXIA Coccothraustes* linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, reatricibus latere interiore baseos nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 299. Lath. Ind. 1. p. 371.

L. Coccothraustes linea alarum simplici alba, reatricibus basi interiore albis. Fn. Su. 222.

Stenhuäck it. Scan. p. 332.

Coccothraustes. Briss. Orn. 1. p. 371.

The

- The common Grosbeak. Will. Orn. p. 244.
Coccothraustes vulgaris. Charlet. Onom. p. 84. t. 85.
 Exerc. p. 91. t. 92.
Grosbeak or Hawfinch Edw. Av. 4. t. 188.
Haw-Grosbeak. Penn. Britt. Zool. 1. p. 316. Arct. Zool.
 2. p. 354.
Le Grosbec. Buff. Av. 5. p. 444. t. 27. f. 1.
Succis Stenknäck.
 Habitat in Scania occidentali. Cerasis imprimis noxia.
 Rostrum pallidum cum rubore obsoleto, conicum,
 magnitudine fere capitis, validissimum, basi plumula
 fulvis tectum. Linea nigra inter rostrum et oculos. Caput
 nigro-rufescens. Gula nigra. Collum cinereum.
 Dorsum et Alae fuscae. Pectus et Abdomen cinerea cum
 rubore. Remiges nigri, coeruleo-nitidi, primores latero
 inferiore versus basin albi, horumque Octo apice rhom-
 beo truncato. Tectrices alarum apice albae. Rectrices
 nigrae a medietate interioris lateris ad apicem albae.
 Pedes pallide sordideque rubent.
 Foeminae Caput fullescens, caret gula nigra et co-
 loribus minus vividis picta.
 211. *LOXIA Enucleator*, linea alarum duplici alba, re-
 ctricibus totis nigricantibus. L. S. N. XII. T. I. p.
 299. Fn. Su. 225.
L. Enucleator sordide roseo, fusco griseoque varia, linea
 alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.
 Lath. Ind. 2. p. 372.
Coccothraustes it. Scan. p. 332.
Swensk Papegoja. Act. R. Ac. Succ. 1757. p. 159.
Coccothraustes canadensis. Briss. Orn. 1. p. 378.
Pine Grosbeak. Penn. Britt. Zool. 1. p. 317. t. 49. Arct.
 Zool. 2. p. 348.

Greatest

- Greatest Bulfinch, Cook and Hen*. Edw. Av. 3. t. 123.
 124.
Le Durbee. Buff. Av. 5. p. 457.
Succis Tallbit, Swensk Papegoja. *Westrobothniensibus*
 Kattwak. Smolandis Kretz.
 Habitat in Westrobothnia, versus hyemem usque in
 Scania haud raro descendens. Victitat fructibus
 Pini, Juniperi, Sorbi etc. quorum Semina dexter-
 time separat et enucleat. Stolidus avis laqueo ba-
 culo alligato facile capiendâ citoque cicurandâ, egre-
 gie cantillans.
 Rostrum validum, sed quam prioris multo minus,
 cinereum, mandibula superiore longiore apice curvato,
 Nates plumulis nigris tectae. Caput, Collum, Dorsum
 et Pectus primo immo coctinea maculis parvis fuscia,
 sequente solva. Abdomen et Caudam cinerea. Tectrices
 alarum fulvescentes apicibus albis serie duplici. Remi-
 ges 13 nigricantes. Rectrices 12 nigricante margine ex-
 teriore fulvescente. Pedes nigri.
 212. *LOXIA Pyrrhula* artubus nigris, tectricibus cau-
 dae remigumque posticorum albis. L. S. N. XII.
 T. I. p. 300. Fn. Su. 225. Lath. Ind. 1. p. 387.
Pyrrhula. Briss. Orn. 1. p. 395.
Bulfinch, Alp. or Nope. Will. Orn. p. 247.
Bulfinch. Penn. Britt. Zool. 1. p. 320. Arct. Zool. 2.
 p. 355.
Le Bourreuil. Buff. Av. 4. p. 372. t. 17.
Succis. Domberte.
 Habitat in sylvis. Edit avido gemmas arborum erum-
 pontes. Facile cicuratur, et egregie edocta cantil-
 lat. Mas accipiens Araneam diu tenuit in ore, dein
 edidit foeminae.

Mas.

Mas. *Rostrum* nigrum, crassissimum, utrinque gibbum. *Nares* patulae setis parvis tectae. *Caput* atrum. *Tempora*, *Gula*, *Pectus*, *Abdomen* cinnamomina. *Collum*, *Dorsum* cinereo-coerulea. *Uropygium* et *Criſsum* alba. *Remiges* 16 nigri versus marginem internam albi. *Tectrices* nigricantes, sed 9 — 16 apice albae. *Rectrices* 12 nigrae.

Foeminae *Caput* et *Gula* nigra. *Cervix* cinerea. *Dorsum* cinereo-fuscescens. *Tempora*, *Iugulum*, *Pectus* cinerea cum tinctura rubri obsoleta. *Remiges* 15 nigri, sed primus margine externo albescente, et tres intimi secundariorum coerulefcentes. *Tectrices* obscure cinereae, at exteriores nigrae apicibus albis. *Uropygium* et *Criſsum* alba. *Cauda* nigra, tectricibus etiam nigris.

Loxia Flammega alba, capite, collo, pectore abdomineque roseis. *Mus. Carll.* 1. t. 17. hujus varietas.

215. *Loxia Chloris* flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. *L. S. N. XII. T. I. p. 304. Fn. Su. 226. Lath. Ind. 1. p. 582.*

Chloris, *Briss. Orn.* 1. p. 359.

Greeninch, *Will. Orn.* p. 246.

Green Grosbeak, *Penn. Britt. Zool.* 1. p. 322. *Arct. Zool.* 2. p. 555.

Le Verdier, *Bull. Av.* 4. p. 171. t. 15.

Suecic Swenska, *Bull. Linn.* 1. t. 15.

Habitat in sepibus. Ova 6 maculis sanguineis aspersa.

Facili negotio cicuratur. *Pennant L. cit.*

Rostrum conicum. *Caput* et *Dorsum* flavo-viridia marginibus pennarum griseis. *Ambitus rostri* flavus. *Pectus* et *Uropygium* flava. *Abdomen* albidum. *Remi-*

ges nigri 1 — 7. margine externo luteo magis versus inferiorem pennarum partem, pone et apice omnes albicantes; secundariorum vero margines grisei. *Rectrices* nigrae, at 1. 1, 2. 2, 3. 3, a medio versus basin luteae, reliquo margine externo flavescente. *Pedes* fulci, unque postico majore quam medio. Foeminae color magis obsoletus.

EMBERIZA.

Rostrum conicum.

Mandibulae basi deorsum a se invicem discedentes; inferiorem lateribus inflexo-coarctata: superiore angustiore, intus parum cava.

Tuberculum in medio mandibulae superioris intus. (*)

214. *EMBERIZA nivalis* remigibus albis: primoribus extorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *L. S. N. XII. T. I. p. 303. Fn. Su. 227. t. 1. f. 227. Fabr. Fn. Groenl. 81. Lath. Ind. 1. p. 597.*

Alauda remigibus albis etc. *Act. R. Ac. Suec. 1740. p. 369. t. 1. f. 9.*

Hortulanus nivalis, *Briss. Orn.* 1. p. 388.

Great pied mountain Finch or Brambling, *Will. Orn.* p. 255.

Tawny

(*) Genus hujus Auctor b. I. LACER. qui plurimas Avium Suecicorum descriptiones LINNAEO obtulit, a tuberculo hocce characterem praecipue desumpsit, cui alium, scilicet longitudinem insignem remigis decimi sexti vel intimi addidit. Hujus ea est proportio, ut reposita ala cum remige quinto longitudine conveniat. *Emberizas* Suecicas utroque characteri instructas esse nullus dubito, licet de novo illas examinare non licuit, de ceteris nil pronuntiare audeo. *Gibbum* vel *tuberculum* tamen observarunt *Col. V. H. PENNANT* et *LATHAM*.

- Tawny Bunting*. Penn. Britt. Zool. 1. p. 327.
Snow Bunting. Penn. Britt. Zool. 1. p. 329. t. 15 et 50.
 Arct. Zool. 2. p. 355.
Snow Bird. Edw. Av. 3. t. 126.
Orotolan de neige. Buff. Av. 4. p. 529.
 Suecis Snöfparf, Snöfögel. Scanis Snöläarka. Dale-
 karlis Ilwädersfögel, Uplandis Hårdwärsfögel. Lap-
 ponibus Alaipp.

Habitat in alpihus Lapponica aestate, descendit usque
 in Scania sub rigida et nivosa hyeme. Caro sa-
 pidissima. Curstat, nec arboribus insidet; victitat
 etiam Avena.

Magnitudo Alaudae. *Rostrum* nigrum, saepe basi fla-
 vum. *Nares* orbiculatae, plumulis fere tectae. *Irides*
 fuscae. *Pedes* nigricantes. *Ungues* nigri, pollice late-
 ralibus duplo longiore. *Pennae* dorii omnes arcuato-
 acuminatae (*Fabricius*). *Alae* complicatae albae apice ni-
 grae et macula parva nigra ad flexuram alae. *Remiges*
 1 — 8 ad basin albi, dein nigri, ita ut 1 dimidia parte
 albus ceterum niger, 2 longius albescat et ita albedo cre-
 scat, ut octavus apice tantum niger, in aliis etiam 9.
 9 — 15 omnino albi, 16 niger margine extimo albus.
Cauda vix bifida, rectricibus 12, quarum 1. 1, 2. 2, 3. 3
 albae macula lineari nigra ad apicem, 4. 4 nigrae mar-
 gine exteriori albo, 5. 5, 6. 6 omnino nigrae. *Color*
 praeterca differunt sexus.

Mas. *Caput*, *Collum*, *Pectus* nivea, aestate tenuis-
 sime testaceo aluibrata, imprimis pectus. *Dorsum* ni-
 grum marginibus tenuissime albis, aestate testaceis. *Te-*
trices alarum albae.

Foemina. *Caput*, *Collum*, *Pectus* griseo-testacea,
abdomen antice pallidum pollice album. *Dorsum* nigrum
 testaceo undulatum. *Tectrices* alarum superiores ejus-
 dem

dem coloris, inferiores autem albae. *Remigum* primo-
 rum apices subferruginei.

Sic *Eques a Linnæ*, verum Rev. O. *Fabricius* hanc
 foeminae descriptionem juniore avi reddit et foeminam
 ita describit.

Nigricat ubi mas niger ac fordide albicat cum mix-
 tura nigri ubi mas niveus, praeter *Pectus* et *Abdomen*
 alba. *Tempora* testacea. *Caput* et *Alarum* tectrices su-
 periores dorso concolores, ut harum duo ordines remi-
 gibus secundariis proximi apices albos habent, unde du-
 plex alba alarum linea, reliqua ut in mare.

Var. ♂. *Fa. Suec.* *Emberiza Mustelina* recentiorum,
 omnino est foemina hujus. In Scania non habitat, sed
 in maritima Scaniae campestris sub nivosa rigidaque
 hyeme saepius visa, nec *Sjölärka*, sed *Snöläarka* dicitur.

215. *EMBERIZA Miliaris* grisea, subtus nigro-macu-
 lata, orbitis rufis, L. S. N. XII. T. I. p. 308. Lath.
 Ind. 1. p. 402.
E. Calandra grisea, nigro-maculata. *Fa. Su.* 228.
Kornläark. it. Scan. p. 292. t. 4.
Cynchramus. *Briss. Orn.* 1. p. 390.
Bunting called by Gesner Emberiza alba. *Will. Orn.* p.
 267.
Common Bunting. Penn. Britt. Zool. 1. p. 324. Arct.
 Zool. 2. p. 366.
Le Proyer. Buff. Av. 4. p. 355.
 Suecis Kornläarka.

Habitat in agris et cultis Scaniae.

Rostrum nigrum, mandibula inferiore flavescens.
Nares oblongae, semitectae. *Lingua* apice membranula
 lacera. *Avia supra* ex griseo-fusco-ferruginea maculis
 nigris acutis. *Collum* et *Pectus* albida subflavo tincta
 maculis

maculis nigris. *Abdomen* immaculatum. *Remiges* nigricantes, *exteriore* albescente. *Rectrices* nigro-fuscae *marginem* albescente.

216. *EMBERIZA Hortulana* remigibus nigris: primis tribus *marginem* albidis, *rectricibus* nigris: lateralibus duabus *exterioribus* albis. L. S. N. XII. T. I. p. 309. Fn. Su. 229. Lath. Ind. 1. p. 399.

Emberiza Maclbyensis capite colloque plumbeo-cinereis, gula albida, abdomine ferrugineo, Mus. Carilf. 1. t. 21. nat.

Hortulanus. Briss. Orn. 1. p. 384.

The Hortulane of the Italians. Will. Orn. p. 270.

Ortolan. Penn. Arct. Zool. 2. p. 367.

Ortolan. Buff. Av. 4. p. 305. t. 14.

Habitat in Suecia, copiosius circa Gothoburgum, trans-migrans mense Martio.

Rostrum et *Pedes* rubro-fusci. *Vertex* viridi-cinereus immaculatus vel maculis linearibus nigris. *Annulus* pallidus vel flavus oculos ambit. *Gula* fulva. *Pectus* cinereum cum virore. *Abdomen* testaceum, in aliis gilvum. *Dorsum* fusco-ferrugineum nigro-maculatum. *Remiges* nigri, tribus vel pluribus *marginem* albidis, 1. 2. 3. longissimi. *Rectrices* 12 nigricantes, duabus *exterioribus* utrinque *interioribus* albidis, *extima* *exteriorum*. *Saltem* in medio *lineola* alba.

217. *EMBERIZA Citrinella* rectricibus nigricantibus: *extimis* duabus *latere* *interiore* macula alba acuta. L. S. N. XII. T. I. p. 309. Fn. Su. 230. Lath. Ind. I. p. 400.

Emberiza. Briss. Orn. 1. p. 382.

Yellow Hammer. Will. Orn. p. 263.

Yellow

Yellow Bunting. Penn. Brit. Zool. 1. p. 325. t. 50. Arct. Zool. 2. p. 367.

Le Bruant. Buff. Av. 4. p. 340. t. 8.

Succis Gröning. Smolandis Golfpink. Scania Gulsparf.

Habitat ubique apud nos, nidificat in pratis humi. Larvas Brassicae aufert.

Rostrum obscurum, *maxilla* *inferiore* pallidiore. *Nares* plumulis setosis fere tectae. *Lingua* acuta, fasciculo filamentorum terminata. *Pili* nigri in occipite maris. *Frons*, *Gena*, *Gula*, *Abdomen*, *Cristum* citrina e rachi pennarum nigro-maculata. *Capitis* reliquum cinereo-viridescens, nigro-maculatum. *Dorsum* ferrugineum, pennis *marginem* albedo maculaque apicem nigra. *Remiges* nigri, *primores* *marginem* *exteriore* luteo, *secundarii* griseo. *Tectrices* fusco-griseae, *penultima* *apicibus* albis. *Rectrices* nigrae, *exteriore* *marginem* flavescente, 1. 1. 2. 2. *latere* *interiore* alba macula obliqua infra apicem.

218. *EMBERIZA Schoeniclas* capite nigro, corpore griseo nigroque, *rectricibus* *extimis* macula alba cuneiformi. L. S. N. XII. T. I. p. 311. Fn. Su. 231. Lath. Ind. 2. p. 402.

Fringilla capite nigro, *maxillis* rufis, *torque* albo, corpore rufo-nigricante. Fn. Su. 1. ed. 211.

Hortulanus arundinaceus. Briss. Orn. 1. p. 386.

The Reed-Sparrow. Will. Orn. p. 269.

Reed Bunting. Penn. Brit. Zool. 1. p. 326. Arct. Zool. 2. p. 368.

Ortolan de Roseaux. Buff. Av. 4. p. 315.

Succis. Salsparf.

Habitat in arundinetis rariis. Nidum pendulum inter quatuor arundines ad 3 pedum altitudinem supra aquas conficit. Ova 4-5 coeruleo-rubro venosa. Egregie etiam nocte cantillat.

Q

Prae-

Præcedente tertia parte minor. *Rostrum* nigerimum naribus rotundis fore tectis. *Caput* nigrum fascia in mare alba a rostro caput cingente. *Subtus* alba, at in medio pectore ac sub rostro nigra. *Nucha* cinereo-nigrescens. *Cervix* et *Dorsum* fulco-ferruginea, pennis apice macula cordata nigrescente utrinque margine ferrugineo circumdata. *Abdomen* et *Crissum* alba. *Uropygium* griseum. *Remiges* nigri, *primores* margine exteriori testaceo, *secundarii* etiam, sed latius et ferrugineo tincti. *Rectrices* nigrae, at 1, 1, latere exteriori et dimidio interiori, 2, 2 latere interiori versus apicem etiam alba, 6, 6 marginibus griseis.

Fœminae caput ferrugineum nigro-maculatum, caret fascia alba.

FRINGILLA.

Rostrum conicum, rectum, acuminatum.

219. FRINGILLA *Laponica*, capite nigro, corpore griseo nigroque, superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi. L. S. N. XII. T. I. p. 317. Fabr. Fn. Groenl. 82. Lath. Ind. 1. p. 440.

Fr. Laponica capite nigricante maculato, macula supra oculos alba. Fn. Su. 235.

Fr. calearata. Pallas it. Ross. 2. p. 710. t. E.

Fr. montana. Briff. Orn. 1. p. 350.

Lapland Finch. Penn. Arct. Zool. 2. p. 377.

Le grand Montain. Buff. Av. 4. p. 234.

Habitat in Lapponia.

Rostrum luteum apice nigro. *Caput* tumidum, nigrum. *Linea* alba supra oculos orta descendit incurvata ad collum. *Cervix* ferruginea. *Dorsum*, *Alae*, *Cauda* fusca lituris ferrugineis. *Pectus* albidum macula longitudinali nigra. *Remiges* fusci margine exteriori pallido.

Tectrices

Tectrices ultimae apicibus albis, his superimpositae margine albo, unde duplex linea alarum alba. *Cauda* bifida nigra, rectricibus 1. 1. oblique dimidiato-albis apice macula cuneiformi nigra. 2. 2 macula cuneiformi alba. *Pedes* nigricantes, ungue postico longiore.

Fœmina obsoletius colorata vertice fuscescente marginibus pennarum pallidis. *Cervix* pallida brunnea. *Supercilia*, *Gula*, *Abdomen*, *Crissum* pallide. *Pectus* griseum. FARRIGIUS.

220. FRINGILLA *coelebs* artubus nigris, remigibus utrinque albis: tribus prius immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. L. S. N. XII. T. I. p. 318. Fn. Su. 232. Lath. Ind. 1. p. 457.

Fr. Sylvia artubus, remigibus, rectricibusque nigris; duabus extimis a medio extrosum albis. L. S. N. X. T. I. p. 180. Fn. Su. 1. ed. 200. Fn. Su. 2. ed. 252. p. t. 2. f. 232. foem.

Fringilla. Briff. Orn. 1. p. 347.

The Chaffinch. Will. Orn. p. 253. Penn. Britt. Zool. 1. p. 335. Arct. Zool. 2. p. 381.

Le Pinçon. Buff. Av. 4. p. 209. t. 4.

Sueci Bofink.

Habitat ubique per Sueciam nidificans in arbusculis.

Fœminae migrant per hyemes, mares permanent.

LINNE.

Mas. *Rostrum* plumbeum. *Caput*, *Cervix* cana fronte nigra. *Regio oculorum*, *Gula*, *Pectus*, *Laterna* pallide ferrugineo-rufa. *Collum* eadem rubodine cingitur. *Dorsum* fulco-olivaceum. *Uropygium* flavo-viride. *Crissum* albidum. *Alae* nigrae macula triplici alba, alba scilicet ad flexuram alae, alia in medio tetricum, tertia sub hac in remigibus minimis. *Tectrices* alarum nigrae apicibus albis, ad basin quoque albae. *Remiges* omnes nigrican-

tes, latere interiore praesertim versus basin albis tribus primis exceptis versus basin in latere exteriori alba macula notata; secundarii etiam margine exteriori linea alba aut flavescens supra medium picti. *Rectrices* fere aequales 1. 1, 2. 2, a medio lateris interioris versus apices albae, reliquae nigrae praeter 6. 6. cinerascens.

Foemina. *Rostrum* fuscum, supra cinereo-virescens, subtus albicans, temporibus subbrunneis, pectore sordide rubente vel albescente. *Remiges* nigricantes exceptis tribus primis basi utrinque albis et margine interiore albescente. *Rectrices* nigricantes, intermedio pari virescente, sed extremae utrinque lineae versus apicem macula obliqua cuneiformi alba, quarum exterior major.

221. FRINGILLA *Montifringilla* alarum basi subtus flavissima. L. S. N. XII. T. I. p. 518. Fn. Su. 235. t. 2. f. 235.

Fr. Montifringilla nigra pennis rufo-marginatis, subtus uropygioque alba, jugulo pectoreque rufescentibus; rectricibus lateralibus nigricantibus, extus albo-marginatis. Lath. Ind. 1. p. 459.

Montifringilla. Brill. Orn. 1. p. 549.

Bramble or Brambling. Will. Orn. p. 254.

Brambling. Penn. Britt. Zool. 1. p. 337. Arct. Zool. 2. p. 301.

Le Pinçon d'Ardennes. Buff. Av. 4. p. 123.

Succis Norrquint.

Habitat in sylvis acerosis praesertim Norrlandiae, sub rigidiore hyeme rarius in Uplandiam descendens. Egregio et leniter canora avis.

Rostrum basi flavum, apice nigrum. *Nares* plumulis simplicibus fere tectae. *Caput, Collum, Dorsum* variegata ex pennis obsolete ferrugineis supra apicem fascia

fascia lunulata nigra. *Pectus* fulvo-ferrugineum ut et alarum basis extus, haec vero subtus flavissima est. *Abdomen, Uropygium* alba. *Cristum* obsolete ferrugineum. *Remiges* nigri latere exteriori linea citrina longitudinali, quartus et inloquentes versus basin exteriori latere dimidiato-albi; secundarii margine apicum luteo. *Rectrices* nigrae margine exteriori pallido, sed extrema versus basin imprimis alba. *Tectrices* superiores proximae nigrae apicum margine testacco. *Digitus* pollicis intermedio vix longior.

222. FRINGILLA *Lulensis* fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa. L. S. N. XII. T. I. p. 518. Fn. Su. 234. collo corporeque subtus albis. Lath. Ind. 1. p. 452.

Carduelis Suecica. Brill. Orn. 1. p. 524.

Lulea Finch. Penn. Arct. Zool. 2. p. 580.

Chardonneret à quatre raies. Buff. Av. 4. p. 210.

Habitat Luloae in Westrobothnia.

Magnitudo sequentis. *Rostrum* fuscum. *Gulae* macula alba. *Corpus* cinereo-nigrum ut et *Dorsum* et *Cauda*. *Pectus* rufum. *Abdomen* album. *Alarum* basis rufa, quam macula transversa nigra, deinde rufa, iterum nigra, damum alba excipit. *Remiges* nigricantes. V. icon.

223. FRINGILLA *Carduelis* remigibus antrosum luteis: extimo immaculato, rectricibus duabus extremis medio reliquisque apice albis. L. S. N. XII. T. I. p. 518. Fn. Su. 236. Lath. Ind. 1. p. 449.

Carduelis. Brill. Orn. 1. p. 520.

Goldfinch or Thistle Finch. Will. Orn. p. 256.

Goldfinch. Penn. Britt. Zool. 1. p. 332. Arct. Zool. 2. p. 303.

Char-

Chardonneret. Buff. Av. 4. p. 187. t. 10.
Succis Stigliana.

Habitat in Sylvis et Juniperetis, sub hyeme hortos visitans, ut e plantis capitatis semina colligat. Nidificat saepe in hortis majoribus. Ova 5 alba purpureo-guttata altero apice.

Rostrum albicans apice nigro. *Caput* juxta *rostrum* sanguineum. *Vertex* niger. *Lora* nigra. *Tempora* et *nucha* testaceo-alba. *Dorsum*, *Pectus*, *Uropygium* ex rufo fusca. *Abdomen* albidum. *Alae* nigrae apicibus albis macula magna flava deflexa in medio alae. *Remiges* nigri, 1 totus niger, 2 — 10 antrorsum lutei, 11 — 13 antrorsum albi. Autumnali tempore *Remiges* et *Rectrices* albescent, vere autem nigrae sunt. *Tectrices* ultimae in mare nigrae, in foemina dorso concolores, et macula alarum flava nec citrina. Varietatem aucupibus pretiosam memorat *PENNANT* striis vel maculis 2 l. 3 albis sub gula.

224. *FRINGILLA Spinus* remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis apice nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 322. Fn. Su. 257. Lath. Ind. 1. p. 452.

Ligurinus. Brill. Orn. 1. p. 325.

The Siskin. Will. Orn. p. 261. Penn. Britt. Zool. 1. p. 340. t. 55. Arct. Zool. 2. p. 383.

Le Tarin. Buff. Av. 4. p. 221.

Succis Siska. Grönslaka. Scanis Siska.

Habitat in Juniperetis, Alnetis etc. hyeme cum *Fr. Coelibe*, *Carduele* etc. hortos visitans. Veterem *Spinum* solo *Cannabis* femine nutritum totum fuliginoso-nigrum vidi.

Caput maris nigrum, foeminae cinereo-viridescens fusco-maculatum. *Gula* albido-flavescent. *Corpus* supra

pra cinereo-luteum, ita ut omnis penna interior cinerea, exterior lutea macula nigricante; *subis* cinereo-album, macula pennae singulae nigricante. *Remiges* nigri, circa basin anteriori flavi, posteriori albi, hinc lutea macula in ala, ut primi 4 remiges toti nigri. *Rectrices* luteae apicibus nigris, sed singulae utrinque extremae et duae intermediae totae nigrae.

225. *FRINGILLA flammea*, fusca, crista flammea. L. S. N. XII. T. I. p. 322. Fn. Su. 258. corpore subtus roseo. Lath. Ind. 1. p. 438. Lath. Syn. ed. Germ. 5. p. 253. t. 48. f. 1.

Fr. cristata. Brill. Orn. 1. p. 349.

Flaming Finch. Penn. Arct. Zool. 2. p. 380.

Habitat in Norrlandia.

Magnitudo *Cannabinae*. *Rostrum* fuscum. *Pileus* flammeus, leviter cristatus. *Corpus* et *Alae* supra fuscae. *Pectus* roseum. *Pedes* pallide fusci. *PENNANT*.

226. *FRINGILLA cannabina* remigibus primoribus rectricibusque nigris, utroque margine albis. L. S. N. XII. T. I. p. 322. Fn. Su. 240.

Fr. cannabina fusco-castanea, subtus albo-rufescens, fascia alarum longitudinali alba, macula yerticis pectoreque rubris. Lath. Ind. 1. p. 458.

Linaria rubra major. Brill. Orn. 1. p. 345.

The greatest redheaded Linnet. Will. Orn. p. 260.

Redheaded Linnet. Penn. Britt. Zool. p. 345. t. 54.

Greater Redpoll. Penn. Arct. Zool. 2. p. 378.

La Linotte des Vignes. Buff. Av. 4. p. 58.

Succis *Hämpling*. Scanis *Iris*.

Habitat in Sylvarum nemoribus.

Rostrum nigrum. *Caput* cinereum vertice sanguinolento. *Collum* cinereum, subtus rufescit striis albidis unda-

undulatis. Dorsum, Alae, ex fulco-rufescentis. Pectus rubrum. Latera flavescens. Abdomen album. Remiges nigri: primores 2 — 9 utroque margine albi; secundarii vero anteriore margine fulco, apicibus albidis. Cauda bifurca. Rectrices nigrae utroque margine albae, exceptis 6. 6. margine fuscis.

Foemina caret rubro verticis ac pectoris colore, et ejus loco in pectore sordide flavescit striis nigricantibus. Scapulae, quae in mare rufescunt, in illa cinerascunt.

227. FRINGILLA Linaria remigibus reatricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum pallida. L. S. N. XII. T. I. p. 322. Fn. Su. 241.

Fr. Linaria fulco griseoque varia, subtus albo-rufescens, fascia alarum duplici albida, vertice pectoreque rubris. Lath. Ind. 1. p. 450.

Fr. flavirostris. Fn. Su. 239.

Linaria rubra minor. Brill. Orn. 1. p. 344.

The lesser redheaded Linnet. Will. Orn. p. 263. Penn. Britt. Zool. 1. p. 344. t. 54.

Lesser Redpole. Arct. Zool. 1. p. 379.

Le Sizerin. Buff. Av. 4. p. 216.

Suecis Gråfiska, Iris. Aboensibus Winterhåmpling.

Habitat in Alnetis. Hyeme gregaria seminibus Alni in primis delectatur. Ova 4 coeruleo-alba altero sine purpureo irrorata.

Minor praecedente. Rostrum basi flavescens versus apicem nigricans. Frons purpurea. Avis supra fulvescens apicibus pennarum ferrugineis. Pectus rubrum; in aliis hic desideratur color. PENNANT. Abdomen album. Latera vel flavida vel cinerea strigis fuscis. Remiges fusci utrinque sordide albo-marginati. Rectrices fuscae albo-marginatae, et hinc duae lineae alarum albae,

albae. Uropygium rubrum. Cauda bifida, reatricibus acutiusculis fuscis utroque margine pallidis. Foeminae macula verticis crocea et rubor pectoris quandoque in maribus desit. PENNANT. Fringilla flavirostris Linnei non nisi hujus foemina secundum iconem Rudbeckianam descripta, ut me certiore facit Col. D. Affess. LINDBORGH, qui simul copiam iconis ex opere Rudbeckiano depictae benigne dedit. Aliam hujus varietatem communicavit Com. H. G. WACHTMEISTER Rostrum flavo, Fronte alba, Vertice Pectoreque sanguineis, corpore albo, Rectricibus intermediis griseis et Remigibus primoribus etiam griseis, Uropygio albo-rufescente, qui aviculam vivam coluit. V. icon.

228. FRINGILLA domestica remigibus reatricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria. L. S. N. XII. T. I. p. 323. Fn. Su. 242. Lath. Ind. 1. p. 452.

Passer domesticus. Brill. Orn. 1. p. 327.

The House Sparrow. Will. Orn. p. 249.

Sparrow. Penn. Britt. Zool. 1. p. 338. t. 51. Arct. Zool. 2. p. 382.

Mainau. Buff. Av. 3. p. 474. t. 29. f. 1.

Suecis Tåtting, Sparf, Grålsparf. Smolaudis Hampspink, Grålspink. Scanis Sporf, rusticus Spörr.

Habitat ubique ad domos.

Rostrum nigricans. Caput supra griseum. Tempora ad nucham usque spadicea. Sub oculis macula nigra. Genae albae. Gula nigra, etiam initium juguli, ubi singula penna nigra margine apicis albo. Abdomen sordide vel cinerascens-albidum. Supra ex spadiceo et nigro maculata. Remiges nigricantes margine lateris exterioris ferrugineo. Rectrices nigricantes marginibus pallidioribus.

Foeminae *Mandibula* inferior albescens, *Gula* pallide cinerea, *Linea* alba juxta oculos.

229. FRINGILLA montana remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina. L. S. N. XII. T. I. p. 324. Fn. Su. 243. Lath. Ind. 1. p. 434.

Passer montanus. Briss. Orn. 1. p. 328.

The mountain Sparrow. Will. Orn. p. 252. Edw. Av. 5. t. 269.

Tree-Sparrow. Penn. Britt. Zool. 1. p. 339. t. 52. Arct. Zool. 2. p. 373.

Le Eriquet. Buff. Av. 3. p. 489. t. 29. f. 2.

Suecia Skogsparf.

Rostrum nigrum. *Caput* et *Cervix* spadicea. Juxta aures macula nigra. *Cervicis* fascia alba. In aliis colli latera alba, quae albedo versus nucham diffenditur, at in ipsa nucha nulla albedo. Macula nigra sub oculis, *Gula* nigra. *Dorsum* griseo-fuscoque varium. *Uropygiam* fusco-olivaceum. *Pectus* et *Abdomen* albida. *Remiges* fusci testaceo-marginati. *Rectrices* alarum duplici ordine remigibus concolores apicibus albidis maxima parte. *Rectrices* caudae integrae fuscae. *Pedes* pallidi.

MUSCICAPA.

Rostrum subtrigonum, utrinque emarginatum apice incurvo. *Vibrissae* patentis versus fauces.

Nares subrotundae.

230. MUSCICAPA atricapilla nigra, subtus, frontisque macula alarumque speculo albis, rectricibus laterilibus extus albis. L. S. N. XII. T. I. p. 326. N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 31. Lath. Ind. 1. p. 467.

Mot-

Motacilla remigibus nigricantibus, extimo dimidiato extorsum albo; macula alarum alba. Fn. Su. 1. ed. 230. t. 1. f. 229. et 2. ed. t. 1. f. 256. mas, non autem nomen vel deser.

Motacilla leucomela nigra, subtus, macula alarum lineaque transversa pone rostrum albis. Mull. Prodr. Zool. Dan. 268. Ström Act. Nidros. 5. p. 543. t. 8. f. 2.

Rubetra anglica. Briss. Orn. 1. p. 271.

Coldfinch et Beccafigo. Will. Orn. p. 252.

Pied Flycatcher. Penn. Britt. Zool. 1. p. 351. Arct. Zool. 2. p. 391.

Le Traquet d'Angleterre. Buff. Av. 5. p. 222.

Habitat in Sylvis rarius. Victus Gemmae arborum.

Mas. *Rostrum* nigrum basi latiusculum et fere triangulare. *Frons* macula alba, in aliis parva, in aliis major ut fasciam fere referat. *Supra* tota nigra, in aliis dorsum cinerascens, in aliis fuscescens; *subtus* alba. *Macula* alarum alba. *Rectrices* nigrae 1. 1. latere exteriori toto et parte interioris albae. 2. 2. latere exteriori fere toto albae, reliquae nigrae. Variat tamen teste TENGMALM ita, ut 6. 6. solum totae sint nigrae, reliquae margine exteriori albo.

Foemina fusca, ubi mas niger, desinitur macula alba frontis, et alarum macula alba minor. LACHZ.

Frons sordide alba. *Caput*, *Collum*, *Dorsum* viridincinerea. *Subtus* color albus cum aliqua fusci mixtura. *Remiges* fusci, tres ultimi margine interiori et apice albi, ultimus etiam margine superiore. *Rectrices* fuscae. TENGMALM.

231. MUSCICAPA Grifola subfusca, subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente. L. S. N. XII. T. I. p. 328. N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 52.

Mot-

Motacilla Ficedula, Fn. Su. 251. non autem Syfl. Nat.

Muscicapa, Brill. Orn. 1. p. 257.

A small Bird — like the *Stoपरola* of Aldrovand. Will. Orn. p. 217.

Spotted Flycatcher, Penn. Britt. Zool. 1. p. 350.

Gobemouche, Buff. Av. 4. p. 517. t. 25. f. 2.

Habitat in hortis et cultis.

Rostrum nigrum basi supra latiusculum ac nonnihil planum, inter nares dorsatum. Caput griseum maculis oblongis fuscis. Supra grisea tota. Gula, Collum subtus et Pectus alba, maculis longitudinalibus dilute griseis. Abdomen album. Alae subtus albae, laevissime rufescentes. Tempora junioris avis rufescent. Mas a foemina differt fronte et abdomine obscuriore. TASSOMALM.

Omnino haec est *Motacilla Ficedula*, Fn. Succ. utriusque editionis.

MOTACILLA

Rostrum subulatum rectum mandibulis subaequalibus.

Nares obovatae.

Lingua lacero-emarginata.

230. MOTACILLA *Luscinia* rufo-cinerea, armillis cinereis. L. S. N. XII. T. I. p. 323. Fn. Su. 244.

Sylvia Luscinia rufo-cinerea, subtus cinereo-alba, rectricibus fusco-rufis, armillis cinereis. Lath. Ind. 1. p. 506.

Luscinia, Brill. Orn. 1. p. 420.

Nightingale, Will. Orn. p. 220, Penn. Britt. Zool. 1. p. 565. Arct. Zool. p. 416.

Rossignol, Buff. Av. 5. p. 81. t. 6. f. 1.

Suecis Näcktergal.

Habi-

Habitat in nemoribus Olandiae, Gottlandiae, Scaniae, Swartfjölundet, Fulleröna, Upsaliae, Sigtunae et alibi. Modus capiendi ut, Scen. 389.

Rostrum supra fuscescens, subtus pallidius. Corpus supra testaceo-fuscum, qui color magis rufescit in remigibus, et adhuc magis in uropygio et rectricibus. Gula, Pectus, Abdomen cinerea. Crissum albidum. Femora alba striata transversim. Genna quasi annulis cinereis cincta.

233. MOTACILLA *modularis* supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore coeruleo-cinereo. L. S. N. XII. T. I. p. 329. Fn. Su. 245. Lath. Ind. 1. p. 511. (*Sylvia modularis*.)

Curraca sepriaria, Brill. Orn. 1. p. 420.

Hedge Sparrow, Will. Orn. p. 215. Penn. Britt. Zool. 1. p. 376. Arct. Zool. 2. p. 418.

Traine Buffon, Mouchet, Fauvette d'hyver. Buff. Av. 5. p. 151. t. 9.

Suecis Järnsparf.

Caput et Collum griseo-fusca maculis nigricantibus acutis, minoribus et confertioribus, at in Dorso cinnamomeo majoribus et magis discretis. Tempora rufescentia. Supra oculos et pone aures, in gula et pectore color cinereo-coeruleo-cinereus. Latera et Femora pallide ferruginea maculis acutis fuscis. Remiges nigricantes margine exteriori cinnamomeo. Tectrices proximae apicibus albidis. Rectrices nigrae marginibus ferrugineis. Uropygium griseo-fuscum. Crissum album maculis acutis fuscis. Pedes subfusci.

234. MOTACILLA *Schoenobaenus* testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato. L. S. N. XII. T. I. p. 329. Fn. Su. 246. N. Act. R. Ac. Succ. 1783. p. 34.

Sylvia

Sylvia Schoenobaenus testaceo-fusca subtus pallide testacea, capite maculato, remigibus extus rufo-marginatis. Lath. Ind. 1. p. 510.

Carruca sylvestris L. *Luscinola*. Briss. Orn. 1. p. 419.

Bogrusk Warbler. Penn. Arct. Zool. 2. p. 419.

Rouffette ou Fauvette des Bois. Buff. Av. 5. p. 139.

Suecis Säfligare.

Habitat inter Scirpos Scaniae LæCHN. Uplandiae TENGMALM.

Priore multo minor, ad semunciae pondus non ascendit. Rostrum angustum, acutissimum, supra fuscum subtus pallidum. Internum Oris cum Lingua et sinibus lutea. Linguae hamuli macula nigra. Irides castaneae. Caput, Dorsum et Uropygium pallide spadicea, maculis nigris in capite dorsoque, imprimis in capite. Supercilia ferrugineo-flava a rostro ad nucham ducta. Eiusdem coloris sunt Gula, Pectus, Abdomen, Femora, Crissum. Remiges fusci marginibus ferrugineis, etiam Tectrices. Cauda rotundata, unicolor fusca. Pedes lividi.

235. MOTACILLA *Carruca* supra fusca subtus albida, rectricibus fuscis: extima margine tenuiore alba. L. S. N. XII. T. I. p. 349. Fn. Su. 247. Lath. Ind. 1. p. 509. (*Sylvia*.)

Carruca garrula. Briss. Orn. 1. p. 417.

Kruka. Penn. Arct. Zool. 2. p. 422.

Fauvette babillarde. Buff. Av. 5. p. 135.

Suecis Kruka, Artfogel.

Habitat in Hortis inter Pifa, forte et in agris. Ora cinerea maculis ferrugineis.

Caput et Dorsum cinereo-grisea; subtus albida parum infuscens. Macula temporum obscurior. Remiges fusci margine tenuiore albescentes. Cauda integra. Rectrices fuscae,

fulcae, sed extima utrinque margine exteriori longitudinaliter alba.

236. MOTACILLA *Hippolais* cinereo-fusca subtus alba, palpebris margine albis, artubus fuscis. TENGMALM N. Act. R. Ac. Succ. 1783. p. 53.

Motacilla Salicaria cinerea subtus alba, superciliis albis. L. S. N. XII. T. I. p. 330. Fn. Su. 249. Lath. Ind. 1. p. 516. (*Sylvia Salicaria*),

Carruca. Briss. Orn. 1. p. 414?

Habitat in Sylvis.

Adeo confusa hujus et sequentis Synonymia, ut eam extricare non valeam. Cl. TENGMALM ita nostram describit.

Superne griseo-fusca levissime ad olivaceum inclinans, subtus alba cum aliqua fuscescentis mixtura in pectore et gula. Abdomen album. Alae supra fuscae, subtus albae. Tectrices inferiores leviter flavescens. Cauda supra fusco-grisea, subtus alba. Palpebrae margine albae.

237. MOTACILLA *Salicaria* virescenti-cinerea, pectore flavo, abdomine albo, superciliis pallide flavis. Tengmalm. N. Act. R. Ac. Succ. 1783. p. 53.

M. Hippolais virescenti-cinerea, subtus flavescens, abdomine albido, artubus fuscis, superciliis albidis. L. S. N. XII. T. I. p. 330. Fn. Su. 248. Lath. Ind. 1. p. 507. (*Sylvia Hippolais*).

Carruca arundinacea. Briss. Orn. 1. p. 415.

Beccosfigo or *Figeater*. Will. Orn. p. 216.

Pettychaps. Penn. Britt. Zool. 1. p. 376.

Fauvette des roseaux. Buff. Av. 5. p. 142.

Habitat in Salicetis et Arundinetis? noctu cantillans.

Corpus

Corpus supra cinereum, vix virescens. Abdomen exalbido. Pectus et Tectrices alarum inferiores flavescens. Remiges fusci margine postico exalbido. Rectrices remigibus concolores. Linea albida supra oculos. LINNÉ.

Os intus rubrum. Caput, Collum, Dorsum, Alae cinereo-olivacea. Remiges obscuriores olivaceo-marginati. Tectrices interiores flavae. Pectus album flavedine tinctum. Abdomen argenteum. Cauda fusca. Pedes coarulescentes. PENNANT. An eadem Avis?

238. MOTACILLA Sylvis supra cinerea, fultus alba, rectricè prima longitudinaliter dimidiato-alba, secunda apice alba. L. S. N. XII. T. I. p. 330. Fn. Su. 250.

Sylvis cinerea, Lath. Ind. 1. p. 514. β .
 Curruca cinerea sive Cineraria, Briss. Orn. 1. p. 415.
 Whitethroat. Will. Orn. p. 236. Penn. Britt. Zool. 1. p. 307. Arct. Zool. 2. p. 422.
 Fauvette grise ou Grifette. Buff. Av. 5. p. 152.
 Suecis Artfogel, Skogsknetter, Mefar.

Habitat in sylvis et nemoribus, nec non in hortis inter Fisa frequens.

Similis Currucæ, a qua differt magnitudine dupla, capite cinereo, dorso griseo ac ferrugineo, remigibus margine exteriori ferrugineis. Macula temporum in hac doct.

239. MOTACILLA alba pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-oblique albis. L. S. N. XII. T. I. p. 331. Fn. Su. 252. Lath. Ind. 1. p. 501.
 Motacilla. Briss. Orn. 1. p. 437.
 White Wagtail. Will. Orn. p. 237. Penn. Britt. Zool. 1. p. 361. t. 55. Arct. Zool. 2. p. 396.
 Lavandiere. Buff. Av. 5. p. 251. t. 14. f. 1.

Suecis

Suecis Årta, Södesårla. Sudermannis Isfjerna. Östrobothniensibus; Wästräckia. Smolandis Wippstjert, Scennis Quickstjert, Gaterennare.

Habitat ubique. Ova 6 alba maculis parvis griseis.

Rostrum tenue, nigrum, maxillis subaequalibus, superiore utrinque emarginata, versus apicem inter nares angulata. Nares oblongae nudae. Lingua sagittata, membranacea, apice plurimis setulis lacera. Caput nigrum a vertice ad nucham. Frontis, Latera capitis, Gula alba. Jugulam nigrum. Dorsum canum. Pectus et Abdomen albida cum cinerei mixtura. Alae fuscae. Remiges 1 — 5 longiores integri; 6 — 14 fere aequales, obtusi, emarginati, 15 his longior et 16 margine anteriore albi. Rectrices aequales fuscae, 1. 1, 2. 2, dimidiato-albae oblique versus apicem, 6. 6. angustiores, acutiores ceteris, et in quibusdam speciminibus margine exteriori longitudinaliter albo, reliquae fuscae unicolores. Tibiae et Pedes nigri, ungue postico maximo.

240. MOTACILLA flava pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-oblique albis. L. S. N. XII. T. I. p. 331. Fn. Su. 253. Lath. Ind. 1. p. 504.

Motacilla verna. Briss. Orn. 1. p. 438.

Yellow Water Wagtail. Will. Orn. p. 238. Edw. Av. 5. t. 258.

Yellow Wagtail. Penn. Britt. Zool. 1. p. 362. t. 55. Arct. Zool. 2. p. 396.

Bergeronnette du Printems. Buff. Av. 5. p. 265.

Suecis Gulårla. Sudermannis Södesårla, Bäckårla.

Habitat passim in sepibus, pascuis. Nidificat inter segetes. Ova 5 maculis et lineolis fuscis.

Rostrum subulatum nigrum, pone apicem obsolete utrinque emarginatum. Lingua in 4 l. 5 setas divisa,

R

acu-

acuminata. Caput supra carum cum viridis mixtura. Linea a rostro per oculos albida, supra oculos linea fusca, et alia sub oculis. Gula flava maculis nigris. Jugulum, Pectus, Abdomen, Femora, Crissum lutea. Dorsum olivaceum. Uropygium magis flavescens. Alae fuscae. Remiges 1 — 5 longiores, acutiores, sensim breviores, 6 — 14 breviores, aequales, obtusi, emarginati, 15 similia magnitudine et figura quinto, sed 16 in ala complicata longitudine primi margine anteriore albo. Rectrices aequales fusco-nigricantes, 1, 1, 2, 2, dimidiato-oblique albae, 3, 3, vix apice antrorsum albicat, reliquae immacolatae. Pedes fusci, unguis postico reliquis duplo longiore.

Foemina caret maculis sub gula. Caput obscure cinereo-fuscum.

241. MOTACILLA *Boarula* supra cinerea subtus flava, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba. Linn. Mant. Plant. alt. p. 527. Lath. Ind. 1. p. 502.

M. flava. Fu. Su. 255. β. Briff. Orn. 1. p. 439.

Grey Wagtail. Will. Orn. p. 238. Penn. Britt. Zool. 1. p. 363.

Grey Water Wagtail. Edw. Av. 5. t. 259.

Bergeronnette jaune. Buff. Av. 5. p. 263.

Habitat passim in Suecia. Sequitur Boves aestato tota die, colligens Conopsidea irritantes et calcitrantes. Fahlunae in agris, dum hordeum seritur, gregaria est.

Area oculorum cinerea, linea alba supra et infra. Gula maris nigra. Caput supra, Cervix et Dorsum cinerea, Uropygium luteum. Subtus tota flava. Remiges fuscescentes, intimi flavo-marginati. Cauda longior quam in reliquis, rectrice 1, 1, tota alba, 2, 2, latere interiore et apice, 3, 3, disco alba, reliquis nigris.

242. MOTACILLA *Oenanthe*, dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra. L. S. N. XII. T. I. p. 332. Fu. Su. 254.

Sylvia Oenanthe dorso cano, fronte, linea supra oculos, uropygio basique caudae albis, per oculos fascia nigra. Lath. Ind. 1. p. 529.

Vitiflora. Briff. Orn. 1. p. 434.

Fallow Smich, Wheat Ear, Whitetail. Will. Orn. p. 233.

Wheat Ear. Penn. Britt. Zool. 1. p. 383. Arct. Zool. 2. p. 420.

Calblanc, Vitrec, Motteux. Buff. Av. 5. p. 237.

Suecia Stensquitta.

β. *Motacilla* pectore abdomineque pallido, rectricibus introrsum albis, dorso undulato. Fu. Su. 1. ed. 219.

Vitiflora grisea. Briff. Orn. 1. p. 434.

Grey Wheat Ear. Penn. Britt. Zool. 2. append.

Calblanc gris. Buff. Av. 5. p. 244.

Habitat per totam Sueciam. Ova 6 coeruleo-punctis fuscis raris.

Rostrium nigrum inter nares angulatum. Caput canum. Os, Fibriillae, Faux nigra. Linea lata nigra a rostro per oculos ad aures. Macula alba supra oculos in mare. Frons alba. Dorsum canum versus uropygium virescens. Gula et Collum subtus alba, levissime flavescens. Abdomen, Crissum, Uropygium alba. Remiges omnes fusci immaculati. Rectrices nigricantes basi albae, ita, ut intermedium par ad duas tertias sit nigrum, reliquae ad unam tertiam partem tantum. Pedes nigri.

Varietas visa alis nigris, remigibus secundariis apice albo.

δ. Caput et Collum cinerea, maculis parvis pallidis adspersa. Dorsum cinereo-griseum nigro-undulatum. Pe-

etus et Abdomen pallida. Alae clausae ferrugineae maxima ex parte. Remiges primores nigri apicibus obsolete ferrugineis, secundarii margine anteriore et apice ferruginei. Rectrices a medio apicem versus nigrae, ipsi apicibus obsolete ferrugineis, medium par magis nigrum quam album. Pedes nigri. Sine dubio junior tantum avis.

243. MOTACILLA Rubetra nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente. L. S. N. XII. T. I. p. 352. Fn. Su. 255. Lath. Ind. 1. p. 525. (Sylvia Rubetra.)

Rubetra major sive Rubicola. Brill. Orn. 1. p. 430.

Whinchat. Will. Orn. p. 234. Penn. Britt. Zool. 1. p. 385. Arct. Zool. 2. p. 421.

Grand Traquet ou Tarier. Buff. Av. 5. p. 224.

Suecis Buskquitta.

Habitat in confiniis sylvarum lapidosis, ericetis etc.

Rostrum nigrum. Caput et Dorsum rufo-fusca macula singulae pennae oblonga nigra. A rostro ad nucham linea supra oculos alba, sub qua latior nigra. Gula alba. Jugulum et Pectus dilute flavo-ferruginea. Abdomen albidum. In alis macula duplex alba extrorsum nigra. Remiges 17 fusci, 1 — 8 margine postico et basi albi. Rectrices nigricantes, a medio versus basin albae, exceptis duabus intermediis et 1. 1, exteriori margine fere usque ad apicem albis. Magnitudo Fringillae domesticae.

Foemina capite et dorso dilutiore colore, et in alis minus albo differt. Caret etiam albo nigroque in lateribus capitis colore, cujus loco pallide fusco-maculata. PENNANT.

244. MOTACILLA atricapilla testacea, subtus cinerea, capite obscuro. L. S. N. XII. T. I. p. 352. Fn. Su. 256. N. Act. R. Ac. Suec. 1783. p. 54. Lath. Ind. 1. p. 508. (Sylvia atricapilla).

Cir-

Garrula atricapilla. Brill. Orn. 1. p. 416.

Black Cap. Will. Orn. p. 226. Penn. Britt. Zool. 1. p. 374. Arct. Zool. 2. p. 418.

Fauvette à tête noir. Buff. Av. 5. p. 125. t. 8. f. 1.

Suecis Swarthätta.

Habitat in Sylvis passim.

Mas. Pileus splendide niger, Collum supra et lateribus cinereum. Tempora, Gula et Jugulum dilute cinerea. Abdomen album cinereo vix obnebulatum, magis tamen ad latera. Dorsum, Alae, Cauda griseo-olivacea.

Foemina. Pileus luteo-ferrugineus. Collum supra et lateribus cinerea cum mixtura luteo-virescentis. Gula, Jugulum, Pectus cinerea luteo mixta. Cetera ut in mare. TESGMALM.

Suspensor fig. 256 foem. in Tab. I. Faunae Suec. ad hanc pertinere.

245. MOTACILLA Phoenicurus gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque cano. L. S. N. XII. T. I. p. 355. Fn. Su. 257. fronte alba. Lath. Ind. 1. p. 511. (Sylvia Phoenicurus).

Ruscilla. Brill. Orn. 1. p. 422.

Redstart. Will. Orn. p. 218. Penn. Britt. Zool. 1. p. 371. Arct. Zool. 2. p. 416.

Le Rossignol de muraille. Buff. Av. 5. p. 170. t. 6. f. 2.

Suecis Rödhjort.

Habitat in arboribus frondiferis, nidificans in cavis arborum et parietum. Ova 5. coeruleo-viridia. Hyeme in Scania visa.

Rostrum nigrum supra nare angulatum. Capistrum nigrum. Frontis alba. Vertex, Cervix, Dorsum cana. Gula, Tempora nigra. Pectus, Abdominis anterior pars et Cauda praeter medium rectricum par, quod nigrescens, rufa.

rufa. *Crissum pallidius*. *Alae* fuscae marginibus pen-
narum pallidis.

Foemina obscure cinerascens in *Capite* et *Dorso*, ex
fuscescenti-rufescens in *jugulo* et *pectore*. *Gula*, *Abdo-*
men et *Crissum* albida. *Cauda* sordide rufescens.

246. MOTACILLA *Tithys* cinerea, remigibus nigricanti-
bus, rectricibus rufis: intermedio pare nigricante
extrorsum rufescente. *Fr. Su.* 1. ed. 227.

Sylvia Tithys. *Scopoli Ann. Hist. Nat.* 1. n. 233. *Lath.*
Ind. 1. p. 512.

Habitat in sylvis frondosis.

Caput, *Collum*, *Dorsum* supra cinerea, etiam *Gula*.
Pectus ad latera subluteum, minime rufum. *Abdomen* al-
bicans. *Remiges* nigricantes. *Rectrices* aequales ferru-
gineo-rufae excepto pare intermedio nigricante latero
exteriore rufo. *Pedes* et *Rostrum* nigra. LINNÉ.

Mas supra cinerascens, que gula pectore nigris, ab-
domine inter femora albido, alibi albo nigroque vario.
Foemina tota fulco-cinerea, uterque rectricibus cum ani
regione rubris. SCOPOLI.

Obs. Equ. LINN in 2 ed. *Faunae Suec.* exclusit, in
Sylf. Nat. pro foemina *Ruticillae* habuit. SCOPOLI spe-
ciem resuscitavit, quem sequitur LATHAM. BECHSTEIN
ad *Erithacum* reducit.

247. MOTACILLA *Erithacus* dorso remigibusque cinereis,
abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus ci-
neris. *L. S. N. XII. T. I.* p. 335. *Fr. Su.* 258. *Lath.*
Ind. 1. p. 513. (*Sylvia Erithacus*).

Phoenicurus. *Briss. Orn.* 1. p. 424.

The Rothschenzel of Gesner. *Will. Orn.* p. 218.

Grey Redstart. *Penn. Arct. Zool.* 2. p. 417.

Le Rouge queue. *Bull. Av.* 5. p. 130.

Succis

Succis Rödbuk.

Habitat in pratorum arboribus, hortis etc. Ova 9 viri-
di-coerulea.

Caput supra canum. *Dorsum*, *Alae*, *Remiges* cinerea.
Subtus tota, uti etiam *cauda* rufa seu ferruginea. *Rectri-*
ces a intermediae cinereae margine medio exteriore pa-
rum rufescente. *Pedes* nigri. Macula nulla sub gula
aut in sincipite, nec supercilia alba.

248. MOTACILLA *Succica*, pectore ferrugineo fascia
coerulea, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.
L. S. N. XII. T. I. p. 336. *Fr. Su.* 259. *Lath. Ind.*
1. p. 521. (*Sylvia succica*).

Cyanecula. *Briss. Orn.* 1. p. 425. *Gibraltaricus* ibid.
426.

The bird called *Wegflecklin*. *Will. Orn.* p. 219.

Blue Throat. *Penn. Arct. Zool.* 2. p. 417.

Blue Throat Redstart. *Edw. Av.* 1. t. 28. foem.

Gorge bleue. *Bull. Av.* 5. p. 206. t. 12.

Habitat in Lapponia, Westrobothnia, rarius in ceteris
provinciis, etiam in Scania visa.

Magnitudo *Fringillae Spini*. *Caput*, *Dorsum*, *Cauda*
grisea. *Lines* alba supra oculos. *Pectus* fulvo-tes-
taceum fascia in medio pectoris coerulea, saepius albo-ma-
culata. *Abdomen* albidum. *Crissum* lutescens. *Remiges*
fusci apice minimo albo. *Rectrices* fuscae apice subtes-
taeae, a basi ad medium ferrugineae, intermediae totae
fuscae.

Foemina mari similis sed dilutior, insuper macula
non ad canthum oculi, sed loco superciliarum oblonga.
A gula ad sternum cinerea, sed in hujus medio macula
alba, infra hanc ad sternum velut fusco-cinereo-nebu-
losa. LINNÉ.

249.

249. *MOTACILLA Rubecula* grisea, gula pectoreque ferruginea. L. S. N. XII. T. I. p. 537. Fn. Su. 260. Lath. Ind. 1. p. 520. (*Sylvia Rubecula*).

Rubecula. Brill. Orn. 1. p. 427.

Robin Redbreast or *Ruddock*. Will. Orn. p. 219.

Redbreast. Penn. Britt. Zool. 1. p. 372. Arct. Zool. 2. p. 417.

Le Rouge-gorge. Buff. Av. 5. p. 196. t. 11.

Sueciis Rotgel. Scauis Rödröfsta.

Habitat in arboribus frondiferis, ad paludes, domos, in Scania manens, sub rigida hyeme non raro domos intrans. Optime cantat solitaria (una arbor non capit duos *Erithacos*) pugnacissima. Delectatur *Evonymi* fructu.

Rostrum nigrum inter nares angulatum. *Caput* ex fusco viride, sed supra nares rufum. *Dorsum*, *Alae* etiam ex fusco-viridia. *Inguis*, *Pectus* rubea cum cano colore rubrum circumdante. *Abdomen* album. *Cauda* dorso fere concolor. *Tectrices* remigum secundariorum sex macula apicis ferruginea. *Pedes* fusci, ungue postico longiore.

250. *MOTACILLA Troglodytes* supra fusco-rufescens nigro-undulata, remigibus extimis nigro-tessellatis, cauda lineis transversis fuscis.

M. Troglodytes grisea, alis nigro cinereoque undulatis. L. S. N. XII. T. I. p. 537. Fn. Su. 261.

Sylvia Troglodytes grisea, superciliis albidis, alis nigro cinereoque undulatis. Lath. Ind. 1. p. 547.

Regulus. Brill. Orn. 1. p. 428.

Wren. Will. Orn. p. 229. Penn. Britt. Zool. 1. p. 380. Arct. Zool. 2. p. 414.

Le Troglodyte. Buff. Av. 5. p. 352.

Sueciis

Sueciis Gårdfnyg, Tummeliten, Tummelilla.

Habitat rarius in Suecia superiore, in Scania vulgaris.

Hybernat apud nos.

Supra ex fusco rufescens lineis undulatis nigris praeter caput. *Supercilia* alba. *Oscula* flavescens. *Subtus* cinereo-testacea obsolete fusco-undulata, ad latera vero manifeste. *Remiges* primores tres extimi nigro-tessellati. *Cauda* brevis, lineis pluribus fuscis transversis picta.

251. *MOTACILLA Regulus* remigibus secundariis exteriore margine flavis, medio albis, vertice luteo. L. S. N. XII. T. I. p. 530. Fn. Su. 262. Lath. Ind. 1. p. 540. (*Sylvia Regulus*).

Calendula Regulus cristatus vulgo dicta. Brill. Orn. 1. p. 472.

The golden crown'd Wren. Will. Orn. p. 227. Edw. Av. 5. t. 254.

Golden crested Wren. Penn. Britt. Zool. 1. p. 372. Arct. Zool. 2. p. 414.

Roitelet. Buff. Av. 5. p. 363. t. 16. f. 2.

Sueciis Kongsfogel. Scauis Fogelkong. Uplandis Busklus.

Habitat in arboribus non infrequens. Minima avis inter nostrates. In Suecia hybernat.

Rostrum nigrescens. *Lingua* lacera. *Frontis* viridescens. *Lora* alba. *Macula* verticis in Mare flava, medio aurea, lateribus nigra; in Foemina tantum flava. *Cerix* et *Dorsum* cinereo-virentia. *Subtus* cinerascens. *Remiges* fusci, 1 — 5 margine exteriore vix flavescentes, 6 — 17 in margine exterioris medio nigri, a medio extrorsum flavo-virescentes, omnes margine posteriore albidis et 12 — 17 etiam apice. *Tectrices* apice albidae. *Rectrices* fuscae margine exteriore flavo. *Unguis* posticus major.

252.

252. *MOTACILLA Trochilus cinereo-virens*, alis subtus tectricibus flavescens, superciliis luteis. L. S. N. XII. T. I. p. 338. Fn. Su. 264. Lath. Ind. 1. p. 550. (*Sylvia Trochilus*.)

Aflus, Brill. Orn. 1. p. 441.

A little yellowish Bird without name, Will. Orn. p. 228.

Yellow Wren, Penn. Britt. Zool. 1. p. 373. Arct. Zool. 2. p. 413.

Le Pouillot ou Chantre, Buff. Av. 5. p. 344.

Succis Sparfkung, Skogsknett.

♂. *Motacilla Acredula* dorso cinereo-virescente, remigibus fulcis, septimo, octavo nonoque apicibus albis. Fn. Su. 263.

Habitat in Salicetis. Ova 5 alba rubris maculis.

Rostrum fuscescens oris angulis flavis. *Linea* sublutea a naribus supra oculos ad occiput. *Supra* tota cinereo-virens in olivaceum tendens. *Subtus* albo-lutescens. *Remiges* fulci margine viridulo. *Tectrices* inferiores viridi-flavescentes. *Rectrices* similes remigibus.

♀. Quam pro juniore ave habet Cl. TENGMALM, quaeque a *Yellow Wren* Edw. Av. 6. t. 278. omnino diversa, ita describit à LINNÉ:

Rostrum tenue flavescens, supra magis obscurum. *Nares* ovato-oblongae. *Fibrillae* letis utrinque tribus nigris. *Caput*, *Collum*, *Dorsum*, *Uropygium* et *Alarum* tectrices cinerea, levissime in viride transeuntia; ad flexuram alae, praesertim subtus viridi-flavescent color, saturatior quam in reliquo corpore. *Gula*, *Pectus*, *Abdomen* alba, sed *Collum* subtus parum e viridi flavescit. *Pedes* fusco-pallidi, uti *rostrum*. *Cauda* forficata rectricibus fulcis. *Remiges* itidem fulci, sed 7, 8, 9 summis apicibus vix manifeste albi. *Lingua* setis duabus instructa. *Fauces* flavae. *Supra* oculos a rostri basi summa *lineola* pallide flave-

flavescent utrinque. *Facies* ideoque Spini, sed duplo minor. Inquietissima est in arboribus, et semper salit huc illucque.

P A R U S.

Rostrum integerrimum basi setis tectum.

Lingua truncata, setis terminata.

253. *PARUS cyanus* albo-coeruleoque varius totus. Pallas N. Comm. Petrop. T. XIV. P. I. p. 588. t. 23. f. 2.

P. cyanus, dilute coeruleus subtus albus, uropygio et vertice cano-albidis, cervicis albae fascia lata, humeris tectricibusque caudae coeruleis. Lath. Ind. 1. p. 565.

P. saebyensis corpore caudaque subtus, capillitio, interscapulo, fascia transversali alari, remigumque aliquot albis; cauda superne, macula transversali nuchae, tectricum remigumque nonnullis coeruleis. Mus. Caroll. 1. t. 25.

Parus dorso dilute coeruleo, inferne albus, capite albo, taenia ad oculos et medio abdomine macula oblonga ex atro-coeruleis, fascia alarum media alba. *Lepchin* N. Comm. Petrop. XIV. p. 498. t. XIII. f. 1.

Azure Titmouse, Penn. Arct. Zool. 2. p. 426.

Grosse Mefange bleue, Buff. Av. 5. p. 455.

Habitat in superiore Suecia rarius, nuper ex Rossia advena.

Parus Coeruleo major. *Rostrum* coerulefcit, circa basin dense plumosum. *Tota* *Asis* candida dorso dilute coerulefciente. *Linea* a rostro per oculos versus nucham atro-coerulea. *Nucha* macula lunata coerulea. *Humeri* obscure

obscure coerulei. *Macula pectoris* vel atro-coerulea, vel fusco-nigricans. *Remiges* 18, *primores* fusci interiore margine et ad apices albi, extus cyaneo-perfusi, secundarii apicibus albis. *Fascia* ex tectricibus lata alba. *Alula* nigro-coerulea. *Rectrices* 4 mediae nigro-coeruleae apicum margine albo, reliquae albae versus basin fuscescentes. *Pedes* e nigro coerulefcunt.

Specimina Carlsönianum videtur junior avis macula pectoris nulla, rostro et pedibus fusco-flavicantibus.

254. *PARUS cristatus* capite cristato, collari nigro, ventre albo. L. S. N. XII. T. I. p. 340. Fa. Su. 266. Lath. Ind. 1. p. 567.

P. cristatus. Briss. Orn. 1. p. 466.

The crested Titmouse. Will. Orn. p. 242. Penn. Arct. Zool. 2. p. 427.

Le Mesange kuppe. Buff. Av. 5. p. 447.

Suecis Tolkita, Tofsmysla, *Uplandis* Meshatt, *Scania* Toppmes.

Habitat in sylvis depressis.

Caput varium ex albo et nigro, pennae enim nigrae sunt apicibus albis. *Crista* verticis e pennis majoribus, erectioribus. *Pone oculos nigredo*. *Collare* nigrum. *Dorsum* fusco-cinereum. *Alae* et *Cauda* nigro-cinerea. *Venter* albus pennis introrsum nigris. *Pedes* plumbei.

255. *PARUS major* capite nigro, temporibus albis, nucha lutea L. S. N. XII. T. I. p. 341. Fa. Su. 265.

P. major viridi-olivaceus subtus flavescens, capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. Lath. Ind. 1. p. 562.

Parus major sive Fringillago. Briss. Orn. 1. p. 461.

Great Titmouse or Oxeye. Will. Orn. p. 240.

Grens

Great Titmouse. Penn. Britt. Zool. 1. p. 390. t. 57. f. 1. Arct. Zool. 2. p. 425.

Grosse Mesange ou Charbonniere. Buff. Av. 5. p. 392. t. 17.

Suecis Talgoxe. *Scania* Meshätta, Musweta.

Habitat in sylvis, frigidissima hyeme domos appropinquans.

Caput nigrum splendens. *Genae* albae. *Gula* nigra, quae nigredo genas circumscribit et cum illa capitis jungitur, ac simul appendicem sub collo, pectore et abdomine ejusdem coloris demittit. *Nucha* lutea. *Cervix*, scapularum regio et *Tectrices* alarum superiores luteo-viridis. *Pectus* et *Abdomen* flava. *Remiges* nigricantes margine exteriori albicantes, excepto primo. *Linea* alba transversalis obliqua per alas. *Rectrix* 1. 1. longitudinaliter extrorsum alba, at 6. 6 utrinque coerulefcetes, reliquae extrorsum longitudinaliter coerulefcetes, introrsum nigricantes.

256. *PARUS coeruleus* remigibus coerulefcetibus: primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice coeruleo. L. S. N. XII. T. I. p. 341. Fa. Su. 267.

P. coeruleus olivaceo-virescens subtus luteus, remigibus coerulefcetibus etc. Lath. Ind. 1. p. 566.

P. coeruleus. Briss. Orn. 1. p. 462.

The blue Titmouse or Nun. Will. Orn. p. 242.

Blue Titmouse. Penn. Britt. Zool. 1. p. 391. t. 57. f. 2. Arct. Zool. 2. p. 427.

Mesange bleu. Buff. Av. 5. p. 415.

Suecis Blåmes.

Habitat in Aluetis.

Frens

Frons alba. *Vertex* coeruleus. *Tempora* et *Gula* alba. *Linea* a rostro per oculos versus nucham coit in maculam coeruleascentem, quae collum ambit et gulae maculam nigricantem constituit. *Collare* coeruleum ad latera dilatatum. *Cervix* albicans. *Dorsum* virescens. *Pectus*, *Abdomen*, *Latera* flavescunt; *Abdomen* vero pone albicat. *Remiges* coeruleascentes, *primores* margine exteriori albi, *secundarii* vero apice, unde fascia alarum alba. *Rectrices* nigricantes margine exteriori coeruleascentes 1. 1. margine exteriori albae. *Pedes* plumbei.

257. *PARUS ater* capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo. L. S. N. XII. T. I. p. 341. Fn. Su. 268. Lath. Ind. 1. p. 564.

P. atricapillus. Brill. Orn. 1. p. 464.

Colemouse. Will. Orn. p. 241. Penn. Britt. Zool. 1. p. 392. t. 47. f. 3. Arct. Zool. 2. p. 424.

La petite Charbonniere. Buff. Av. 5. p. 400.

Habitat in Alnetis.

Caput a rostro ad nucham nigrum cum macula alba nuchae. *Tempora* alba. *Gula* et *Sterni* regio nigra. *Pectus* et *Abdomen* albida. *Dorsum* et *Uropygium* cinereo-viridula. *Remiges* 17. fulci, margine interiori albo. *Fascia* duplex alba in alis. *Rectrices* 12 fulcae. *Pedes* plumbei.

258. *PARUS palustris* capite nigro, dorso cinereo, temporibus albis. L. S. N. XII. T. I. p. 341. Fn. Su. 269. Lath. Ind. 1. p. 565.

P. palustris. Brill. Orn. 1. p. 465.

Marsh Titmouse or *Blackcap*. Will. Orn. p. 241.

Marsh Titmouse. Penn. Britt. Zool. 1. p. 395. t. 57. f. 4. Arct. Zool. 2. p. 427.

Mefange

Mefange des Marais ou *Nonette cendrée*. Buff. Av. 5. p. 405.

Suecis *Entita*, *Tomlinge*.

Habitat in Juniperetis.

Rostrum nigrum. *Caput* a rostro ad nucham supra oculos nigrum, infra oculos album. *Gula* alba cum macula deliquescente nigra. *Corpus* supra cinereum fascia alarum nulla alba, *subtus* album ad cinereum vergens, pennis omnibus nigris apicibus tantum candidis. *Remiges* nigricantes margine exteriori albido. *Rectrices* dorso concolores 1. 1. margine exteriori albo. *Tectrices* concolores caudae. *Pedes* plumbei.

259. *PARUS caudatus* vertice albo, cauda corpore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 342.

P. caudatus albo roseo nigroque longitudinaliter varius, vertice albo, cauda longiore. Lath. Ind. p. 569.

Lanius caudatus, cauda elongata, capite hirsuto. Fn. Su. 83. t. 1. f. 84. *Lechei*.

Parus longicaudus. Brill. Orn. 1. p. 469.

The longtail'd Titmouse. Will. Orn. p. 242. Penn. Britt. Zool. 1. p. 394. Arct. Zool. 2. p. 428.

Mefange à longue queue. Buff. Av. 5. p. 436. t. 19.

Suecis *Altita*, *Swansmes*.

Habitat in Alnetis. *Nidus* ovalis a latere versus superiora apertus e muscis, lichenibus lanaque studiose intertextis.

Rostrum nigrum, breve, sed crassum, basi setis vestitum. A rostro ad nucham album *caput* maculis subinde cinereis. A basi superioris mandibulae utrinque linea nigra supra oculos ad nucham, unde fascia nigra longitudinalis ad uropygium. Ad latera hujus in dorso rufescens, quales etiam *Tectrices* superiores caudae. *Ala-*

rum

rum tectrices nigrae. Remiges nigricantes, secundarii margine exterioro albi. Gula et capitis latera alba. Pectus et Abdomen alba cum tinctura rubra. Cauda longa, nigra, at Rectrices 1. 1, 2. 2, 3. 3, margine exterioro et apice interioris lateris albae. Pedes nigri.

At qui in Scania vulgaris totum caput habet cum collo candidum, et ad dorsi initium nigredo quasi palliolium triangulare efficit.

Proportio Rectricum a PENNANT et BRISON diverse describitur. In nostris medium par ceteris longius, reliquis sensim decrefcentibus. Palpebrae luteae vel etiam rubrae.

260. *PARUS biarmicus* vertice cano, cauda corpore longiore capite barbato. L. S. N. XII. T. I. p. 342. Fn. Su. 84. non deser.

Parus biarmicus rufus, vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato, criffo nigro. Lath. Ind. 1. p. 570.

Parus barbatus, Briff. Orn. 1. p. 468.

Parus Rufficus, Gmel. it. 11. p. 164. t. 10.

Bearded Titmouse, Penn. Britt. Zool. 1. p. 396. Arct. Zool. 2. p. 423.

Leaf Butcher-bird, Edw. Av. 2. p. 55. t. 55.

Habitat in superiori Suecia, Mus. Grill.

Mas. Vertex canus. Barba ad utrumque rostri latus nigra, Crifsum nigrum, quibus caret. Foemina, uti etiam carneo pectoris colore. Rostrum fulvum, Supra fulca, subtus cinerascens. Remiges primores nigri margine albo, secundarii fulvo-marginati. Fascia alarum fulva, supra hanc nigra. Cauda cuneata, fordide fulva, reetricibus lateralibus foeminino nigris apice albis.

HIRUNDO.

Rostrum minimum, incurvum, subulatum, basi depressum.

Rictus capite amplior.

261. *HIRUNDO rustica* reetricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis. L. S. N. XII. T. I. p. 343. Fn. Su. 270.

H. rustica, nigro-coerulefcentis, subtus albida, fronte gulaque castaneis, reetricibus lateralibus macula alba notatis. Lath. Ind. 1. p. 572.

H. domestica, Briff. Orn. 1. p. 295.

The common or House Swallow, Will. Orn. p. 212.

Chimney Swallow, Penn. Britt. Zool. 1. p. 398. t. 58. Arct. Zool. 2. p. 429.

L'Hirondelle de Cheminée, Buff. Av. 6. p. 391. t. 25. f. 1.

Suecia Laduswala.

Habitat in domibus intra tectum.

Rostrum nigrum fere triangulare. Nares sublunatae. Frons et Gula rufa. Caput, Dorsum, Uropygium nigra coeruleo-purpurafcentique splendentia. Collam subtus nigrum coeruleo-splendens. Alae et Cauda fusco-nigrae cum nitore purpurei fordidi vel viridulo. Tectrices alarum inferiores albae. Remiges primores 1—9 sensim decrefcentes, at secundarii quo corpore propiores eo longiores; hi emarginati sunt. Pectus, Abdomen et Crifsum alba, in mare cum rubedine. Rectrices omnes praeter 6. 6, macula parva oblonga alba versus apices notatae. Cauda maxime furcata praecipue in mare. Pedes nudi.

262. *HIRUNDO urbana*, reetricibus immaculatis, dorso nigro-coerulefcente, tota subtus alba. L. S. N. XII. T. I. p. 344. Fn. Su. 271. Lath. Ind. 1. p. 573.

- Hirundo minor sive rustica*. Briss. Orn. 1. p. 295.
Martin, *Martinet* or *Martlet*. Will. Orn. p. 213.
Martin. Penn. Britt. Zool. 1. p. 401. Arct. Zool. 2.
 p. 430.
L' Hirondelle au croupion blanc ou de Fenetre. Buff. Av.
 6. p. 614. t. 25. f. 2.
 Suecis Husfwala.

Habitat sub margine tecti e summo pariete extra domum.

Rostrum prioris. Nares subrotundae. Corpus supra nigrum, sed caput et dorsum ex coeruleo splendent. Uropygium album. Subtus tota alba. Remiges fusci, primores acuti, secundarii emarginati. Rectrices fuscae immaculatae, exteriores sensim longiores, ita, ut cauda sit minus quam in praecedente furcata. Pedes alba lana usque ad digitos vestiti.

263. *Hirundo riparia cinerea*, gula abdomineque albis. L. S. N. XII. T. I. p. 344. Fn. Su. 273. Lath. Ind. 1. p. 575.
Hirundo riparia sive Drepanis. Briss. Orn. 1. p. 299.
Sand Martin or *Shorebird*. Will. Orn. p. 213.
Sand Martin. Penn. Britt. Zool. 1. p. 402. Arct. Zool. 2. p. 430.
L' Hirondelle de rivage. Buff. Av. 6. p. 632.
 Suecis Strandfwala, Bachfwala, Jordfwala.

Habitat sub terra in abruptis littoribus, monticulis arenosis sepibusque terreis, ubi fodit cuniculos horizontales profundos.

Rostrum priorum. Tota supra cinereo-murina, subtus alba, pectore obfuscatum et gulae annulo cinereo. Pedes nudi, at ad exortum digiti pollicis plumulae nonnullae.

264. *Hirundo Apus nigricans*, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. L. S. N. XII. T. I. p. 344. Fn. Su. 272. Lath. Ind. 1. p. 582.
H. Apus. Briss. Orn. 1. p. 301.
The black Martin or *Swift*. Will. Orn. p. 214.
Swift. Penn. Britt. Zool. 1. p. 403. t. 53. Arct. Zool. 2. p. 432.
Le Martinet noir. Buff. Av. 6. p. 645.
 Suecis Ringswala.

Habitat in turribus, templis, arcibus, nec non in sylvis cavisque arborum. Falcones tenacissime persequitur sono acuto sibilante.

Major ceteris, fulco-nigricans. Gula alba. Mystaces nullae. Alae longissimae. Cauda forcipata rectricibus tantum decem. Pedes breves, rufi, carnosii, digitis omnibus antice versis, intimo brevissimo.

CAPRIMULGUS.

- Rostrum modice incurvatum, minimum, subulatum, basi depressum.
 Vibrissae ad os serie ciliari.
 Rictus amplissimus.
 Lingua acuta, integerrima.
265. *CAPRIMULGUS europaeus* varium tubulis obsoletis. L. S. N. XII. T. I. p. 346. Fn. Su. 274.
C. europaeus niger cinereo fulco ferrugineo et albo variis subtus albo-rufescens fasciis fuscis. Lath. Ind. 1. p. 584.
Caprimulgus. Briss. Orn. 1. p. 289.
The Fernowl, or Churn Owl or Goatsucker. Will. Orn. p. 197.
Nocturnal Goatsucker. Penn. Britt. Zool. 1. p. 416. Arct. Zool. 2. p. 437.

L'Engoulevent. Buff. Av. 6. p. 512.

Sueciis Nattkröfwa, Nattkärria. Smolandis Quällknarren. Scanis Halslefrö, Nattwäg, Nattblacks, Hotsök, *Ostrobothnienfibus*, Kärrgylta.

Habitat ubique in Suecia. Nocte sola exit; proditur facile in furro continuo tremulo. Nidificat ad prærupta uabrolaque montium latera. *It. Westrogoth.* In sole caecutit fere. Integros Scarabæos ferocerrarios et Melolonthas deglutit.

Magnitudo Cuculi. Caput depressum, ratione corporis magnum. Aures amplae. Rostrum tenue, nigrum. Fauces amplissima, decies rostri hiatus amplior. Lingua minima, acutissima, integerrima, palato affixa. Nares prominentes cylindro elevato. Corpus supra ex nigro, albo, cinereo et ferrugineo tenuissime undulatum mixtis variegatum; huic colori maculae parvae longitudinales nigrae aspersae. Abdomen pallide testaceum undulis crassioribus nigris. Pectus iisdem undulis, sed minoribus. Remiges 20 latere exteriori nebuloso-variegati. Cauda longa, integra, rectricibus 10. Pedes breves, antico hirsuti. Unguis intermedius latere interiori dentibus sex pectinatus.

Mas gaudet macula magna alba fere in medio remigum trium priorum, et apices rectricum 1. 1, 2. 2 albae sunt, quibus notis caret foemina.

AVES ULTERIUS DETERMINANDAE.

266. FRINGILLA candida plumis ac pennis omnibus, rostro pedibus digitisque albis. Mus. Carlsf. 1. t. 20.

Fringillae domesticæ forsitan varietatem credit *Celex*. SPARRMAN, at rostri crassities dubium me facit, æquo ac tota avis magnitudo.

267.

267. EMBERIZA in sylva Hörhyensii Scaniae mense Iunio 1765 occisa, tuncque descripta, dein haud visa.

Mandibulae inferioris margo inflexus. Lingua bifida. Caput, Collum cinereo-virescentia. Dorsum et Uropygium viridi-flava. Gula et Pectus dilutissime carnea. Venter albo-cinereascens. Remiges latere interiori albo, exteriori luteo, 1 — 3 sine albedine, 4 — 5 etc. dimidiato-albi. Tectrices ultimæ nigro-fuscae margine albo, penultimæ totae albae. Rectrices nigrae, at 1. 1, oblique dimidiato-albae margine interiori fusco, 2. 2, macula oblongo-lanceolata alba, 3. 3, unicolores, 4. 4, margine interiori virescente.

268. MUSCICAPA alba tota alba, capite sulphureo-flavicante. Mus. Carlsf. 3. t. 74.

Varietas procul dubio est, sed vix ad notas in Suecia Muscicapas reducenda. Facies Motacillae.

269. FALCO lapponicus supra subferrugineo-fuscus, subtus dilute ochraceus, crisso albo, pedibus cinereis nigro-punctatis, rostro et unguibus nigris. Mus. Carlsf. 5. t. 101. SPARRMAN in litteris.

ADDENDAE.

270. ANAS Canadensis supra cinerea, subtus et capite albo, nucha, collo, cauda, rostro pedibusque nigris. *A. canadensis* cinerea, capite colloque nigris, genis gulaque albis. L. S. N. XII. T. I. p. 198. Lath. Ind. 2. p. 838.

Canada Goose. Will. Orn. p. 276. Penn. Arct. Zool. 2. p. 544. Edw. Av. 3. t. 151.

Oie à cravate. Buff. Av. 9. p. 82.

Habitat — Specimen vidi captum in Scania 1798 sub nomine *Graggär*, quod sine dubio ad Anatem Canadensem

dentem pertinet, at colore a descriptione *Pennanti* et *Latham* diversum, ut etiam ab iconis *Edwardsiana*. An sexu vel aetate diversum? Facile culturam patitur.

Magnitudo Anseris domestici minoris. *Rostrum* et *Pedes* atrii. *Caput* album. *Nucha* nigra, quae nigredo cum nigredine colli jungitur. *Toto* subtus alba. *Dorsum* et *Alae* canae fasciis nigricantibus vel testaceis. *Remiges* versus apices nigri. *Uropygium* et *Rectrices* nigrae, at caudae *Tectrices* albae.

271. *Larus minutus* niveus, capite nigro, alis leucophaeis, pedibus coccineis. *Lath. Ind.* 2. p. 815. *Pallas it.* 5. p. 702. *N. Act. R. Ac. Suec.* 1783. p. 121.

Habitat in mari Balthico ad Gotlandiam rarius. *Com.*
H. G. Wachtmeister.

Magnitudo *Sternae ôigrae*. *Rostrum* fulco-rubrum. *Caput* nigrum. *Dorsum* et *Tectrices Alarum* canescentes, alia leucophaeis, reliquum corpus album. *Cauda* aequalis.

AMPHIBIA SVECIAE.

AMPHIBIA SVÆCIAE

Reptilia.

1. Rana Bufo.
2. — Bufina.
3. — Rubra.
4. — Bombina.
5. — Porosifera.
6. — Campanulosa.
7. — Temporaria.
8. — Esculentata.
9. — Arborea.
10. Lacerta palustris.
11. — Triton.
12. — porosa.
13. — astatica.
14. — vulgaris.
15. — agilis.

Serpentia.

16. Coluber ferruginosus.
17. — Berus.
18. — Cherses.
19. — Presler.
20. — Natrix.
21. Anguis Eryx.
22. — fragilis.

III.

A M P H I B I A .

1. R E P T I L I A .

R A N A .

Corpus tetrapodum, nudum, caudatum.

1. RANA *Bufo* corpore ventricoso, verrucoso, lurido fuscoque, capite obtuso, pustula pone oculos oblonga. Müll. Prodr. Zool. Dan. 292.

R. *Bufo* corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque L. S. N. XII. T. I. p. 354. Fn. Su. 275.

Bufo vulgaris cinereo-plumbeus, turgens, tuberculis rubellis exasperatus, supra regionem aurium utrinque prominentia mollis reniformis. Laur. Syn. p. 28.

Bufo terrestris dorso tuberculis exasperato, oculis rubris. Roef. H. Ran. p. 85. tab. 20.

Toad, Penn. Britt. Zool. 3. p. 14. append. p. 379.

Suecis Padda. Smolandis Tossa. Scanis Pugga.

Habitat in umbrosis frigidis humidisque, sub sessate lubenter vaporaria intrans hortorum. Sub umbra Acteae et Cotulae foetidae praesertim delectari creditur.

Manus tetradactylae fissae, digitis subaequalibus. Palmae pentadactylae cum tuberculo sexti digiti rudimentum mentiente, semipalmatae. Corpus luride fuscum maculosum verrucosum. Pustula pone oculos ele-

vata

vata oblonga. Gula flava, Abdomen ventricosum, pallidum, maculis nigris aspersum, uti et ipsa femora fusca.

Inter *Bufonem terrestrem* et *aquaticum* distinguit GOETZE, hunc in aqua, illum in terra ova deponere, ex quibus, scil. *terrestris*, pullos caudatos prodire asserit. vide ejus *Natur, Mensch. und Vorseh.* P. VI. pag. 455.

2. RANA *Bufo* corpore verrucoso supra subcarneo maculis olivaceis nigro-marginatis — punctatisque: subtus fordide albo, pustula pone oculos sinuata.

R. *Bufo* corpore subverrucoso griseo, supra maculis virentibus, capite simo, pustula pone oculos sinuata. Müll. Prodr. Zool. Dan. 293.

Bufo viridis, maculae virides confluentes, verrucis macularum concoloribus, intervallorum rubris, intermediis bicoloribus. Laur. Syn. p. 27. t. 1. f. 2.

Bufo Schreberianus carnosus, lineis radiatis viridibus. Laur. Syn. p. 27. Roef. p. 108.

Grönsläckad Groda. Sparman N. Act. R. Ac. Suec. 1795. p. 185. t. 7.

Habitat in Sueciae inferioris frigidis umbrosis. In vaporariis hortorum odiosa.

3. RANA *Rubeta* corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato, L. S. N. XII. T. I. p. 355. Fn. Su. 276.

Rana manibus tetradactylis fissis, plantis pentadactylis subpalmatis. It. Westrog. p. 261.

Habitat in Wermelandia; in horto Drotningholmensi post pluvias frequens.

Nondum vidi, et nemo, quantum scio, praeter à LINNÆ illam descripsit. Generos. autem Itin. Westrog. auctor juniores tantum vidit et forte primi aani pullos. Cum jam plurimum colore variant secundum aetatem

Ranae

Ranae, incertum omnino est, an revera propria sit species quam descripsit. Nonnulli *Bufoem igneum* Roef. huc referunt, at perperam.

4. *RANA bombina* corpore verrucoso, abdomine albo flavoque nigroque maculato, plica gulari, L. S. N. XII. T. I. p. 355. Fn. Su. 277.

R. bombina, corpore verrucoso, abdomine aurantio-caesio maculato, pupilla triquetra, Blumenb. Handb. ed. III. p. 262.

Bufo igneus supra terreo-olivaceus maculis nigris, infra albido-coeruleis punctatus maculis lacte miniatis, Laur. Syn. p. 29. Roef. H. Ran. p. 97. t. 22. 23.

Habitat in paludosis, Sonus cachinnans.

Minor ceteris Ranis verrucosis, dignoscitur colore subtus.

5. *RANA portentosa* corpore verrucoso, linea dorsali flava, lateralibus rufescentibus, Blumenb. Handb. ed. III. p. 262.

Bufo calamita, dorsum coloris olivacei, pustulis subrotundo-fascis, concinno ordine digestis, media linea sulphurea divisum; latera taenia inaequali lucida, ex rubro flavescente, Laur. Syn. p. 27.

Bufo terrestris foetidus, Roef. H. Ran. p. 107. t. 24.

Habitat in latebrosis, cellis etc. lucem fugiens. Nocte exit. Digiti fissi.

6. *RANA campanifona* corpore pustuloso cinereo-livido, abdomine pallido, inguinibus rugosis.

R. campanifona cinereo-lividus, vesiculis aspersus; dorso utriusque limbo tereti longitudinali a lateribus distincto; abdomine pallido; inguinibus rugosis, Laur. Syn. p. 30.

Suecis

Suecis Klockgröda, Korngröda. *Scanis rufficis* Söderpumpor. *Danis* Peder Oxen Fröer, a Nobili Dano Peder Oxen, qui speciem in Dania et dehinc in Scania antea ignotam plantavit.

Habitat in Scaniae campestris variis locis, in sylvestri rarior. Sonus campanarum longinquus.

Hanc proprie sub nomine *Ranae bombinae* intellectam voluit *b. a. LINNÆ*, at cum sub ejus nomine quartam speciem descripserit, ne nova oriretur confusio, nomen retinui LAURENTI, aptius mihi visum.

7. *RANA temporaria* corpore laevi, dorso planiusculo subangulato, lituris, temporibus femorumque fasciis tribus fascis.

R. temporaria dorso planiusculo subangulato, L. S. N. XII. T. I. p. 357. Fn. Su. 278.

R. mata color ruffo-fuscus; macula oblonga nigra inter oculos et pedes anteriores; crura fusco-fasciata, Laur. Syn. p. 30.

R. fusca terrestris, Roef. H. Ran. p. 1. t. 1 — 8.

Common Frog, Penn. Britt. Zool. 3. p. 9.

Suecis Groda. *Scanis plebejis Smolandisque* Frö. *Ostrobothnis* Kloffa.

Habitat ubique in aquis et fossis vere, aestate et autumno terrestris.

Manus tetradactylae, digito 2 et 4 brevior. *Plantae* pentadactylae semipalmatae, digito 1, 2, 3, 4 sensim longioribus, 5^a longitudine tertii. *Callus* sextum mentiens. *Dorsum* planum, supra femora bigibbum, distinctum lateribus utrinque linea elevata pallida ab apice rostri per palpebram superiorem versus anum. *Macula* pone oculos longa postice acuta fusca, pallide marginata. *Corpus* pro aetate vel fusco-subrufum vel cinereo-lividum,

dum, lituris nigris pictum. Femorum fasciae tres latae. Adulto mari maculae abdominis griseae, foeminae flavae rubentesque.

Falso et muta dicitur et temporaria. quod neque coaxaret, nec diu viveret.

8. *RANA esculenta* corpore laevi viridi nigro-maculato, linea dorsii lutea triplici, lateralibus elevatis.

R. esculenta corpore angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato. L. S. N. XII. T. I. P. 357. Fn. Su. 279.

R. esculenta corpore supra viridi, dorsii medio depresso lineaque longitudinali lutea. Müll. Prodr. Zool. Dan. 297.

R. esculenta viridis, maculis nigris; ore elongato; dorso linea longitudinali lutea triplici angulato. Laur. Syn. p. 31.

R. viridis aquatica. Roef. H. Ran. p. 53. t. 13 — 16.

Edible Frog. Penn. Britt. Zool. 3. p. 13.

Sueci Källfrö.

Habitat in fossis paludibusque scaturiginosis.

Manus et Plantae praecedentis. *Corpus* supra viride maculis nigris, ab apice oris ad anum linea lutea. Linea elevata subflava utrinque ab oculo incipiens dorsum depresso supra femora bigibbum includit. Subtus pallida maculis nigris.

9. *RANA arborea* corpore laevi, subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato-dilatatis. L. S. N. XII. T. I. p. 357. Fn. Su. 280. Roef. H. Ran. p. 37. t. 9 — 12.

Hyla viridis supra virens, infra albicans, utroque latere linea flava. Laur. Syn. p. 53 et 158.

Sueci

Sueci Hålselfrö.

Habitat in locis humidiusculis, primo vere in stagnis.

LACERTA.

Corpus tetrapodum, caudatum, nudum.

10. *LACERTA palustris* dorso laevi, corpore verrucoso, cauda lanceolata ancipiti, pedibus muticis fissis, antecis tetradactylis, posticis pentadactylis, digitis omnibus teretibus.

L. palustris cauda lanceolata mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 379.

L. palustris cauda ancipiti lanceolata, pedibus muticis fissis, manibus tetradactylis. Fn. Su. 281.

Triton palustris, corpore glabro; gula laevi maculis characteriformibus; abdomine rotundo; dorso supra plano, utrinque obtuse angulato; digitis teretibus. Laur. Syn. p. 59. t. 4. f. 2.

Warty Lizard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 25.

Sueci Wattnödla. Dalekarlis Skrotabborre, Skratlaborre. *Persbergensibus* Grufgrabbe.

Habitat in fossis, piscinis et aquis stagnantibus.

In annosioribus saltem *corpus* undique aspersum verrucis parvis densis. *Digiti* omnes teretes apice rotundati. *Crista* in dorso absolute nulla (*Maris* dorsum cristatum verno tempore *F. A. A. Meyer*). *Animal* supra fusco-luridum, *subtus* fulvum maculis nigris. Sub gula *plica* retroversa, quae latera colli ascendit. *Pori* nulli laterales. In pedibus foeminae ororum plenae duo puncta elevata vel gibberes duo parvi quasi rudimenta tot digitorum vidi, quos in alio specimine, in mare? non observavi. Majo mense apud nos ova ponit.

11. *LACERTA Triton* dorso carinato, corpore glabro, cauda lanceolata, digitis anticis quaternis teretibus, posticis quinque lobatis.

Triton cristatus, corpore spongioso nigrescente, maculis rotundis atris; gula hispida; cauda glabra, punctata, utrinque taenia alba longitudinali. Laur. Syn. p. 39?

Triton parifinus ibid. p. 40.

Habitat in fossis, stagnis, piscinis.

Cinerea, abdomine pallidiore, undique etiam in crista dorsi, quae pone oculos incipit, maculis nigris rotundis sub gula angulatis. *Crista* margine dentato-repanda. *Digitis* palmarum 4 teretes, acuti cum rudimento quinti, plantarum 5 etiam acuti, sed membrana dilatata, avium pedibus lobatis instar, circumdati, et praeterea rudimentum sexti digiti.

Haec mas erit praecedentis secundum à Linnæ, an recto?

12. *LACERTA porosa* dorso cristato, corpore verrucoso ad latera serie utrinque pororum, cauda lanceolata ancipiti, pedibus muticis fissis, digitis omnibus teretibus.

Habitat cum praecedente.

Palustri forma, magnitudine, verrucis, colore similis, sed in dorso crista serrata, quae inter oculos incipit et in caudam excurrit, ibi licet dentes evanescant. *Plica* gularis similis, at sub axillis incipit linea pororum pertusorum, quae abdomen longitudinaliter usque ad femora cingit. *Mandibula* inferior binis pororum similium seriebus cingitur. Hinc diversa mihi videtur.

13. *LACERTA aquatica* cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis, palmis tetradactylis. L. S. N. XII. T. I. p. 370.

L. aquatica cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis fissis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. Fn. Su. 282.

Habitat in aquis quietis.

14. *LACERTA vulgaris* cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis, palmis tetradactylis, dorso linea duplici fusca. L. S. N. XII. T. I. p. 370.

L. vulgaris cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis fissis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. Fn. Su. 283.

Brown Lizard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 24. t. 2. f. 9.

Habitat inter plantas et sub lapides vulgaris.

Pallide livida, a capite utrinque secundum dorsum linea fusca excurrit. *Abdomen* flavescens, interdum nigra maculis conspersum. *Cauda* teretiuscula, longitudine corporis.

15. *LACERTA agilis* cauda verticillata longiuscula, squamis acutis, collari subtus squamis constructo. L. S. N. XII. T. I. p. 363.

L. agilis cauda verticillata longiuscula, squamis acutis, collari subtus squamis articulo. Fn. Su. 284.

Succi Ödla, alias etiam Fyrfot, Fyrben.

α. cinerea immaculata.

β. fusca, lateribus serie macularum obsoletarum.

Seps terrestris collari soluto, scutia intermediis subrotundis; corpore fusco; utrinque serie macularum obsoletarum. Laur. Syn. p. 61.

γ. fusca nigro-lineata, serie duplici dorsali macularum flavarum, ventre flavo.

Scoly Lizard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 21. t. 2. f. 7.

δ. coeruleo-cinereo-nitida, dorfi fascia fusca maculis subquadratis nigris, utrinque lineola alba articulata, laterum ocellis nigris, pupilla alba.

Seps coeruleus, collari soluto; scutis intermediis subrotundis; corpus coeruleo-margaritaceum; latera ocellata triplici utrinque serie. Laur. Syn. p. 62. et 171. t. 1. f. 5.

ε. cinereo-fusca punctis albis nigrisque contiguis, subtus flavo-aurea punctis nigris. Müll. Pr. Zool. Dan. 299. c.

ζ. viridis punctis nigris, subtus flavescens.

Seps viridis collario soluto coeruleo; scutis intermediis subrotundis; corpore elegantissime viridi. Laur. Syn. p. 62. 175.

Rusticus Scandin Springorm.

Habitat in terra, sub lapides, in muris, praesertim sylvestribus locis.

Squamarum abdominalium series sex. Collare subtus squamis septem majoribus. Femora subtus serie squamarum puncto calloso obditarum. Elegans et agilissimum animal.

2. SERPENTIA.

COLUBER.

Scuta abdominalia.

Scutella subcaudalia.

16. *COLUBER ferruginosus*, ferrugineo-cinereus, occipitali macula magna cordata, dorfi serie duplici macularum, lineisque suboculari extensa brunneo-notatus; squamulis ovatis planis. *Sparrman* N. Act. R. Ac. Suec. 1795. p. 180. t. 7.

Coronella austriaca ex cinereo coeruleo-ruffa; maculis dorfi alternis distinctis. Laur. Syn. p. 84. t. 5. f. et p. 184.

Habitat in superiore Suecia.

Supra ferrugineo-cinereus serie duplici macularum alternarum fulco-hepatica, squamis margine puncto solitario vel duplici, minime carinatis. Macula cordata fulco-hepatica nuchae. *Scuta* 165 — 183. *Scutella* 58 — 48.

17. *COLUBER Berus*, chalybeus, taenia dorsali fulminata nigra.

C. Berus scutis abdominalibus 146, squamis caudae 39. L. S. N. XII. T. I. p. 377. Fn. Su. 236. Amoen. Acad. T. I. p. 115.

C. Berus, fulco-canescens, vitta dorsali atra, dentata, repanda. Müll. Pr. Zool. Dan. 304.

Anguis cinerea, macula dorso fusca longitudinali dentata, Act. Soc. Upsal. 1736. p. 11. 4.

C. Berus s. corpore cinereo (foeminae) ex fulco-ruffo (mari); taenia dorsali nigra fulminata, utrinque

punctis alternis; cuique sinui respondentibus nigris. Laur. Syn. p. 97 et 192. t. 2. f. 1.

Viper. Penn. Britt. Zool. 3. p. 26. t. 4. f. 12.

Suecis Huggorm.

Habitat in Suecia frequens, morfu venenato notus.

Corpus chalybeum. Dorsum longitudinaliter tegitur macula lineari fusca vel nigra utrinque dentata; ad latera hujus macula coerulescens singulo denticulo dorsalis taeniae interjecta. Venter interdum purpureus, saepius chalybeus cum puncto nigro ad apicem singulae squamae. Gula pallida. Labium superius secundum marginem album est. Oculorum iris flammea, pupilla nigra. Angulus acutus coerulescens taeniam dorsalem a capite distinguit.

18. COLUBER *Chersea* rufescens, taenia dorsali tessellata fuliginosa.

C. Chersea scutis abdominalibus 150, squamis subcaudalibus 34. L. S. N. XII. T. I. p. 377. Fn. Su. 285. Act. R. Ac. Suec. 1749. p. 249. t. 6. f. 1. 2.

C. Aspis corpore rufo macula capitis lineaque dorso serrata ferruginea. Müll. Prodr. Zool. Dan. 303.

C. Chersea squamis carinatis; capite a narium limbo ad usque oculos squamulis albis, fronte macula cordiformi, magna, et dorsalibus rotundis ad nucham confluentibus, reliquis cohaerentibus in taeniam continuam rectam; colore corporis ferrugineo, macularum atro; scutis abdominalibus latissimis. Laur. Syn. p. 97.

Suecis Alping.

Habitat in Smolandiae Salicetis, forte et alibi, morfu prioris magis venenato.

Lon-

Longitudo Spithamæ, crassities ad summum pennae cygneae. *Pictura* fere praecedentis, at color taeniae fusco-ferrugineo-fuliginosus. *Subtus* chalybeus ad rufum tendens.

19. COLUBER *Prefter* totus niger.

C. Prefter scutis abdominalibus 153. Squamis caudalibus 52. L. S. N. XII. T. I. p. 377. Fn. Su. 287.

C. Vipera Anglorum corpore toto aterrimo immaculato; squamis lanceolatis, carina longitudinali inscriptis, labiis punctis albis nigrisque variatis. Laur. Syn. p. 99. t. 4. f. 1. et p. 188.

Smolandis Bole.

Habitat in sylvis rarior.

Corpus atrum; squamis 21 ordinum, subcarinatis, lanceolatis; lateralibus ovatis, distinctis cute nigra, quae dum contrahitur rugis albo-reticulata apparet inter squamas. Cauda brevissima. Os armatum veneno diro. In Austria fere innocuus videtur, modo experimenta Laurenti sufficiant.

20. COLUBER *Natrix* supra niger, subtus chalybeus submaculatus, colli maculis duabus flavescens.

C. Natrix scutis abdominalibus 170, squamis caudalibus 60. L. S. N. XII. T. I. p. 380. Fn. Su. 288.

C. Natrix corpore nigro, macula alba utrinque ad collum. Müll. Prodr. Zool. Dan. 305.

Natrix vulgaris, ex cinereo-coerulescente nigricans; ad occiput utrinque macula albo-lutea, quae a nigra excipitur; media in nucha inter priores cum oppo-

opposita confluyente; scutis abdominalibus lingu-
lis utrinque macula squamiformi. Laur. Syn. p. 75
et p. 180.

Ringed Snake. Penn. Britt. Zool. 3. p. 33. t. 4. f. 13.

Suecis Tomtorm. Scanis Snok, Ormflå. Smolandis
Ringorm.

Habitat in Suecia ubique vulgaris. Coitus tempore
hostem adgreditur mordicus, et veneni expertus,
alias mitis. Ipsas rusticorum aedes inhabitant.

Corpus nigrum. *Latera* ventris notata albis macu-
lis seu squamis ventralibus ad latera albis. *Gula* alba.
Aurium regio flavescens. *Tempora* alba lineis nigris
transversis. *Dentes* duplici ordine aequales. *Dorsum*
squamae stria in medio elevata. *Variat color;* aliis
squamae dorsum cinerea apice hinc inde nigricante (in
junioribus); aliis squamae omnes nigrae (in adultiori-
bus). *Nares* non prominent. *Aliis* aurium regio con-
vexa, nigricans, macula magna alba. *Venter* chaly-
beus, saepe maculatus, nitens. *Tela* nulla.

A N G U I S.

Squamae abdominales et subcaudales.

21. *ANOTIS Eryx* dorso pallide testaceo, lateribus cu-
preis, abdomine chalybeo, linea dorsali binisque
lateralibus nigris.

A. Eryx squamis abdominalibus 126, subcaudalibus
136. L. S. N. XII. T. I. p. 392.

Anguis fragilis corpore subaequali, glaberrima, ni-
tens, aureo-fulca; macula frontis cervicisque,

ex

ex quibus duae lineolae subcontiguae longitudina-
les. Laur. Syn. p. 68. t. 5. f. 2. et p. 178.

Blindworm. Penn. Britt. Zool. 3. p. 36. t. 4. f. 15.

Ormflåen. it. Gottl. p. 306.

Suecis Ormflå.

Habitat in sylvestribus pratis Smolandiae, Scaniae,
Gottlandiae.

A variis Auctoribus cum sequente confunditur,
fragilis etiam, sed multo minus.

Craffiti vix minimi digiti. *Longitudo* ad 13 usque
pollices, caudaque tum 7, corpus cum capite 6. *Dorsum*
fascia lata pallide testacea, quae duabus lineis nigris ab
oculis in apicem caudae decurrentibus includitur, et a
tertia, quae in cervice incipit, et non raro si attente
inspiciatur fulminata est, dividitur. *Laterum* cuprea. *Ab-*
domen chalybeum; inter haec non raro utrinque linea
pallida et alia abdomini concolor. Interdum totum ab-
domen pallidius et lineis densis chalybeis percursum,
quae variationes videntur mihi pendere ab aetate epi-
dermidis, quam quotannis exuere serpentes dudum
jam notum est. In nuper exuvias depositi animalis
abdomine color plane niger; in abdomine vero aequae
ac lateribus squamarum margines quasi flocco albe-
scente adglutinato circumdantur, vel ciliati in abdo-
mine magis perspicue adparent. *Linea*, quae in cer-
vice incipit, ibi saepius antice bifurca, et haud raro
pone hanc divisuram annulus annectitur parvus,
ex quo linea dein pergit. Squamae tuto haud nume-
rabiles.

22. *Anguis fragilis*, totus cupreus.

A. fragilis squamis abdominalis caudaeque 135. L. S.
N. XII. T. I. p. 392. Fn. Su. 239.

Succis Kopperorum.

Habitat in pratis sylvaticis frequens.

Crassities pennae ansetinae. *Longitudo* 6 — 8 pol-
licum. *Fragilis* adeo, ut altero sine detectus proprio
nifu saepe diffilit. Descripti olim, at schedam perdidit.
Abdomen plumbeum?

PISCES SVECIAE.

PISCES SVEOLAE

1. *Chondrodei.*

1. Myxine glutinosa.
2. Petromyzon marinus.
3. — — fluviatilis.
4. — — branchialis.
5. Raja Pastinaca.
6. — clavata.
7. Squalus Acanthias.
8. — Spinax.
9. — Canicula.
10. — Carcharias.
11. — glaucus.
12. Pristis antiquorum.
13. Chimæra monstrosa.
14. Lophius piscatorius.
15. Acipenser sturio.
16. — turbenus.
17. Tetradon Mola.

2. *Enchelones.*

18. Ophichthus Anguilla.
19. Syngnathus Typhle.
20. — — Acus.
21. — — Ophidion.
22. Callionymus Lyra.
23. — — Draculus.

3. *Apodes.*

24. Anmodytes Tobianus.
25. Anethicus Lupus.
26. Ophidion imberbe.
27. Xiphias Gladius.

4. *Inguulares.*

28. Trachinus Draco.
29. Gadus Aeglefinus.
30. — Callarias.

31. *Gadus Morrhua.*

31. — barbatus.
32. — minorus.
33. — virens.
34. — Merlangus.
35. — Carbonarius.
36. — Pollachius.
37. — Merluccius.
38. — Melva.
39. — Lora.
40. — Muebla.
41. — ciabrus.
42. — Brome.
43. Biennius Gunnellus.
44. — viviparus.
45. — raninus.

5. *Thoracici.*

46. Gobius Ruthenparri.
47. — niger.
48. — Iora.
49. Cyclopterus Lumpus.
50. Cottus caspeticus.
51. — quadricornis.
52. — Bubalis.
53. — Scorpius.
54. — Gobio.
55. Pleuronectes Hippoglossus.
56. — — Platessa.
57. — — Flesus.
58. — — Limanda.
59. — — Solca.
60. — — Lingustula.
61. — — Rhombus.
62. — — maximus.
63. — — Passer.
64. — — hirtus.

66. Labrus fuillus.	96. Salmo Eperlanus.
67. — exoletus.	97. — Lavanerus.
68. — aper.	98. — Albula.
69. Perca fluviatilis.	99. — Thymallus.
70. — Lucioperca.	100. — Wimba.
71. — Norvegica.	101. Efox Lucius.
72. — maculosa.	102. — Belone.
73. — rupestris.	103. Glupea Harengus.
74. — cernus.	104. — Sprattus.
75. Gasterosteus aculeatus.	105. — Alofa.
76. — — pungitius.	106. — Encrasicolus.
77. — — Spinschia.	107. Cyprinus Carpio.
78. Scomber Scombrus.	108. — Tinca.
79. — — Thynnus.	109. — Gobio.
80. — — Trachurus.	110. — Carassius.
81. Mullus Surmuletus.	111. — Phoxinus.
82. Trigla Gurnardus.	112. — Aphya.
83. — Cuculus.	113. — Dobula.
84. — Hirundo.	114. — Grialagine.
	115. — Idbarus.
6. <i>Abdominales.</i>	116. — Rutilus.
85. Cobitis Barbarula.	117. — Idus.
86. — Tarnis.	118. — Erythrophthalmus.
87. — fossilis.	119. — Aspius.
88. Silurus Glanis.	120. — Alburnus.
89. Salmo Salar.	121. — Wimba.
90. — Eriox.	122. — Brama.
91. — Trutta.	123. — cultratus.
92. — Fario.	124. — Bioerkna.
93. — alpinus.	125. — Farenus.
94. — Goedenii.	126. — Ballerus.
95. — Schiefermulleri.	127. Lampreis guttatus.

OR-

ORDINES PISCUM.

Pisces	Branchiis occultis	Spiraculis nudis.	1. CHONDRODEL.
		Operculis adnatis.	2. ENCHELARES.
		Pinnis Ventralibus nullis.	3. AFODES.
	Branchiis apertis.	Pinnis Ventralibus ante P. Pector.	4. JUGULARES.
		Pinnis Ventralibus sub P. Pector.	5. THORACICI.
		Pinnis Ventralibus post P. Pector.	6. ABDOMINALES.

IV.

PISCES.

1. CHONDRODEL
MYXINE.

Os inferum longitudinale.

Maxillae 2 pinnatae.

Spiracula 2 sub abdomine, ad initium caecae.

Cirri VIII.

Oculi nulli.

Pinna unica adiposa.

1.

1. *MYXINE glutinosa*. N. Act. R. Ac. Suec. 1790. p. 110. t. IV. Berlin. Schrift. N. Fr. X. B. 2. ff. p. 193. t. 4. et p. 244.
Gastrobranchus coecus, Bloch. Pisc. Extr. P. IX. p. 67. t. 412.
Myxine glutinosa, L. S. N. XII. T. I. p. 1080. Fn. Su. 2086. Mus. Ad. Frider. p. 91. tab. 8. f. 4. Penn. Britt. Zool. IV. p. 35. t. 20. f. 15.
Sleepmarken. Gunner. Act. Nidros. 2. p. 250. tab. 3.
Steenfaer. Olav. Shagens Belkr. p. 156. t. 3. f. 3. 4.
 Suecis Blindäl. Putäl

Habitat in Mari occidentali. Num plures species? ita ex diversitate iconum suspicari licet.

Alios pisces intrat per branchias vel anum et devorat, mucumque copiosissimum relinquit, quem ex omni fere apertura emittit.

P E T R O M Y Z O N.

Spiracula VII ad latera colli.
Fistula in cervice.
Os subtus, longitudinale.
Pinnae pectorales aut *ventrales* nullae.

2. *PETROMYZON marinus*, ordinibus dentium pluribus. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 38. t. 77.
P. marinus ore intus papilloso, pinna dorsali posteriore a cauda distincta. L. S. N. XII. t. 1. p. 394. Fn. Su. 292.
P. maculosus, ordinibus dentium circiter viginti. Art. Gen. 64. Syn. 90.
Lampetra. Will. ichth. p. 105.
Sea Lamprey. Penn. Britt. Zool. 3. p. 76. t. 8. f. 27.
 Habitat in Mari occidentali, Baltico et Fretto Öresund rarius.

Abdo-

Abdomini *Squali maximi* se affigit illumque non nisi mortuum deserit. GUNNER. Act. Nidros. IV.

3. *PETROMYZON fluviatilis* ordine dentium unico. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 41. t. 78. f. 1.
P. fluviatilis pinna dorsali posteriore angulata. L. S. N. XII. T. I. p. 394. Fn. Su. 290.
P. unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris praeter inferiores majores. Art. Gen. 64. Syn. 89. Spec. 99.
Lampetrae medium genus. Will. ichth. p. 106.
Lesser Lamprey. Penn. Britt. Zool. 3. p. 79. t. 8. f. 28.
 Suecis Neinöga. *Westrobothniensibus* Nätting.
 Habitat in variis fluviis Sueciae, praesertim Ostro- et Westrobothniae.

4. *PETROMYZON bronchialis* corpore annulato, ore lobato. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 45. t. 78. f. 2.
P. bronchialis pinna dorsali posteriore lineari, labio oris posteriore latere lobato. L. S. N. XII. T. I. p. 394. Fn. Su. 291.
P. corpore annuloso, appendicibus utrinque duobus in margine oris. Art. Gen. 42. Syn. 90.
Lampetra coeca. Will. ichth. p. 104.
Pride. Penn. Britt. Zool. 3. p. 80. t. 8. f. 29.
 Suecis Linäl.

Habitat in fluviis variis Sueciae superioris, copiose in Dalelfwen intra Dalecarliam, saepe obvius intra Linum quod aqua maceratur, saepe intra branchias Gadi Lotae.

Corpus semipedale lumbriciforme, dense annulatum. Os edentulum, ad basin utrinque incisum.

RAIA.

R A I A.

Spiracula V subtus ad collum.

Corpus depressum.

Os sub capite.

5. *RAIA Pastinaca* corpore glabro, aculeo longo anteriori serrato in cauda et dorso apterygio. L. S. N. XII. T. I. p. 396.

R. corpore glabro, aculeo longo anteriori serrato in cauda apterygia. Art. Gen. 71. Syn. 100.

R. cauda apterygia, aculeo sagittato. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 62. t. 82.

Pastinaca marina laevis. Will. ichth. 67.

Sting-Ray. Penn. Brit. Zool. 3. p. 95.

Succis Spjut-Rocka.

Habitat in mari occidentali rarius.

Aculeus minime venenatus.

6. *RAIA clavata*, aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine transversa abdominis. L. S. N. XII. T. I. p. 397. Fn. Su. 293. It. Westrog. 176. Art. Gen. 71. Syn. 99. Spec. 103.

R. ordine aculeorum unguiformium unico in dorso et cauda. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 65. t. 85.

Raja clavata. Will. ichth. 74.

Thornback. Penn. Brit. Zool. 3. p. 95. t. 11. 12.

Succis Rocka.

Habitat in mari occidentali frequens. Piscatura in *Westr.*

S Q U A L U S.

Spiracula V ad latera colli.

Corpus oblongum teretiufculum asperum.

Os in anteriore capitis parte subtus.

Nasus inermis.

7. *SQUALUS Acanthias* pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore teretiufculo. L. S. N. XII. T. I. p. 397.

S. Acanthias pinna ani nulla, corpore teretiufculo. Fn. Su. 293. It. Westrog. 174. Art. Gen. 66. Syn. 94. Spec. 102.

Squalus corpore teretiufculo, dorso biaculeato. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 74. t. 85.

Picked Shark. Penn. Brit. Zool. 3. p. 100.

Galeus Acanthias l. *Spinax*. Will. ichth. 56.

Succis Hay. *Scanis* Hå.

Habitat in mari occidentali, raro apud nos tripedalis, etiam in mari Balthico, quamvis rarius, obvius.

Spinæ solitariae ante pinnas dorsales. *Nares* sub rostro productæ. *Color* cinereo-fuscus, subtus albidus.

8. *SQUALUS Spinax*, pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, naribus terminalibus. L. S. N. XII. T. I. p. 398. Fn. Su. 296.

Squalus pinna ani carens, naribus in extremo rostro. Art. Gen. 67. Syn. 95.

Sort-Haæn. Gunner. Act. Nidros. 2. p. 313. t. 7. 8.

Galeus Acanthias l. *Spinax fuscus*. Will. ichth. 57.

Succis Swart Hay.

Habitat in mari occidentali, præcedente rarior.

Spinæ solitariae ante pinnas dorsales. *Parvus*, dorso cinerascens, subtus ater; junior subvillosus.

9. *SQUALUS Canicula* supra rufescens maculis crebris nigricantibus, subtus pallidus immaculatus, primis ventralibus maris usque ad apicem concretis.

Squalus Canicula varius inermis, pinna ani medio inter anam caudamque pinnatam. L. S. N. XII. T. I. p. 399.

Squalus dorso vario pinnis ventralibus concretis.

Art. Gen. 69. Syn. 97. *mar.*

Squalus ex rufo varius, pinna ani medio inter anum et caudam pinnatam. Art. Gen. 69. Syn. 97. *foem.*

Squalus (Catulus) varius pinnis ventralibus concretis. Bloch. Pisc. extr. 1. p. 21. t. 114.

Lesser spotted Shark. Penn. Brit. Zool. 3. p. 115. t. 15.

Habitat in mari occidentali. Physiogr. Sällk. Handl. 1. p. 511.

In juniore pisce maculae rufae, dein fuscae, in adulto nigricantes unicolores, nec ut in *stellari* (*Canicula* Bloch. t. 112.) in medio discolores.

Cum *Catulo* Linn. a variis confunditur.

10. *SQUALUS Carcharias*, dorso plano, dentibus ferratis. L. S. N. XII. T. I. p. 400. Fabr. Fn. Groenl. 89.

Squalus dorso plano, dentibus plurimis ad latera serratis. Art. Gen. 70. Syn. 98.

Squalus caninus. Olf. it. Chin. p. 78.

Squalus corpore cinereo, dorso lato. Bloch. Pisc. extr. 1. p. 35. t. 119.

White Shark. Penn. Brit. Zool. 3. p. 106.

Haa-Skierdingen. Gunn. Act. Nidr. 2. p. 350. t. 10. 11.

Habitat in mari occidentali.

11. *SQUALUS glaucus* dentibus maxillae superioris margine ferrulatis, inferioris integris, foraminibus nullis ad oculos, corpore coerulefcente.

Sqn. glaucus fossula triangulari in extremo dorsi, foraminibus nullis ad oculos. L. S. N. XII. T. I. p. 401. Art. Gen. 69. Syn. 98.

Squalus absque foraminibus ad oculos. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 78. t. 86.

Blue Shark. Penn. Brit. Zool. 3. p. 109.

Galeus glaucus. Will. icht. 49.

Squalus

Squalus Ascensionis. Olf. it. Chin. p. 294.

Haabrandunge. Gunn. Act. Nidr. 4. p. 1. T. I. an?

Suecis Blå Hay.

Habitat in mari occidentali, in Balthico rarior.

Haa-Mår, *Squalus glaucus*. Ström. Nov. Act. Nidrof. 2. p. 344. c. icone et Ol. Olavii it. Island. p. 559. tab. VI. est *Beaumaris Shark*. Penn. Brit. Zool. 3. p. 118. t. 17.

P R I S T I S,

Spiracula V. ad latera Colli.

Corpus oblongum teretiufculum.

O in anteriore capitis parte subtus.

Rostrum elongatum, planum utrinque dentibus instructum.

12. *PRISTIS antiquorum* rostro spinis validis utrinque 18—24. Latham Transact. Soc. Linn. 2. p. 276. t. 26. f. 1.

Squalus Pristis pinna ani nulla, rostro ensiformi osseo plano utrinque dentato. L. S. N. XII. T. I. p. 401.

Squalus Pristis rostro ensiformi osseo plano utrinque dentato. Fn. Su. 297.

Squalus rostro longo cuspidato osseo plano utrinque dentato. Art. Gen. 66. Syn. 93.

Squalus rostro ferrato. Bloch. Pisc. extr. 1. p. 41. t. 120.

Pristis l. Serra Piscis. Will. icht. 61.

Suecis Sigfisk.

Habitat in occidentali mari raro.

Haud inepte a *Squali* genere separavit D. LATHAM *Pristis* genus, cujus quinque etiam l. c. descripsit species.

CHIMAERA.

Spiracula solitaria quadripartita sub collo.
Oris labium superius quinquepartitum.
Dentes primores incisores bini supra et infra.

23. CHIMAERA *monstrosa* rostro subtus plicis pertulsa.
 L. S. N. XII. T. I. p. 401. Fn. Su. 294. Mus. Ad.
 Fridr. p. 55. t. 25. Alcan. icon. t. 15.

Chimaera cauda filiformi, Bloch. Pisc. extr. 1. p. 61.
 t. 124.

Hav-Katten. Gunn. Act. Nidros. 2. p. 270. t. 5. 6.

Suecis Hafs-Spöke, Hafs-Rotta.

Habitat in mari occidentali.

LOPHIUS.

Spiracula solitaria pone brachia.

Dentes plurimi minuti.

Pinnæ pectorales brachiis infidentes.

24. LOPHIUS *piscatorius* depressus, capite rotundato.
 L. S. N. XII. T. I. p. 402. Fn. Su. 298.

α. *cirrhis* labii inferioris simplicibus.

L. oze cirrhofo. Art. Gen. 63. Syn. 87. Linn. It. Scan.
 p. 327.

Lophius capite corpore latiore, Bloch. Pisc. Germ. 1.
 p. 82. t. 87.

Common Angler. Penn. Britt. Zool. 3. p. 120. t. 18.

Steen-Ulk. Pontopp. Norg. N. H. 2. p. 246. c. fig.

β. *cirrhis* labii inferioris trifidis.

L. *barbatus* depressus, maxilla inferiore barbata. *Mons-*
tin Act. R. Ac. Suec. 1779. p. 195. t. 7. f. 1.

Habitat in mari occidentali.

ACIPENSER.

Spiracula lateralia, solitaria, linearia.

Os sub capite, retractile, edentulum.

Cirrhii sub rostro ante os.

25. ACIPENSER *Sturio* cirrhii quatuor, squamis dorsa-
 libus undecim. L. S. N. XII. T. I. p. 403. Fn. Su.
 299. Mus. Ad. Fr. p. 54. t. 18. f. 2.

Acipenser corpore tuberculis spinosis aspero. Art. Gen.
 65. Syn. 91.

Acipenser scutorum ordinibus quinque ad corpus aspe-
 rum. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 89. t. 88.

Sturgeon. Penn. Britt. Zool. 3. p. 124. t. 19. f. 53.

Sturio. Will. icht. 239.

Suecis Stör.

Habitat in mari Balthico et occidentali.

16. ACIPENSER *ruthenus* cirrhii quatuor, squamis dor-
 salibus quindecim. L. S. N. XII. T. I. p. 403. Fn.
 Su. 300. Mus. Ad. Fr. p. 54. t. 27. f. 2. t. 28. f. 1.

Acipenser ordinibus scutorum tribus, Bloch. Pisc.
 Germ. 3. p. 98. t. 89.

Suecis Sterlett.

Habitat in mari Balthico ad littora Livoniae. In lacu
 Maelaren olim plantatus.

Ordines officulorum in cute quinque sunt; sed me-
 dius tantum ordo, qui XV circiter officulis constat,
 angulosus est; cujus nimirum singula squama ephippium
 forma refert, per medium dorsum secundum totam lon-
 gitudinem in processum tenuem et secantem assurgens,
 posterius adunco sine terminata. *Lateralia* officula ut et
ventralia rhomboides et fere plana sunt. Quilibet ordo
 laterum LX prope officula continet, ventralium singuli
 X et XI. I. G. GÜLLER.

TETRO-

TETRODON.

Maxillae osscae porrectae.

Apertura solitaria.

Pinnae ventrales nullae.

17. *Tetraodon Mola* inermis, asper, compressus, rotundatus, pinna caudali brevissima rotundata pinnisque dorsali et anali connexis, spiraculis ovalibus. N. Act. R. Ac. Suec. 1785. p. 115. t. 4.

Ostracion cathoplateus, subrotundus, inermis, asper, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in capite. Art. Gen. 61. Syn. 83.

Mola Monti: Act. Bonon. 2. p. 2. pag. 297. t. 3. f. 1.

Klumpfsich. Hamb. Mag. V. 13. p. 1. f. 1.

Diodon corpore lato, cauda truncata. Bloch. Pisc. extr. 1. p. 75. t. 120.

Short Diodon. Penn. Britt. Zool. 3. p. 129. t. 19.

Orthroriscus I. Luna Piscis. Gesch. Hist. Anim. p. 640.

Habitat in mari occidentali, etiam in freto Öresund captus.

Characteri Linneano haud bene respondent maxillae, quum superior leviter bifida, inferior integra, haud male cum *Tetrodonte truncato* singulare genus constitueret, at illum examinare non licuit.

5. ENCHELARES.

OPHICHTHUS.

Nares tubulosae.

Membrana Branchioflega radiis X.

Spiracula solitaria ante pinnas pectorales.

Pinnae pectorales.

Corpus teretiufculum, lubricum.

18. *Ophichthus Anguilla*, maxilla inferiore longiore, corpore supra lineam lateralem nigrescente, infra exalbido, pinna caudae obtusa rotundata.

O. Anguilla, cauda pinnata, corpore compressiusculo unicolore. Thunb. Diss. p. 11.

Muraena Anguilla, maxilla inferiore longiore, corpore unicolore. L. S. N. XII. T. I. p. 426. Fn. Su. 301.

Muraena Anguilla corpore immaculato, maxilla inferiore longiore. Bloch. Pisc. Germ. 5. p. 4. t. 75.

Muraena unicolor, maxilla inferiore longiore Art. Gen. 24. Syn. 39. Spec. 66.

Common Eel. Penn. Britt. Zool. 3. p. 142.

Anguilla. Will. icht. 109.

Suecia Ål.

Habitat in fluviis et lacubus vulgaris, etiam in mari Balthico. Nocturnus, viviparus, extra aquam diutius quam reliqui Pisces Suecici vivens.

Nec unicolor neque immaculatus recte dicitur.

SYNGNATHUS.

Rostrum subcylindricum, ore maxilla inferiore operculato.

Apertura Branchiarum operculis clausis, nucha foraminibus spirans.

Corpus cataphractum.

Pinnae ventrales nullae.

19. *SYNGNATHUS Typhle*, pinnis caudae, ani pectoralibusque radiatis, corpore sexangulato. L. S. N. XII. T. I. p. 416. Fn. Su. 377.

Syngnathus corpore medio hexagono, cauda pinnata. Art. Gen. 1. Syn. 1. Spec. 3.

Syngnathus corpore hexagono anoque pinnato. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 112. t. 91. f. 1.

Longer Pipe. Penn. Britt. Zool. 3. p. 140. t. 23. f. 60. 1.

Acus Aristotelis. Willugb. icht. 153.

Habitat in utroque mari.

Nob. PENKANT in Specimine foemineo exilem ani pinnam non observavit.

20. *SYNGNATHUS Acus* pinnis caudae, ani, pectoralibusque radiatis, corpore septemangulato. L. S. N. XII. T. I. p. 416. Fn. Su. 376.

Syngnathus corpore medio heptagono, cauda pinnata.

Art. Gen. 1. Syn. 2. Spec. 2. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 513. t. 91. f. 2.

Shorter Pipe. Penn. Britt. Zool. 3. p. 340. t. 23. f. 60. 1. inf.

Acus Aristotelis Species altera major. Willugb. icht. 159.

Succis Kantnäl.

Habitat in utroque mari.

21. *SYNGNATHUS Ophidion* pinnis caudae, ani, pectoralibusque nullis, corpore tereti. L. S. N. XII. T. I. p. 417. Fn. Su. 375.

Syngnathus teres pinnis pectoralibus caudaeque carentis. Art. Gen. 1. Syn. 2. Spec. 1.

Syngnathus corpore tereti. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 116. t. 91. f. 3.

Little

Little Pipe. Penn. Britt. Zool. 3. p. 141. t. 23. f. 62. male.

Acus lumbriciformis l. serpentinus. Willugb. icht. 160. Succis Hafanäl. Hollandis Tanglnipa.

Habitat cum praecedentibus.

CALLIONYMUS.

Caput labio superiore duplicato.

Oculi approximati.

Membrana Branchiofiega radiis VI.

Apertura naeae foraminibus respirante. Opercula clausa.

Corpus nudum. Pinnae Ventrates ramosissimae.

22. *CALLIONYMUS Lyra* pinnae dorsalis prioris radiis longitudine corporis. L. S. N. XII. T. I. p. 433. Fn. Su. 304. Müll. Zool. Dan. Fasc. I. p. 27. t. 27.

Callionymus radiis in prima pinna dorsali longissimis. Bloch. Pisc. extr. 2. p. 79. t. 161.

Cottus officulis pinnae dorsalis longitudine corporis. Gronov. Act. Upl. 1740. p. 128. t. 8.

Gemmeus Dragonet. Penn. Britt. Zool. 3. p. 164. t. 27. f. 69.

Habitat in mari occidentali, fretum Öresund nonnunquam intrans.

23. *CALLIONYMUS Draculus* pinna dorsali priore nigra, radio utriusque primo aequali. Müll. Zool. Dan. I. p. 20. t. 20. Leske Handb. 1. t. 3. f. 3.

C. Dracunculus dorsalis prioris pinnae radiis corpore brevioribus. L. S. N. XII. T. I. p. 434. Ström. Nov. Act. Nidros. 1. p. 149.

Callionymus radiis quatuor in prima pinna dorsali brevibus. Bloch. Pisc. extr. 2. p. 84. t. 16. f. 2.

Urano-

Uranoscopus officulo primo pinnae primae dorsalis unciali. Gronov. Act. Helv. 4. p. 260.

Sardid Dragonet. Penn. Britt. Zool. 3. p. 167. t. 28. f. 70.

Habitat in mari Norvegico, et occidentali rarius.

Sub una specie *Call. Dracunculi* Linn. plures forte latere fat bene in Zoologiae Danicae editione Danica demonstravit beat. MÜLLER, ubi synonyma scrupulose extricavit.

3. APODES.

AMMODYTES.

Caput compressum, corpore angustius.

Labium superius duplicatum, mandibula inferior angusta acuminata.

Dentes acerosi.

Membrana branchiostega radiis VII.

Corpus teretiusculum, squamis vix conspicuis, pelucidum, cauda distincta.

24. *AMMODYTES Tobianus*, L. S. N. XII. T. I. p. 430. Fn. Su. 302. It. Scan. 142. It. Oel. 87. Art. Gen. 16. Syn. 29. Spec. 55.

Ammodytes maxilla inferiore acuminata. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 24. t. 75. f. 2.

Clupea tenuis longa argentea etc. Olaf. et Pov. it. Isl. p. 587. t. X. f. 14. 15.

Lancee, Penn. Britt. Zool. 3. p. 156. t. 25. f. 66.

Ammodytes Gesneri, Willugb. icht. 13.

Suecis Tobis.

Habitat ad littora Scaniae vadosa, arenosa, inprimis ubi scaturiginibus aquae dulcis sub marina aqua abundant, ibique caput in arena occultat corpore
in

in spiram reposito; copiosius ad Cimbrishamn, etiam ad australem Oelandiae angulum.

Varietas pedalis et pollicis crassitie rara *Tobiskung*, Rex *Tobianorum* dicitur.

ANARHICAS.

Caput obtusum.

Dentes primores supra infraque conici divergentes VI pluresve,

molares inferiores palatique rotundati.

Membrana branchiostega radiis VI.

Corpus teretiusculum, Pinnae Caudae distincta.

25. *ANARHICAS Lupus*, L. S. N. XII. T. I. p. 430. Art. Gen. 23. Syn. 38. Alcan. icon. t. 25.

A. Lupus non maculatus, Müll. Prodr. Zool. Dan. 532.

A. Lupus major, dentibus solidis obtusioribus. Fabr. Fn. Groenl. p. 138.

Anarhicas dentibus ossis, Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 19. t. 74.

Steenbider. Pontopp. Norig. Nat. H. 2. p. 243. c. fig.

Ravenus Wolf-fish, Penn. Britt. Zool. 3. p. 157.

Suecis Haf-katt, Sjöwarg.

Habitat in mari occidentali. Piscatores superstitiosi raro nisi capite orbatum piscem domi advehunt.

Obs. icon. Pennanti l. c. tab. 24. et *Olaf. et Povelf.* it. Island. tab. 42. ad *Anarhicam minorem* Fabr. pertinent, modo diversa sit species; nec diversas puto species *A. frigosus* et *pantherinus* Gmel.

OPHIDIION

Caput nudiusculum.

Dentes in maxillis, palato, faucibus.

Corpus ensiforme.

26. OPHIDIION imberbe maxillis imberbibus, cauda obtusiuscula. L. S. N. XII, T. I. p. 451. Fn. Su. 319.

Ophidion cirrhis carens. Art. Gen. 24. Syn. 42.

Beardless Ophidium. Penn. Britt. Zool. 3. p. 393. t. 95.

Ophidion alterum flavum et imberbe. Will. icht. 113.

Habitat in mari Balthico et occidentali, saepe intra testas ostreatum repertum.

Facies Muraenae. M. Branch. V. P. Dorfi LXXIX a capite ad caudam extensa, maculis aliquot nigris, margine albidis, aequali spatio remotis, aculeatis. P. Pect. XI. P. Ani XXI. Caudae circiter XVIII. vel XX. Gronovius vero numeravit in P. Dorfi CXLVII. Pect. XXVI. Ani CI. num idem Piscis?

XIPHIAS.

Os edentulum. Maxilla superior terminatum rostro ensiformi.

Membrana Branchioflega radiis VII.

Corpus teretiusculum, alepidotum.

27. XIPHIAS Gladius L. S. N. XII. T. I. p. 432. Fn. Su. 305. Act. Ac. R. Suec. 1770. p. 5. t. 2. 1771. p. 115. t. 5. Art. Gen. 30. Syn. 47.

Xiphiar pinna dorsi in medio humili. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 23. t. 76.

Sicilian Swordfish. Penn. Britt. Zool. 3. p. 160. t. 26. f. 68.

Suecis Swärdfisk.

Habitat in mari Balthico et occidentali.

4. IU.

4. IUGULARES.

TRACHINUS.

Caput compressum, asperum.

Membrana Branchioflega radiis VI.

Operculorum lamina inferior serrata.

Anus prope pectus.

28. TRACHINUS Draco. L. S. N. XII. T. I. p. 435. Fn. Su. 305. It. Scan. 325.

Trachinus maxilla inferiore longiore cirrhis destituta. Art. Gen. 42. Syn. 70. Gronov. Act. Upf. 1742.

p. 95.

Trachinus maxilla inferiore longiore, radiis quinque in pinna dorsali prima. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 151. t. 61.

Common Weaver. Penn. Britt. Zool. 3. p. 169. t. 23. f. 71.

Draco l. Araneus Plinii. Will. icht. 288.

Suecis Färling, Fjöfing.

Habitat in mari occidentali.

Aculei Pinnae dorsalis pessime quidem pungunt, at venenati non sunt.

GADUS.

Caput laeve.

Membrana Branchioflega radiis VII teretibus.

Corpus oblongum.

Pinnae omnes cute communi vestitae, muticae: dorsales et anales plures.

ventrales in acumen attenuatae.

* Dorso tripterygio, ore cirrato.

29. GADUS aeglefinus tripterygius, cirratus, albicans, cauda biloba, maxilla superiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 435. Fn. Su. 306. It. Scan. 325.

Gadus

Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxilla superiore longiore, cauda parum bifurca. Art. Gen. 20. Syn. 36.

Gadus cirratus, albicans, maxilla superiore longiore, cauda parum bifida. Art. Spec. 61.

Gadus cirro unico, linea laterali nigra. Bloch, Pisc. Germ. 2. p. 133. t. 62.

Hadock, Penn. Britt. Zool. 3. p. 179.

Onor 1. *Afinus antiquorum*. Will. icht. 170.

Suecis Kolja.

Habitat in mari occidentali.

Linea lateralis fusca et macula fusca pone supraquo pinnas pectorales.

30. *GADUS Callarius tripterygius cirratus varius*, cauda integra, maxilla superiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 436. Fn. Su. 307. it. Scan. 220. it. Oel. 87.

Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali. Art. Gen. 20. Syn. 25. Spec. 63.

Gadus linea laterali lata, curva maculataque. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 142. t. 63.

Afellus varius vel striatus. Will. icht. 172.

Suecis Torfk.

Habitat in mari Balthico et occidentali.

Dorsum cinereum saepe nigrum maculis obscurioribus crebris. Abdomen albidum punctis minimis nigris. Ex hoc parant Norwegi *Rundfish*, *Rotshär*, *Klippfish*, etiam *Raf* et *Rakling*. Act. R. Ac. Suec. 1770. p. 312.

31. *GADUS Morrhuus tripterygius cirratus*, cauda subaequali, radio primo anali spinoso. L. S. N. XII. T. I. p. 436. Fn. Su. 308. it. Westrog. 176.

Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, cauda aequali fere, cum radio primo spinoso. Art. Syn. 35.

Gadus

Gadus squamis majoribus. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 145. t. 64.

Common Codfish. Penn. Britt. Zool. 3. p. 172.

Afellus major vulgaris. Will. icht. 165.

Suecis *Kabbeljä*, *Kablä*.

Habitat in mari occidentali.

Ex hoc *Laberdan*, *Klippfish*, *Stockfish* et ex minoribus *Rotshär*, nec non ex vesica aerea *Islänfsk Hushlas* vel *Ichthyocollam* islandicam parant.

32. *GADUS barbatus tripterygius cirratus*, maxilla inferiore punctis utrinque septem. L. S. N. XII. T. I. p. 437. Fn. Su. 311. it. Westrog. 177.

Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, pinna ani prima officulorum triginta. Art. Gen. 21. Syn. 37. Spec. 65.

Gadus linea excavata pone caput. It. Westrog. 178.

Gadus corpore lato. Bloch, Pisc. extr. 2. p. 105. t. 166.

Pout. Penn. Britt. Zool. 3. p. 183.

Afellus mollis, *latus*. Will. icht. app. p. 22.

Suecis *Torsk*, *Smätorsk*.

Habitat in mari occidentali.

Etiam ex hoc *Rotshaer* praeparant Norwegi.

33. *GADUS minutus tripterygius cirratus*, ano in medio corporis. L. S. N. XII. T. I. p. 438.

Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore sexunciali, ano in medio corporis. Art. Gen. 21. Syn. 36.

Gadus abdomine intus nigro. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 167. t. 67. f. 1.

Poor. Penn. Britt. Zool. 3. p. 185. t. 30. f. 77.

Habitat in mari Balthico et occidentali rarus admodum.

** *Dorsu*

** *Dorso tripterygio, ore imberbi.*

34. *GADUS virens tripterygius imberbis*, dorso virecente, cauda bifurca. L. S. N. XII. T. I. p. 458. Fn. Su. 309.

Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, dorso virecente. Gronov. Act. Upl. 1742. p. 96.

Green Cod. Penn. Britt. Zool. 2. app. pag. ult.

Succis Sey, Gråføy, Gråfida Piscatoribus ad Kullen Scaniae Sifiker, minor Gråfik.

Habitat in mari occidentali.

Piscis longit. 7 poll. ad 3 pedes et ultra, glaber, dorso nigro-virecente, totus praeterca albo-argenteus, mollis et pinguis. Squamulae minutissimae.

P. D. I. 15. II. 20. III. 19. A. I. 24. II. 20. V. 5. P. 17. C. ultra 40.

35. *GADUS Merlangus tripterygius, imberbis, albus, maxilla superiore longiore.* L. S. N. XII. T. I. p. 452. Fn. Su. 310. it. Scan. 526. t. 2. L. 2. it. Westrog. 176. Art. Gen. 19. Syn. 34. Spec. 62.

Gadus corpore albo, ore imberbi, maxilla superiore longiore. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 161. t. 65.

Whiting. Penn. Britt. Zool. 5. p. 190.

Afellus mollis major l. albus. Will. ichth. 170.

Succis Witling.

Habitat in mari occidentali et Balthico non minus quam in freto Öresund.

36. *GADUS Carbonarius tripterygius, imberbis, maxilla inferiore longiore, linea laterali recta.* L. S. N. XII. T. I. p. 458. Art. Gen. 20. Syn. 34.

Gadus ore nigro, linea laterali alba rectaque. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 164. t. 66.

Coalfish.

Coalfish. Penn. Britt. Zool. 5. p. 186. t. 31. f. 70.
Afellus niger. Will. ichth. 168.

Habitat in mari occidentali.

37. *GADUS Pollachius tripterygius imberbis, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva.* L. S. N. XII. T. I. p. 459. Fn. Su. 311. Art. Gen. 20. Syn. 35. It. Westrog. 177. Afsan. icon. t. 21. 22.

Gadus dorso tripterygio, linea laterali curva, maxilla inferiore longiore. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 171. t. 68.

Lerbleking. Oibeck: Act. R. Ac. Suec. 1767. p. 245. t. 7.

Pollack. Penn. Britt. Zool. 5. p. 188.

Afellus Hwitingo-Pollachius. Will. ichth. 167.

Succis Lyrblek. Hollandis Lerbleking. Scania Blankføy.

Habitat in mari occidentali.

Dorsum maculis parvis nigris.

*** *Dorso dipterygio.*

38. *GADUS Merluccius dipterygius, imberbis, maxilla inferiore longiore.* L. S. N. XII. T. I. p. 459. Fn. Su. 314.

Gadus dorso dipterygio, maxilla inferiore longiore. Art. Gen. 22. Syn. 36.

Gadus dipterygius, ore imberbi. Bloch. Pisc. extr. 2. p. 94. t. 164.

Hake. Penn. Britt. Zool. 5. p. 191.

Afellus primus l. Merluccius. Will. ichth. 174.

Succis Lyfing.

Habitat in mari occidentali.

Cauda fere integra, Pinnae Dorsalis secundae pars posterior altior radiis XV. Pinnae ani pars posterior altior radiis XXIII. Linea lateralis recta.

39. *GADUS Melna* dipterygius, cirratus, maxilla superiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 439. Fn. Su. 315. It. Westrog. 177.

Gadus dorso dipterygio ore cirrato, maxilla superiore longiore. Art. Gen. 22. Syn. 36.

Gadus dorso dipterygio, maxilla superiore longiore. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 174. t. 69.

Ling. Penn. Britt. Zool. 3. p. 197.

Ajellus longus. Will. Ichth. 175.

Sueciä Långa.

Habitat in mari occidentali.

Fasciolar utrinque ad lineam lateralem rectam. Cauda rotundata.

Ex hoc *Spillånga*, *Klipplånga*, *Saltlånga*, etiam *Laberdan* vel *Cabeljä*.

40. *GADUS Lota* dipterygius, cirratus, maxillis aequalibus. L. S. N. XII. T. I. p. 440. Fn. Su. 315.

Gadus dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis aequalibus. Art. Gen. 22. Syn. 38.

Silurus cirro unico in mento. Art. Syn. 111. Spec. 107.

Gadus dipterygius, maxillis aequalibus. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 177. t. 70. Berl. Gesellsch. Schrift. 1. p. 265.

Barbot. Penn. Britt. Zool. 3. p. 199.

Mustela fluviatilis. Will. Ichth. 123.

Sueciä Lake.

Habitat in aquis dulcibus Sueciae vulgaris, in Lacu Siljan Dalecarliae maximus et praestantissimus, in lacu Weneru copiosissimus, in Scaniae lacubus parvus. *Leshole* dicitur qui fundum inhabitat, *Stenlake* qui planiores sinus. FISCHERSTROM.

Variegatus et maculatus. Cauda subrhombica.

41. *GADUS Mustela* dipterygius, cirratus, cirris quinque, pinna dorsali priore exoleta. L. S. N. XII. T. I. p. 440.

Gadus Mustela cirris quatuor. Struiffenfeldt: Act. R. Ac. Succ. 1773. p. 24. t. 2. f. B.

Gadus dorso dipterygio, sulco ad pinnam dorsii primam. Art. Gen. 22. Syn. 37.

Gadus cirris tribus. Bloch. Pisc. extr. 2. p. 100. t. 165.

Threebearded Cod. Penn. Britt. Zool. 3. p. 201. t. 35. f. 87.

Habitat in mari occidentali.

Variegatus et maculosus. Linea lateralis pone pinnas pectorales decurva, dein recta. Variat numero cirrorum.

42. *GADUS cimbrius* dipterygius, cirratus, cirris quatuor, pinna dorsali priore exoleta (radio primo hastato?) L. S. N. XII. T. I. p. 440.

Gadus cimbrius. Struiffenfeldt: Act. R. Ac. Succ. 1773. p. 22. t. 2. f. A.

Gadus dorso dipterygio, sulco ad pinnam dorsii primam, ore cirrato. Gronov. Act. Upl. 1742. p. 93. t. 3. f.

Fivebearded Cod. Penn. Britt. Zool. 3. p. 202. t. 35. f. 88.

Habitat in mari occidentali.

Immaculatus, linea lateralis recta. Radius primus hastatus character problematicus. Cirrorum numerus inconstans etiam in hoc.

**** *Dorso monopterygio.*

43. *GADUS Brosme* monopterygius, pinnis ventralibus parvis quinquerradiatis, cirro labii inferioris.

Gadus Brosme monopterygius, ore cirroso, cauda ovali acuta. Müll. Prodr. Zool. Dan. 341. Ström. Söndm. I. 272. t. f. 19.

Gadus Lub. Euphrasen: N. Act. JR. Ac. Su. 1794. p. 223. t. 3.

Torsh. Penn. Britt. Zool. 3. p. 203. t. 34.

Brosme. Pontopp. Norg. N. H. 2. p. 178.

Keila. Ol. et Pov. it. Isl. 1. p. 358. t. 27.

Gothaburgensibus Lub.

Habitat in maris occidentalis superiore parte.

Piscis bipedalis et ultra, cinerascens, abdomine albedo. Pinna dorsi margine alba, sub hoc fascia nigra, Ani margine nigra. Caudae rotundata fascia nigra, margine albo.

B L E N N I U S.

Caput declive.

Membrana Branchiostega radiis VI.

Corpus lanceolatum.

Pinnae Ventrals didactylae muticae.

. . . Ani distincta.

44. *BLENNIUS Gunnellus* pinna dorsali ocellis decem nigris. L. S. N. XII. T. I. p. 443. Fn. Su. 313. Olav. Schag. best. T. 3. f. 1.

Blennius maculis circiter decem nigris, limbo albo, utrinque ad pinnam dorsalem. Art. Gen. 27. Syn. 45.

Blennius ocellis plurimis in pinna dorsali. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 186. t. 65. f. 1.

Spotted Blenny. Penn. Britt. Zool. 3. p. 210. t. 35. f. 93.

Gunnellus. Will. ichth. 115.

Habitat in utroque mari.

Radii pinnae dorsalis rigidi pungentes.

45. *BLENNIUS viviparus* pinna dorsali, caudali analique unitis, naribus tubulosis.

Bl. viviparus ore tentaculis duobus. L. S. N. XII. T. I. p. 445. Fn. Su. 317. Mus. Ad. Frider. p. 69. t. 32.

Bl. viviparus imberbis, pinna anali caudalique unitis aurantiis. Müll. Zool. Dan. 2. p. 22. t. 57.

Bl. naribus tubulosis. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 188. t. 72.

Bl. capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris pinnae aui flava. Art. Syn. 45. Gronov. Act. Ups. 1742. p. 87.

Tånglake. Act. R. Ac. Suec. 1748. p. 57. t. 2.

Viviparus Blenny. Penn. Britt. Zool. 3. p. 27. t. 37. f. 94.

Mustela vivipara. Will. ichth. 122.

Suec. Tånglake, Alkusa.

Habitat in mari occidentali et Balthico, in sinu Bothnico frequens.

Piscis rejectus. *Offa viridis* in tenebris lucent. *Pinna dorsalis* juxta caudam quasi abrupta.

46. *BLENNIUS ravinus* pinnis ventralibus subsexfidis, cirrogulari. L. S. N. XII. T. I. p. 444. Fn. Su. 316.

Gadus ravinus dipterygius cirratus, pinnis ventralibus bifetis. Müll. Zool. Dan. 2. p. 6. t. 45. Bränn. Act. Soc. Hafn. XII. p. 291. tab.

Blennius ravinus et *fuscus.* Prodr. Zool. Dan. p. 43.

Habitat (in mari STRÖM, BRUNNICH, MÜLLER) in lacubus Suecise australis, ingruente tempestate littora petens, quo recedunt reliqui pisces, plerisque detestabilis nec esculentus piscis. à LINNÆ,

Medius quasi inter Gadus et Blennius, huc propter formam corporis, pinnam dorsii, ani et caudae ac radios binos elongatos pinnarum Ventralium relatus. Pinnam priorem dorsalem minutam, quam pingit Bauschner, reliqui non habent. Num binae species?

5. THORACICI.

G O B I U S.

Caput poris duobus inter oculos approximatos, altero anteriore.

Membrana Branchioflega radiis IV.

Pinnae ventrales unitae in ovatum.

47. Gontus Ruthensparri pinna dorsali secunda radiis octo, macula nigra utrinque ad basim caudae. *Euphrasen*: N. Act. R. Ac. Suec. 1786. p. 64. t. 3. f. 1.

Habitat in mari occidentali, uncialis pisciculus.

48. Gontus niger pinna dorsali secunda radiis quatuordecim. L. S. N. XII. T. I. p. 449. *Muf. Ad. Frid.* 2. p. 64.

Gobius ex nigricante varius, pinna dorsali secunda officulorum 14. *Art. Gen.* 23. *Syn.* 46.

Gobius ex albo et fusco varius, pinna dorsali secunda radiis XIV. *Bloch. Pisc. Germ.* 2. p. 5. t. 38. f. 2-5.

Black Goby. *Penn. Britt. Zool.* 3. p. 215. t. 38.

Apocryptes cantonensis. *Osb. it. Chin.* 151.

Gobius niger. *Will. ichth.* 206.

Habitat in mari occidentali,

49. Gontus jeto radiis dorsalibus eminentibus setaceis. L. S. N. XII. T. I. p. 450. *Muf. Ad. Frid.* 2. p. 65.

Gobius

- Gobius* pinna ventrali coerulea, officulis pinnae dorsalis primae supra membranam allurgentibus. *Art. Gen.* 29. *Syn.* 47.

Gobius pinnae coeruleis, radiis in pinna dorsali prima eminentibus. *Bloch. Pisc. Germ.* 3. p. 168. t. 97. f. 5.

Gobius tertius. *Will. ichth.* 207.

Habitat in mari occidentali et Balthico.

CYCLOPTERUS.

Caput obtusum.

Dentes maxillares.

Membrana Branchioflega radiis IV.

Pinnae ventrales in orbiculum connatae.

50. *Cyclopterus Lumpus* corpore squamis officis angulato. L. S. N. XII. T. I. p. 444. *Fa. Su.* p. 320.

Cyclopterus. *it. Scan.* 183. *Art. Gen.* 62. *Syn.* 87.

Cyclopterus ordinibus tuberculorum septem. *Bloch. Pisc. Germ.* 3. p. 105. t. 90. *Berl. Ges. Schrift.* 1. p. 247.

Lumpfucker. *Penn. Britt. Zool.* 3. p. 155. t. 21. f. 1. 2.

Rognkal, Rogn Kexer. *Pontopp. Norg. N.H.* 2. p. 229.

Lumpus Anglorum. *Will. ichth.* 208.

Suæcis Sjurrygghisk. Somis mas Stenbit, foemina Quabfo.

Habitat in utroque mari.

Foemina vix edulis.

C O T T U S.

Caput corpore latius spinosum.

Membrana Branchioflega radiis VI.

Dentes in utraque maxilla.

51. *Cottus cataphractus*, loriceatus, rostro verrucis binis bifidis, capite subtus cirroso. L. S. N. XII. T. I. p. 451. *Fa. Su.* 324.

Cottus

Cottus cirris plurimis, corpore octagono. Art. Gen. 49. Syn. 77. Spec. 87. Mus. Ad. Frid. p. 70.

Cottus corpore octagono. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 15. t. 39. f. 3. 4.

Armed Bullhead. Pogge. Penn. Britt. Zool. 3. p. 217. t. 39. f. 98.

Cataphractus. Will. ichth. 211.

Bahusius Bottumus.

Habitat in mari occidentali.

52. *Cottus quadricornis* verrucis capitis quatuor ossis L. S. N. XII. T. I. p. 452. Fn. Su. 321.

Cottus scaber, tuberibus quatuor corniformibus in medio capite. Art. Gen. 48. Syn. 77. Spec. 84. Mus. Ad. Frid. p. 70. t. 32. f. 4. Syst. Nat. ed. VI. t. 4. f. 3.

Cottus tuberculis quatuor. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 170. t. 108.

Succis Hornsimpa.

Habitat in mari Balthico et occidentali.

Ova sua incubat, nec deserit. Singulare apud Pisces phaenomenon.

53. *Cottus Bubalis* capite spinoso scabroque bicorni. Euphras. N. Act. R. Ac. Su. 1786. p. 65. t. 3. f. 2. 3.

Cottus capite lateribusque spinosis. Seröm. Nov. Act. Nidrol. 1. p. 151.

Habitat in mari occidentali.

54. *Cottus Scorpium* capite spinis pluribus, maxilla superiore paulo longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 452. Fn. Su. 323.

Cottus alepidotus, capite polyacantho, maxilla superiore paulo longiore. Art. Gen. 49. Syn. 77. Spec. 86. Mus. Ad. Frid. p. 70.

Cottus

Cottus maxilla superiore longiore, radiis pinnarum pectoralium indivisis. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 18. t. 40.

Father Escher. Penn. Britt. Zool. 3. p. 218. t. 40.

Fiskfympen. Act. Nidrol. 2. p. 545. t. 13. 14.

Scorpaenae Beloni similis. Will. ichth. 138.

Succis Simpa, Röttsimpa, Skrabba, Skälryta. *Scanis* Ulk. *Gochsburg* Pinulk.

Habitat in utroque mari vulgaris.

55. *Cottus Gobio*, laevis, capite spinis duabus L. S. N. XII. T. I. p. 453. Fn. Su. 322.

Cottus alepidotus glaber, capite diacantho. Art. Gen. 48. Syn. 76. Spec. 82.

Cottus spinis curvatis duabus ad utrumque operculum. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 12. t. 39. f. 1. 2.

River Bullhead. Penn. Britt. Zool. 3. p. 216. t. 39. f. 97.

Gobio fluviatilis capitatus. Will. ichth. 137.

Succis Stensimpa, *Fahlunensibus* Staggfimpa.

Habitat in mari Balthico et Fahlunae in rivulis, in fluvio Upsaliensi et alibi.

Piscis Staggfimpa, qui Fahlunae frequens vix differt ab hac specie; est enim pisciculo Fahlunensi *Corpus* 2 digitos longum cindream fasciis variis fulcis. P. D. I. rad. 7. II. 18. Pect. 14. V. 4. A. 15. C. 10.

Quae de *Cotto quadricorni* refert GIZLEN ad hunc refert FISCHERSTROM *Descr. Macleri* p. 185.

PLEU.

PLEURONECTES.

Oculi ambo in eodem latere capitis.
 Membrana Branchiostega radiis IV — VII.
 Corpus compressum latere altero dorsum, altero
 abdomen referente.
 Oculi a latere dextro.

56. *PLEURONECTES Hippoglossus* oculis dextris, corpore
 toto glabro. L. S. N. XII. T. I. p. 456. Fn. Su. 329.
 Art. Gen. 17. Syn. 31.

Pleuronectes pinna caudali lunulata. Bloch. Pisc. Germ.
 2. p. 47. t. 47.

Holybut. Penn. Britt. Zool. 3. p. 226.

Hippoglossus. Will. Ichth. 99.

Suecis Hälgefundra.

Habitat in Mari occidentali.

Variet raro oculis sinistris. Linea lateralis recta.
 Ex hoc *Raf* et *Rakling* paratur.

57. *PLEURONECTES Platessa* oculis dextris, corpore
 glabro, tuberculis sex capitis. L. S. N. XII. T. I.
 p. 456. Fn. Su. 328.

Pleuronectes Rödspätta. it. Westrog. 179.

Pleuronectes oculis et tuberculis sex a dextra capitis,
 lateribus glabris, spina ad anum. Art. Gen. 17. Syn.
 30. Spec. 57.

Pleuronectes tuberculis sex ad caput. Bloch. Pisc.
 Germ. 2. p. 31. t. 42.

Plaïse. Penn. Britt. Zool. 3. p. 229.

Puffer Beloni. Will. Ichth. 96.

Suecis Skälla, Spätta, Rödspätta, Rödspätta.

Habitat in utroque mari.

Corpus

Corpus ovatum. Linea lateralis subrecta. Maculae
ferrugineae rotundae in dorso et pinnis. Squamis ele-
vato-hemisphaericis. Spina ad anum.

58. *PLEURONECTES Flesus* oculis dextris, linea late-
 rali aspera, spinulis ad pinnae. L. S. N. XII. T. I.
 p. 457. Fn. Su. 327.

Pleuronectes Skrobba. it. Scan. 326.

Pleuronectes oculis a dextris, linea laterali aspera,
 spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus ob-
 tulis. Art. Gen. 17. Syn. 31. Spec. 59.

Pleuronectes spinulis plurimis in latere superiore.
 Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 39. t. 44.

Flounder. Penn. Britt. Zool. 3. p. 229.

Puffer suviatilis. Will. Ichth. 93.

Suecis Flundra, Bahusis Slättkadda.

Habitat in mari utroque.

Corpus ovale. Linea lateralis supra pinnae pectorales
nonnihil flexa. Maculae nigrescentes in dorso et pin-
nis. Ad P. dorsalis ad analis basin et lineam lateralem
series aculeolorum.

59. *PLEURONECTES Limanda* oculis dextris, squamis
 ciliatis, (spinulis ad radicem pinnarum dorfi sui-
 que) dentibus obtulis. L. S. N. XII. T. I. p. 457.

Pleuronectes oculis a dextra, squamis asperis, spina
 ad anum, dentibus obtulis. Art. Gen. 17. Syn. 35.
 Spec. 58.

Pleuronectes squamis asperis, linea laterali arcuata.
 Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 45. t. 46.

Dab. Penn. Britt. Zool. 3. p. 230.

Puffer asper l. *squamosus*. Will. Ichth. 97.

Suecis Skrubba.

Habitat in utroque mari.

Corpus

Corpus ovatum. Linea lateralis supra P. pectorales arcuata, deinceps recta. Maculae parvae, pallidae vel nullae. Squamae majores, asperae. Pinnae Caudae leviter emarginatae. Spinulae ad radices pinnarum vix ullae.

60. PLEURONECTES Solea oculis dextris, corpore oblongo aspero, maxilla superiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 457. Fn. Su. 326.

Pleuronectes Lanza, it. Westrog. 178.

Pleuronectes oblongus maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. Art. Gen. 18. Syn. 32. Spec. 60.

Pleuronectes squamis asperis, maxilla superiore longiore. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 42. t. 45.

Sole, Penn. Britt. Zool. 3. p. 231.

Buglossar, Will. ichth. 100.

Succit, Tunga, Sola.

Habitat in mari occidentali.

Corpus ovali-oblongum, immaculatum, Squamae denticulatae, asperae. Linea lateralis recta.

61. PLEURONECTES *Linguatula* oculis dextris, ano sinistro, dentibus acutis. L. S. N. XII. T. I. p. 457. Art. Gen. 17. Syn. 31.

Habitat in mari occidentali,

Oculi a latere sinistro.

62. PLEURONECTES *Rhombus* oculis sinistris, corpore glabro. L. S. N. XII. T. I. p. 453. Art. Gen. 19. Syn. 31.

Pleuronectes Piggwarf, it. Westrog. 178.

Pleuronectes corpore lato et glabro. Bloch. Germ. 2. p. 36. t. 43.

Pearl, Penn. Britt. Zool. 3. p. 238.

Rhombus laevis, Will. ichth. 95.

Succit, Slättwar, Slätta.

Habitat

Habitat in mari Balthico et occidentali.

Corpus subhombeo-ovatum, Linea lateralis circa pinnae pectorales arcuata, dein recta, Maculae minutae pallidae.

63. PLEURONECTES *maximus* oculis sinistris, corpore aspero. L. S. N. XII. T. I. p. 459. Fn. Su. 325. Art. Gen. 18. Syn. 32.

Fludror, it. Gotth. 186.

Pleuronectes tuberculis ossis scaber. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 55. t. 49.

Turbot, Penn. Britt. Zool. 3. p. 255.

Rhombus maximus asper non squamosus. Will. ichth. 94. *Rhombus aculeatus* ibid. 93.

Succit Butta. *Scania Piggwar*, Pifware.

Habitat in utroque mari.

Corpus oblique lato-ovatum asperum, aculeolis sparsis rude. Linea lateralis ab oculo superiore vel dextro incipiens arcuata, dein recta. Color fuscus, maculis irregularibus nigris.

64. PLEURONECTES *Passer* oculis sinistris, linea laterali sinistra aculeata. L. S. N. XII. T. I. p. 459.

Pleuronectes oculis a sinistra, linea laterali utrinque aculeata. Art. Gen. 18. Syn. 32.

Pleuronectes linea laterali versus caput tantum aculeata. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 57. t. 50.

Habitat in mari occidentali.

Corpus ovatum, cauda reliquorum longior. Linea lateralis levissime flexa supra pinnae pectorales, versus superiora scissis aculeorum ad utramque marginem lineata, et quidem in supino tantum latere.

65. PLEURONECTES *hirtus* oculis sinistris, corpore squamis ciliatis aspero, pinnae ventralibus connatis. *Abildgaard*. Zool. Dan. 3. p. 56. t. 103.

Pleu-

Pleuronectes punctatus corpore lato asperoque. Bloch.

Pisc. extr. 5. p. 131. t. 189?

Whiff. Penn. Britt. Zool. 3. p. 238.

Habitat in mari occidentali rarius.

Corpus ovale, cauda fere nulla. Linea lateralis supra pectorales pinnas arcuata, dein quidem recta, at nonnihil oblique ducitur. Squamæ ciliatæ. Pinnae præter labium inferius totum piscem ambiunt. Si *Pl. punctatus* Cel. Bloch. cum *hicto*, quem recentem vidi et examinavi apud amiciss. ABILDGAARD, de quo vix dubito, conspirant enim egregie forma, asperitas, linea lateralis, numerus radiorum in pinnis etc. nimis pulchre coloratus, et penarum ventralium coadunatio prætervifa in exemplari spiritu vini servato, nisi morbosa fuerit concretio in exemplari Abildgaardii.

L A B R U S.

Dentes acuti. Labia simplicia.

Membrana Branchiostega radiis VI. Opercula squamola.

Pinnae Dorsalis radii postice ramento filiformi acuti.

. . . Pectorales acuminatae.

Linea lateralis recta.

66. *LABRUS fulvus* pinna dorsali ramentacea, macula nigra supra caudam, spinis dorsalibus novem. L. S. N. XII. T. I. p. 476. Fn. Su. 350.

Bergsvaltra Spari Species. it. Westrog. 179.

Bahusis Bergsvaltra.

Habitat in mari occidentali.

Facies Percæ. Color subvirescens. Linea lateralis versus caudam flexa. Spinæ dorsales in it. Westrog. l. c. dicun-

dicuntur novendecim. M. D. 5. P. D. 22. P. 13. V. 6. A. 10. C. 14. à LINNÆ. Numme idem cum *Percia rupestris*?

67. *LABRUS exoletus* pinna dorsali ramentacea, corpore lineis coeruleis, pinna ani spinis quinque. L. S. N. XII. T. I. p. 479. Fn. Su. 351. Müll. Prodr. Zool. Dan. 386. Alcan. icon. t. 12?

Striped Wrasse. Penn. Britt. Zool. 3. p. 249. t. 45?

68. *LABRUS carneus* ruber maculis duabus nigris in basi postica pinnae, et tertia in extremo dorsali. Müll. Prodr. Zool. Dan. 385. Alcan. icon. t. 13. Bloch. Pisc. extr. 6. p. 3. t. 289.

Suecic. a. Blåfisk.

Habitat in maris occidentalis superiore parte.

Piscatores Norwegi observarunt hos solo sexu diversos, et quidem carnem foeminam esse. O. FAHRENIUS.

69. *LABRUS Aper* pinna dorsali ramentacea, anali spinis tribus, capite corporeque flavescente lituris rufis. *Labrus Berggale*, cauda rotundata, squamis margine pinnis operculisque lineis flexuosis rufo-aureis. Prodr. Zool. Dan. 387. Alcan. icon. t. 1.

Ballus. Penn. Britt. Zool. 3. p. 246. t. 44?

Suecic. Hafskarp.

Habitat in mari occidentali, ad Torekow haud rarus.

P. D. 22. P. 14. V. 3. A. 12. C. 12.

P E R C A.

Caput operculis squamatis, serratis.

Membrana Branchiostega radiis VII.

Corpus pinnis spinosis.

69. *PERCA fluviatilis* pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis XVI. L. S. N. XII. T. I. p. 481. Fn. Su. 352.

Percæ

Perca lineola utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. Art. Gen. 39. Syn. 66. Spec. 74.

Perca pinna ani radiis undecim. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 66. t. 52. Berl. Gesellsch. Schrift. 1. p. 270.

Common Perch. Penn. Britt. Zool. 3. p. 254. t. 48 f. 124. var. dorso gibbo.

Perca fluviatilis. Will. ichth. 291.

Suecic Abborre.

Habitat in Mari ad fluviorum exitum, in lacubus, fluviis vulgaris. In stagnis Fahlunæ hujus singularis varietas est, quæ spina recurvata et dorso omnino gibbo frequens reperitur. Cfr. Penn. l. c.

70. *PERCA Lucioperca* pinnis dorsalibus distinctis, secunda radiis viginti tribus. L. S. N. XII. T. I. p. 481. Fn. Su. 354.

Perca pallide maculosa, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus. Art. Gen. 39. Syn. 67. Spec. 76.

Perca pinna ani radiis quatuordecim. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 62. t. 51. Berl. Gesellsch. Schrift. 1. p. 281.

Lucioperca. Will. ichth. 293.

Suecic, Gös.

Habitat in lacubus majoribus Uplandiae, Westmanniae, Sudermanniae, Scaniae etc.

71. *PERCA Norwegica* pinnis dorsalibus unitis, radiis XV. spinosis XIV mollibus, corpore rubro.

Perca Norwegica corpore rubro. Prodr. Zool. Dan. 590. Fabr. Fn. Groenl. 121. Afcun. icon. t. 16.

Perca marina, Uer, Leemus Lapl. p. 527. not. 186. t. 99.

Karfe. Ol. et Pov. it. Isl. p. 359. t. 29.

Sea Perch. Penn. Britt. Zool. 3. p. 258. t. 48. f. 126.

Rödfisk. Pontopp. Norg. N. H. p. 228.

Habitat

Habitat in mari occidentali.

Perca marina Linn. perperam in Fauna Suecica introducta, piscis enim est mediterraneus. *Sparus erythrinus* a *P. norwegica* diversus omnino.

Piscis bipedalis et ultra. Operculum dentibus 2 obtusis, 3 acutis. P. D. $\frac{1}{2}$. P. 17. V. 6. A. $\frac{1}{2}$. C. 16. Spinæ plures in fronte et ad tempora.

72. *PERCA maculosa* pinnis dorsalibus unitis ramentaceis, radiis spinosis XVI, mollibus IX, dorso violaceo, corpore et dorsali pinna maculosis.

Lutjanus Norwegicus. Bloch. Pisc. extr. 5. p. 11. t. 250.

Habitat in mari occidentali versus Norwegiam.

M. B. 5. P. D. $\frac{1}{2}$. V. $\frac{1}{2}$. A. $\frac{1}{2}$. C. 16. P. 12.

73. *PERCA rupestris* pinnis dorsalibus unitis, radiis spinosis ramentaceis septendecim; mollibus novem, macula nigra antice et supra caudam.

Perca rupestris pinna dorsali ramentacea antice, caudaque superius ante pinnam nigro-maculata. *Abildgaard* Zool. Dan. 3. p. 44. t. 107.

Labrus rupestris pinna dorsali ramentacea antice macula fusca. L. S. N. XII. T. I. p. 478.

Sciæna margine superiore caudae macula fusca notato. Mus. Ad. Frid. p. 65.

Lutjanus rupestris, Bloch. Pisc. extr. 4. p. 117. t. 250.

Goldfinny. Penn. Britt. Zool. 3. p. 251. t. 47. f. 121?

Suecic Strandabborre.

Habitat in mari occidentali ad littora rupestris.

Caput lineis coeruleis pictum. L. C. FABRICIUS.

M. B. 5. P. P. 15. D. $\frac{1}{2}$. V. $\frac{1}{2}$. A. $\frac{1}{2}$. C. 16. *Dentes* 4. primores in utraque maxilla, acuti.

Y

74.

74. *PERCA cernua* pinnis dorsalibus unitis radiis vigintiseptem, spinis quindecim, cauda bifida. L. S. N. XII. T. I. p. 487. Fn. Su. 335.
Perca dorso monopterygio, capite cavernoso. Art. Gen. 40. Syn. 68. Spec. 77. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 74. t. 53. f. 2. Berl. Gesellsch. Schr. 1. p. 287.
Kuffe. Penn. Britt. Zool. 3. p. 259.
Cernua fluviatilis. Will. ichth. 334.
Succit. Gers. *Fahlunensibus* Snorgers. *Scanis* Hörk.
 Habitat in lacubus passim per Sueciam, rarius ad littora marina capitur, tuncque major et magis sapidus.

GASTEROSTEUS.

- Corpus* ad caudam utrinque carinatum.
Aculei distincti ante pinnam dorsii.
Pinnae Ventrals pone postorales, sed supra sternum.
Membrana Branchiostega radiis tribus.
75. *GASTEROSTEUS aculeatus* spinis dorsalibus tribus. L. S. N. XII. T. I. p. 489. Fn. Su. 336. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 79. t. 53. f. 3. Olav. Schag. Beskr. t. 5. f. 2.
Gasterosteus aculeis in dorso tribus. Art. Gen. 42. Syn. 80. Spec. 96.
Threespined Stickleback. Penn. Britt. Zool. 3. p. 261. t. 50. f. 129.
Pisciculus aculeatus. Will. ichth. 341.
Succis Spigg, Skitspigg, quod paulo urbanius Sköt-spigg pronunciatur. *Wermelandis* Hornfisk.
 Habitat in lacubus et aquis tardius fluentibus vulgaris, etiam in mari.
76. *GASTEROSTEUS pungitius* spinis dorsalibus decem. L. S. N. XII. T. I. p. 491. Fn. Su. 337. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 82. t. 53. f. 4.

Gaste-

- Gasterosteus aculeis* in dorso decem. Art. Gen. 52. Syn. 80. Spec. 97.
Tenspined Stickleback. Penn. Britt. Zool. 3. p. 262. t. 50. f. 130.
Pisciculus aculeatus minor. Will. ichth. 342.
Succis Bonunge. *Dalis* Gaddfur. *Dalecarlis* Gorquadd. *Scanis* Hundstagg. *Hollandis* Skinnåling.
 Habitat in omni rivulo.
77. *GASTEROSTEUS Spinachia* spinis dorsalibus quindecim. L. S. N. XII. T. I. p. 492. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 84. t. 53. f. 1.
Gasterosteus aculeis in dorso quindecim. Art. Gen. 52. Syn. 61.
Fifteen-spined Stickleback. Penn. Britt. Zool. 3. p. 263. t. 50. f. 131.
Aculeatus l. *Pungitius marinus* longus. Will. ichth. 340.
 Habitat in mari Balthico et occidentali.

SCOMBER.

- Caput* compressum laeve.
Membrana Branchiostega radiis VII.
Corpus laeve, linea laterali postico carinatum.
Pinnae spinosae saepius versus caudam.
78. *SCOMBER Scombrus* pinnulis quinque. L. S. N. XII. T. I. p. 492. Fn. Su. 339.
Scomber pinnulis quinque in extremo dorso, spina brevi ad anum. Art. Gen. 50. Syn. 48. Spec. 68.
Scomber pinnulis quinque in margine utroque caudae. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 88. t. 54.
Common Mackerell. Penn. Britt. Zool. 3. p. 264. t. 51. f. 132.

Y 2

Scom-

Scomber. Will. ichth. 181.

Suecis Makrill.

Habitat in mari occidentali et Sinu Codano.

79. *Scomber Thynnus* pinnulis utrinque octonis. L. S. N. XII. T. I. p. 493.

Scomber pinnulis octo vel novem in extremo dorso et sulco ad pinna ventrales. Art. Gen. 91. Syn. 49.

Scomber albicans. Osh. it. Chin. 69.

Scomber linea laterali laevi superius incurvata. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 95. t. 55.

Tunny. Penn. Britt. Zool. 3. p. 266. t. 52.

Makrel Störje. Ström. Nov. Act. Nid. 2. p. 341. c. fig.

Thynnus l. *Thunnus* *Belonii*. Will. ichth. 176.

Suecis Spanak Makrill.

Habitat in mari occidentali rarius.

80. *Scomber Trachurus* pinnulis unitis, spina dorsali recumbente, linea laterali loricata. L. S. N. XII. T. I. p. 494.

Scomber linea laterali aculeata, pinna ani ossiculorum triginta. Art. Gen. 51. Syn. 50.

Scomber linea laterali aculeata. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 104. t. 56.

Scad. Penn. Britt. Zool. 3. p. 269. t. 51. f. 134.

Trachurus. Will. ichth. 290.

Habitat in mari Balthico et occidentali rarius.

Pinnae Dorsae duae 1. 9. radio primo spina brevis recumbens 2. 35. *Aculei* duo ad anum. *Linea lateralis* supra pinnae Pectorales arcuata, dein recta, scutellis imbricatis aculeo reverso armatis.

M U L L U S.

Caput compressum, declive, squamis tectum.

Membrana Branchioflega radiis tribus.

Corpus squamis magnis, facile deciduis.

81. *Mullus Surmuletus* cirris geminis, lineis luteis longitudinalibus. L. S. N. XII. T. I. p. 496.

Trigla capite glabro, lineis utrinque quatuor longitudinalibus parallelis luteis. Art. Gen. 43. Syn. 72.

Mullus corpore rubro, striis luteis. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 111. t. 57.

Striped Surmulet. Penn. Britt. Zool. 3. p. 274. t. 53.

Mullus major nosler et Salviani. Will. ichth. 285.

Habitat in mari Balthico et occidentali, ad Suecica littora rarus.

Striarum lutesarum numerus variabilis.

T R I G L A.

Caput loricatum, lineis scabris.

Membrana Branchioflega radiis VII.

Digitii liberi ad pinnae pectorales.

82. *Trigla Gurnardus* digitis ternis, radiis pinnae pectoralium bifidis, linea laterali aculeata.

Trigla Gurnardus digitis ternis, dorso maculis nigris rubrisque. L. S. N. XII. T. I. p. 497.

Trigla varia: rostro diacantho; aculeis geminis ad utrumque oculum. Art. Gen. 46. Syn. 74.

Trigla lateribus nigris albisque punctatis, linea laterali aculeataque. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 121. t. 58.

Grey Gurnard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 276. t. 54.

Habitat in utroque mari.

83. *Trigla Cuculus* digitis ternis, linea laterali mutica. L. S. N. XII. T. I. p. 497.

Trigla tota rubens, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis. Art. Gen. 45. Syn. 74.

Trigla corpore rubro, macula nigra in pinna dorsali prima. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 124. t. 59.

Red Gurnard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 278. t. 57. f. 138.

Cuculus. Will. ichth. 281.

Habitat in mari occidentali.

84. *Trigla Hirundo* digitis ternis, radiis pinnae pectoralis multifida, linea laterali aculeata.
Trigla Hirundo digitis ternis, linea laterali aculeata. L. S. N. XII. T. I. p. 497. Fn. Su. 340.
Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales. Art. Gen. 44. Syn. 73. Linn. It. Welfrog. 176.
Trigla pinnis pectoralibus latis. Bloch. Pisc. Germ. 2. p. 126. t. 60.
Sapphirine Gurnard. Penn. Britt. Zool. 3. p. 280. t. 56.
Hirundo. Will. ichth. 230.
Succis Knorrhane. *Scanis* Knoding. *Marstrandis* Knot. *Hollandis* Smed.
 Habitat in mari Balthico rarius, in occidentali vulgaris.

6. ABDOMINALES.

COBITIS.

- Oculi* in suprema capitis parte.
Membrana Branchioflega radiis IV — VI. *Opercula* inferne clausa.
Corpus fere aequale, l. cauda versus pinnam minus angustata.
 85. *Cobitis Barbatula* cirris sex, capite inermi compresso. L. S. N. XII. T. I. p. 499. Fn. Su. 341.
Cobitis tota glabra maculosa, corpore subtereti. Art. Gen. 2. Syn. 2.
Cobitis capite inermi, sex cirris ad os. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 224. t. 31. f. 3.
Bearded Loche. Penn. Britt. Zool. 3. p. 282. t. 58. f. 142.
Cobitis fluviatilis barbatula. Will. ichth. 265.

Succis

- Succis* Gröning.
 Habitat in lacu Mälaren, infuc adlatus e Germania curante R. Friderico I.
 86. *Cobitis Taenia* cirris sex. Spina suboculari. L. S. N. XII. T. I. p. 499. Fn. Su. 342.
Cobitis aculeo bifurco infra utrumque oculum. Art. Gen. 2. Syn. 3. Spec. 4.
Cobitis aculeo bifurco in utramque latus capitis. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 221. t. 31. f. 2.
Cobitis barbatula aculeata. Will. ichth. 265.
Taenia cornuta. Will. ichth. 266.
Succis circa Mälaren Tänglake.
 Habitat in lacu Mälaren.
 87. *Cobitis fossilis* cirris octo, spina supraoculari. L. S. N. XII. T. I. p. 500. Fn. Su. 343.
Cobitis coerulescens lineis utrinque quinque longitudinalibus. Art. Gen. 2. Syn. 3.
Cobitis aculeo bifurco supra utrumque oculum Gronov. Act. Upl. 1742. p. 79. t. 3.
Cobitis cirris decem ad os. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 216. t. 31. f. 1.
Mugela fossilis. Will. ichth. 124.
 Habitat in Piscinis Ulricisdaliae lata.

SILURUS.

- Caput* nudum. *Os* cirris aliquot filiformibus.
Corpus: radius pinnarum pectoralium aut dorsalis primus spinosus, retrodentatus.
 88. *Silurus Glanis* pinna dorsali unica mutica, cirris sex. L. S. N. XII. T. I. p. 501. Fn. Su. 344. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 242. t. 34.

Mal.

Mal. it. Scan. 61. Act. R. Ac. Suec. 1756. p. 34. t. 3.
Silurus cirris quatuor in mento. *Art. Gen. 82. Syn.*
 110.

Silurus. *Holm. Act. Hafn. XII. p. 133. c. tab.*

Silurus. *Will. ichth. 128.*

Suecis *Mahl.*

Habitat in variis lacubus, ut in Mälaren, in Bärren Sundermanniae, ad Skeinge et Ousby Scaniae, Hund Öfirogothiae, etiam in lacu quodam provinciae Calmariensis etc. maximus dulcium aquarum.

Radius I. pinnarum pectoralium in hoc spinosus, versus apicem retrodentatus.

S. A L M O.

Caput laeve. *Dentes* in maxillis, lingua.

Corpus: pinna dorsalis postica adiposa. Pinnae ventrales multiradiatae.

* *Truttae* corpore variegato.

89. SALMO *Salar*, rostro ultra maxillam inferiorem prominente. *L. S. N. XII. T. I. p. 509. Fn. Su. 345. Art. Gen. 11. Syn. 22. Spec. 48.*

Salmo maxilla superiore ultra inferiorem prominente, pinna anali radiis tredecim. *Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 128. t. 20. foemina et 3. p. 146. t. 98. mas.*

Salmon. *Penn. Britt. Zool. 3. p. 284. t. 58. f. 143.*

Salmo. *Will. ichth. 189.*

Suecis *Lax. Blanklax.*

Habitat in mari, unde fluvios omnes fere, nisi vadosi sint, ascendit ova depositurus, et quidem hoc in australioribus provinciis maturius, in borealibus serius. In his uti Torneae et Kenis seu ad apicem maris Bothnici copiosissimus est; rarius apud nos
 hyemes

hyemes transigit, ut in lacu Siljan Dalecarliae, tumque facie multum mutatur.

Mares veteres rostro adunco, specie nullo modo differt. *Krok Lax* a nonnullis vocatur, etiam *Hakelax*.

90. SALMO *Eriox* maculis cinereis, caudae extremo aequali. *L. S. N. XII. T. I. p. 509. Fn. Su. 346. Art. Gen. 12. Syn. 23.*

Grey. Penn. Britt. Zool. 3. p. 295.

Salmo cinereus aut griseus. *Will. ichth. 193.*

Suecis *Grå Lax.*

Habitat in mari, praecedente minor et rarior.

Crassior et latior quam praecedens, nec fluvios ante Augustum ascendere dicitur, quod diversam indicare videtur speciem.

91. SALMO *Trutta* ocellis nigris iridibus brunneis, pinna pectorali punctis sex. *L. S. N. XII. T. I. p. 509. Fn. Su. 347.*

Salmo latus maculis rubris nigrisque, cauda aequali. *Art. Gen. 12. Syn. 24. Spec. 51.*

Salmo ocellis nigris iridibus lucidioribus, pinna anali radiis undecim. *Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 143. t. 21.*

Sea Trout. *Penn. Britt. Zool. 3. p. 296.*

Trutta Salmonata. *Will. ichth. 193.*

Suecis *Örlax*, alibi *Börtling*. *Scanis Laxöra, Laxö-ring.*

Habitat in mari, unde fluvios ascendit, parcius in australioribus provinciis quam in Dalecarlia et Norlandia; etiam lacustris.

Maculae pinnarum saepe desunt.

92. SALMO *Fario* maculis rubris, maxilla inferiore sublongiora. *L. S. N. XII. T. I. p. 509. Fn. Su. 348.*

Salmo

Salmo maxilla inferiore parum longiore, maculis rubris. Art. Gen. 12. Syn. 23. Spec. 51.

Salmo ocellis rubris iridibus lucidioribus, pinna anali radiis undecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 143. t. 22.

Trout. Penn. Britt. Zool. 3. p. 297. t. 59. l. 146.

Trutta fluviatilis. Will. icht. 199.

Suecis. Forcell, alibi perperam Laxöring. *Angerman-
nir* Stenbit, Bäck-rö, Rödfisk.

Habitat in fluviis rivulisque.

Samlet. Penn. Britt. Zool. p. 303. t. 59. l. 148. huic
simillimus, nisi quod cauda ei sit bifurca.

Species et varietates certe non bene distinxit Cel.
GISLÉN in Act. R. Ac. Suec. 1751.

93. *SALMO alpinus* dorso nigro, lateribus coeruleis,
ventre fulvo. L. S. N. XII. T. L. p. 510. Fn. Su.
349.

Röding. it. Westrog. p. 257.

*Salmo vix pedalis; pinnis ventralibus rubris, maxilla
inferiore paulo longiore.* Art. Gen. 13. Syn. 25.

Spec. 52.

*Salmo maculis non ocellatis variis, pinna caudali
truncata.* Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 159. t. 104?

Salmo alpinus. Berl. Gef. Schrift. 2. p. 297?

Charr. Penn. Britt. Zool. 3. p. 305. t. 60.?

Umbla minor. Will. icht. 196?

Suecis Röding. *Lappis* Raud.

Habitat in lacubus alpium Lapponicarum summis vulga-
tissimus et fere unicus piscis in lacu Yngen Wer-
melandiae et Wetteru.

Longitudo communiter unc. XIII. *Squamae* minutissi-
mae sunt. *Caput* glabrum, ovatum, obtusum. *Maxillae*
dentatae. *Lingua* duobus ordinibus dentium, singulo
hoc ordine VI dentibus constans. *Palatum* ad latera
dentatum. *Nares* parvae duplici foramine in singulo
latere,

latere, altero supra alterum, quorum inferius majus
clausum. *Oculorum* iris grisea; pupilla nigra; infra
oculos in mala seu osse carnibus vestito puncta VII ex-
cavata longitudinaliter digesta; in eodem osse posterius
puncta III perpendiculari ordine collocata. *Membranae*
Branchiostega ossiculis decem.

Pinnae dorsae radiis XII. quorum duo priores sensim
longiores, tertius et quartus longissimi cum sequentibus
divisi.

Color totius piscis supra a dorso niger est, ad latera
cyaneus l. dilute coeruleus; venter vero fulvus l. rubro-
luteus. *Caput* et *gula* alba sunt. *Pinnae ventrales* ru-
brae, exteriori margine albae; puncta lutescentia se-
cundum lineam lateralem longitudinaliter lateribus ad-
sperfa sunt. *Cauda* bifurca colore lateris.

Proportio a rostris ad basin capitis unc. 1½. a capite
ad pinnam dorsae unc. 3½. dorsalis pinnae basis unc. 1½.
ejusdem altitudo unc. 2. a dorsali pinna ad adiposam
unc. 3. a cauda ad adiposam 2½. a cauda ad pinnam ani
unc. 1½. *Caro* omnium sapidissima ruberrimo pulchro
colore. à LINNÆ Fn. Su.

Salmo Alpinus Fabr. Fn. Groenl. 125. diversus a no-
stro, at *Rauda* vel *Röje* Norwegorum noster videtur.
Synonyma praeter *ANTEA* dubia sunt.

94. *SALMO Goedenii*, maculis rubris ocellatis, maxillis
aequalibus, cauda bifurca.

Salmo Goedenii capite parvo, maculis rubris ad trun-
cum, Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 155. t. 102.

Habitat in mari Balthico.

Sesquipedalis, in dorso maculae rufae, in lateri-
bus ocellatae irida alba. *Pinna dorsae* maculata, *caudas*
minus quam in sequente acute fissa. Br. 10. P. 15. V.
10. A. 11. D. 12. C. 18.

95. SALMO *Schiefermulleri* maculis nigris lunatis, maxilla inferiore longiore, cauda bifurca.

Salmo maxilla inferiore longiore, maculis nigris. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 157. t. 103.

Habitat in mari Balthico.

Piscis argenteus, lateribus rubore debili perfusus, maculae parvae vel potius lineolae arcuatae nigrae. Dorsum coerulelescens. Cauda bifurca sinu acuto. Br. 12. F. 10. P. 18. A. 13. D. 15. C. 19.

** *Omeri*, pinna ani dorsoque oppositis.

96. SALMO *Eperlanus* capite diaphano, radiis pinnae ani septendecim. L. S. N. XII. T. I. p. 511. Fn. Su. 350.

Omerus radiis pinnae ani septendecim. Art. Gen. 10. Syn. 21. Spec. 45.

α. *Salmo* maxilla inferiore longiore, pinna ani radiis septendecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 179. t. 28. f. 2. Smelt. Penn. Britt. Zool. 3. p. 315. t. 61. f. 151.

Eperlanus. Will. ichth. 202.

Suecis Nors.

β. *Salmo Eperlano-marinus*, Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 182. t. 28. f. 1.

Suecis Slom.

Habitat α in lacubus Sueciae indeque fluvios ascendunt myriades, in Scania vix repertus. β marinus fluvios ingredit et lacus nonnumquam.

α. minor foetet etiam allatus, β major haud foetidus.

*** *Coregoni dentibus vix conspicuis.*

97. SALMO *Lavaretus* maxilla superiore longiore, radiis pinnae dorsi quatuordecim. L. S. N. XII. T. I. p. 512. Fn. Su. 352.

Core-

Coregonus maxilla superiore longiore plana, pinna dorsi ossiculorum quatuordecim. Art. Gen. 10. Syn. 19 β Spec. 37.

α. *Salmo* rostro nasiformi. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 163. t. 25.

Albula nobilis. Will. ichth. 183.

Suecis Sijk, Stor. Sijk.

β. *Salmo* rostro nasiformi, corpore Lavareto latiore. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 170. t. 26.

Suecis Lapp Sijk. Gsiler Act. R. Ac. Su. 1753. p. 195.

γ. Finn-Sijk. Gsiler l. cit.

Habitat in mari Balthico et occidentali, nec non in variis lacubus et fluviis, β locis alpinis, γ in lacubus majoribus.

Var. β dorso acutiusculo, latior multo var. α, firiis praeterea et pinnis coeruleiscentibus, γ dorso rotundato nigrescente.

98. SALMO *Albula*, maxillis edentulis: inferiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 512. Fn. Su. 353.

Coregonus edentulus, maxilla inferiore longiore. Art. Gen. 9. Syn. 18. Spec. 40.

Salmo Maraenula. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 176. t. 28. f. 3.?

Albula minima. Will. ichth. 186.

Suecis Sijklöja, Små-Sijk. Scanis Sijk. Dalecharlis Blickta. Norrlandis Stint, minor Rabboxe, Småling. Fennis Moiku, Rapis.

Habitat in plurimis lacubus Sueciae. Paucit circa initium hyemis.

S. maraenula vix a nostro diversus.

99. SALMO *Thymallus* maxilla superiore longiore, pinna dorsi radiis viginti tribus. L. S. N. XII. T. I. p. 512. Fn. Su. 354.

Core-

Coregonus maxilla superiore longiore, pinna dorsi offi-
culorum viginti trium. Art. Gen. 10. Syn. 20. Sp. 41.

Salmo pinna dorsi radiis XXIII. Bloch. Pisc. Germ. 1.
p. 153. t. 24.

Grayling. Penn. Britt. Zool. 3. p. 311. t. 61. f. 150.

Thymallus. Will. ichth. 183.

Suecis Harr.

Habitat in Angermanniæ et variis Norrlandiæ partibus.

Facies Albulæ, glabra. *Osi* dentibus utrinque minu-
tissimis. *Rostrum* obtusum, maxillis fere aequalibus.
Membr. Branchioflega radiis IX. *Pinna dorsi* in medio
dorsi, reliquis major, altitudine et longitudine eadem:
radiis XXI mollibus, quorum V anteriores sensim bre-
viores simplices, reliqui ramosi; pinna abrupta est;
adiposa ut in reliquis absque radiis. *Cauda* bifurca ad
medium: radiis multis articulatis multifidis. *Pinna ani*
abrupta: radiis XII. dichotomis. *Pectorales* radiis XI
dichotomis. *Ventrales* radiis XV multifidis. à LINNÆ.

100. SALMO *Wimba* pinna adiposa sublerrata. L. S. N.
XII. T. I. p. 512. Fa. Su. 351.

Animi Wimma, it. Westrog. 231.

Suecis Wimma.

Habitat in lacu Wenern, Animmen Wermelandiæ.

Cauda forficata. *Linea lateralis* recta. P. D. 12. P.
16. V. 20. A. 14.

E S O X.

Caput supra planiusculum; mandibula superiore
plana brevior: inferiore punctata. *Dentes*
in maxilla, lingua.

Membrana Branchioflega radiis XIV.

Corpus elongatum.

101. *Esox Lucius* rostro depresso subæquali. L. S. N.
XII. T. I. p. 516. Fa. Su. 355.

Esox

Esox rostro plagioplateo. Art. Gen. 14. Syn. 26. Sp. 53.
Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 229. t. 32.

Pike. Penn. Britt. Zool. 3. p. 320. t. 63. f. 155.

Lucius. Will. ichth. 236.

Suecis Gädde.

Habitat ad ripas maris Balthici, in omni lacu ac
fluvio, in paludibus passim ac fossis turfatarum etc.

102. *Esox Belone* rostro utraque maxilla subulato. L.
S. N. XII. T. I. 517. Fa. Su. 356

Esox rostro cuspidato gracili, subtereti, spithamali.
Art. Gen. 14. Syn. 27.

Esox rostro subulato. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 236. t. 33.

Gar-Pike. Penn. Britt. Zool. 3. p. 324. t. 63. f. 154.

Acus vulgaris. Will. ichth. 231.

Suecis Näbbgädde. *Scanis* Horngädde. *Bahusienfibus*
Horngäll.

Habitat in utroque mari.

Caput quadratum, superne viride, lateribus argen-
teis glabris. *Oculi* albi pupilla nigra. *Nares* magne
papilla refertæ. *Osi* subulatum, capite ipso longius;
maxilla inferior longior apice carneo. *Dentes* in mar-
gine utriusque maxillæ; pauci in medio palato secun-
dum areolam longitudinalem minimam. *Membr. Bran-
chioflega* radiis XII, non XIV. *Corpus* subteretes parum
compressum, flexile, superne viride, sub linea laterali
argenteum.

Pinnæ Pectorales ad basin capitis, radiis XIII. ar-
ticulatis ramosisque, excepta prima indivisa.

Pinnæ Ventrales remotissimæ a capite, radiis VII.
primo longiore indiviso.

Pinna ani longa falcata, interrupta, radiis XX,
quorum tres primi indivisi, horum primus minimus,
secundus maximus.

Pinnæ

Pinna dorsif exacto opposita pinnae ani, ejusdemque figurae et longitudinis, interrupta et falcata, radiis XVI. primo minimo indiviso, secundo tertioque maximis.

Linea lateralis in medio lateris, obsoleta; *ventrales* tres, quarum laterales duae oppositae a gula tendunt ad exteriorem marginem pinnarum ventralium versus caudam, intermedia vero a gula recta versus anum.

Maxilla utraque mobilis, superior mediante cartilagine, qua cranio annexa est, exferens utrinque extra oris sinum prominentiam osseam, quae recipitur a sinu capiti insculpto.

Dentes subulati, distantes, ad oris interioris marginem majores: denticuli acerosi minimi, vix conspicui, sparsi citra ordinem maxillae adnascuntur.

Lingua glabra. *Cranium* pellucidum. *Vertebrae* 79. *Ossa* viridia.

C L U P E A.

Caput mystacibus serratis maxillae superioris.

Membrana Branchiosfega radiis VIII. *Branchiae* interne setaceae.

Corpus abdominis carina serrata. *Pinnae Ventrals* saepe novemradiatae.

103. *CLUPEA Harengus* immaculata, maxilla inferiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 522. Fn. Su. 357.

Clupea maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens. Art. Gen. 7. Syn. 14.

α. *Clupea* maxilla inferiore longiore, pinna ani radiis septendecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 186. t. 29. f. 1.

British Herring. Penn. Britt. Zool. 5. p. 335. t. 68. f. 161.

Harengus. Will. ichth. 219. Art. Syn. 14. α.

Suecis Sill.

β. *Clu-*

α. *Clupea* etc. Art. Syn. 15. β. Spec. 51.

Suecis Strömming.

Habitat α in mari occidentali et ad littora Scaniae australis. β. in mari Balthico, praecipue Bothnico; harum intermedia ratione magnitudinis ad littora Scaniae orientalis et Blekingiae.

104. *CLUPEA Sprattus* pinna dorsali radiis tredecim. L. S. N. XII. T. I. p. 523. Fn. Su. 358.

Clupea quadriuncialis maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo. Art. Gen. 7. Syn. 17. Spec. 33.

Clupea maxilla inferiore longiore, pinna anali radiis novendecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 206. t. 29. f. 2.

Sprat. Penn. Britt. Zool. 5. p. 346.

Spratti. Will. ichth. p. 221.

Suecis Wafsbuk.

Habitat in mari occidentali et Balthico.

105. *CLUPEA Alofa* lateribus nigro-maculatis, rostro bifido. L. S. N. XII. T. I. p. 525. Act. Physiogr. I. p. 318.

Clupea apice maxillae superioris bifido, maculis nigris utrinque. Art. Gen. 7. Syn. 15. α. Spec. 34.

Clupea maxilla superiore in apice crenata. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 209. t. 30. f. 1.

Shad. Penn. Britt. Zool. 5. p. 348. t. 69. f. 164.

Clupea. Will. ichth. 227.

Suecis Stakfill.

Habitat in mari occidentali rarius.

Alofa Hasselquisti ut et Pilchard Anglor. ab hac specie omnino diverſae.

Z

106.

106. *CLUPEA Encrasicolus* maxilla superiore longiore. L. S. N. XII. T. I. p. 525. Art. Gen. 7. Syn. 17.
Clupea maxilla superiore prominente. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 212. t. 30. f. 2.
Anchovy. Penn. Britt. Zool. 3. p. 347.
Encrasicolus. Will. ichth. 225.
Suecis Ansjovis.

Habitat in mari Balthico rarius, in occidentali frequentior. Hispanicus et Gallicus certe a nostro diversus.

CYPRINUS.

- Caput ore plerisque edentulo. Os nasale bifidum.
 Membrana Branchiostega radiis III.
 Corpus laeve albens. Pinnae carinales laepe novenradiatae.

* Barbati seu ad os cirrosi.

107. *CYPRINUS Carpio* pinna ani radiis novem, cirris quatuor, pinnae dorsalis radio secundo postice serrato. L. S. N. XII. T. I. p. 525. Fn. Su. 359.
Cyprinus cirris quatuor, ossiculo tertio pinnarum dorsae ac ani uncinulis armato. Art. Gen. 4. Syn. 5. Spec. 25.
Cyprinus ossiculo tertio in pinnae dorsae anique serrato. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 92. t. 16.
Carp. Penn. Britt. Zool. 3. p. 355. t. 70. f. 165.
Cyprinus. Will. ichth. 245.
Suecis Karp.

Habitat in Piscinis Scaniae cultus.

108. *CYPRINUS Tinca* pinna ani radiis viginti quinque, cauda subintegra, corpore mucoso, cirris binis. L. S. N. XII. T. I. p. 526. Fn. Su. 363.

Cypr

- Cyprinus mucosus* totus nigrescens, extremitate caudae aequali. Art. Gen. 4. Syn. 5. Spec. 27.
Cyprinus Iquamis parvis, pinnis crassis. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 85. t. 14.
Tench. Penn. Britt. Zool. 3. p. 359.
Tinea. Will. ichth. 251.
Suecis Sutare, Skomakare, Linnare.

Habitat in lacubus lutosis et Piscinis.

109. *CYPRINUS Gobio* pinna ani radiis undecim, cirris duobus. L. S. N. XII. T. I. p. f. 526.
Cyprinus quincuncialis maculosus, maxilla superiore longiore, cirris duobus ad os. Art. Gen. 4. Syn. 11. Spec. 13.
Cyprinus oblongus varius cirris duobus ad angulum oris. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 57. t. 8. f. 2.
Gudgeon. Penn. Britt. Zool. 3. p. 361. Will. ichth. 264.
Scanis Slätting.

Habitat in lacu Finja Sjö Scaniae, forte et alibi.

** Imberbes pinna caudae indivisa.

110. *CYPRINUS Carassius* pinna ani radiis decem: cauda integra, linea laterali recta. L. S. N. XII. T. I. p. 526. Fn. Su. 364.
Cyprinus pinnae dorsae ossiculorum viginti, linea laterali recta. Art. Gen. 4. Syn. 5. Spec. 29.
Cyprinus linea laterali recta, pinnae caudae indivisa, anali radiis decem. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 69. t. 11.
Crucian. Penn. Britt. Zool. 3. p. 364. t. 72. f. 171.
Carassius simpliciter dictus. Will. ichth. 249.
Suecis Ruda. *Scanis* Karus.

Habitat in piscinis praesertim Scaniae frequens, rarius in lacubus.

Z 2

*** Im-

*** *Imberbes, caudae pinna bifida.*

111. *CYPRINUS Phoxinus* pinna ani radiis octo, macula fusca ad caudam, corpore pellucido. L. S. N. XII. T. I. p. 528.

Cyprinus tridactylus varius oblongus teretiufculus, pinna ani ossiculorum octo. Art. Syn. 12.

Cyprinus teretiufculus, pinnis ventralibus, anali dorsali que radiis decem. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 60. t. 8. f. 5.

Minow. Penn. Britt. Zool. 3. p. 373.

Phoxinus laevis. Will. ichth. 268.

Scania Elritzer. Gochangis Hundgädda.

Habitat in rivulis Scaniae sabulosis hinc inde. Pinna caudae lobis acutis.

112. *CYPRINUS Aphyia* pinna ani radiis octo, iridibus rubris, corpore pellucido. L. S. N. XII. T. I. p. 528. Fn. Su. 374.

Cyprinus minimus, it. Westrog. 232.

Phoxinus seu *Cobitis*, Cyprini species, it. Westrog. 152.

Cyprinus biuncialis iridibus rubris et pinna ani ossiculorum novem. Art. Gen. 4. Syn. 13. Spec. 30.

Cyprinus radiis novem in pinna anali dorsali que. Bloch. Pisc. Germ. 3. p. 145. t. 97. f. 2.

Suecis Mudd, Budd, Gli. *Dalekarlis* Quidd. Iggling. *Westrobothniensis* Glirr. *Dalis* Alkufwa. *Ostrogothis* Alkutta. *Loppis* Sollenfödg.

Habitat in lacubus, fluviis et rivulis sat frequens. Pinna caudae lobis rotundatis.

113. *CYPRINUS Dobula* pinna ani dorsali que radiis decem. L. S. N. XII. T. I. p. 523.

Cypr-

Cyprinus pedalis gracilis oblongus crassiusculus, dorso crasso, pinna ani ossiculorum novem. Art. Syn. 10.

Cyprinus oblongus, pinna ani dorsali que radiis XI. P. XV. V. IX. A. XI. C. XVIII. D. XI. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 42. t. 5.

Smolandis Bjelke.

Habitat in fluvio Nissa Smolandiae, forte et alibi.

Margo squamarum argentearum quinquestriatarum pulchre ac dense nigro-punctatus.

114. *CYPRINUS Grilagine* pinna ani radiis undecim, pinnis albescentibus. L. S. N. XII. T. I. p. 529. Fn. Su. 367. Act. Upl. 1744. p. 35. t. 3.

Cyprinus oblongus, iride argentea et pinnis albescentibus. Art. Gen. 5.

Cyprinus oblongus figura Rutili, pinna ani ossiculorum decem. Art. Gen. 5. Spec. 12.

Grilagine angustae dictus, Gobii fluvialis species. Will. ichth. 263?

Suecis Stäm. *Dalekarlis* Strälling.

Habitat in mari Bothnico ac fluviis Angermanniae, Westrobothniae, Ostrobothniae.

115. *CYPRINUS Idbarus* pinna ani radiis duodecim, pinnis ventralibus languinis. L. S. N. XII. T. I. p. 529.

Dalekarlis Idbaru.

Habitat in lacu Siljan Dalecarliae.

116. *CYPRINUS Rutilus* pinna ani radiis duodecim, rubicunda. L. S. N. XII. T. I. p. 529. Fn. Su. 374.

Cyprinus iride, pinnis ventris ac ani plerumque rubentibus. Art. Gen. 3. Syn. 10. Spec. 10.

Cypr-

Cyprinus iride, pinnis omnibus rubris, et in anali quatuordecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 32. t. 2.

Bloch. Penn. Britt. Zool. 3. p. 365. icon. in fronte libri.
Suecic Mört.

Habitat in omnibus Sueciae lacubus vulgarissimus. Vulgo ova ponit dum *Caltha* florescit.

Pinnae ventrales obtusae.

117. *CYPRINUS Idus* pinna ani radiis tredecim rubra. L. S. N. XII. T. I. p. 529. Fn. Su. 362.

Cyprinus iride sublutes, pinnis ventralibus anique rubris. Art. Gen. 5. Syn. 14. Spec. 6.

Cyprinus corpore crasso pinna ani radiis tredecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 253. t. 36.

Suecic Id. *Eskilstonis* Tjockfalling. *Torsbellis* Karp. *Scanus* Ort.

Habitat in lacubus et fluviis passim, etiam in sinibus maris Baltici.

118. *CYPRINUS Erythrophthalmus* pinna ani radiis quindecim, pinnis rubris. L. S. N. XII. T. I. p. 530. Fn. Su. 366.

Cyprinus iride, pinnis omnibus eadumque rubris. Art. Gen. 5. Syn. 10. Spec. 10.

Cyprinus latus, iride crocea, pinnis ventralibus anali caudaeque cinnabarinis. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 28. t. 1.

Rud. Penn. Britt. Zool. 3. p. 363. t. 72. f. 170.

Erythrophthalmus. *Bramis* affinis. Will. ichth. 249.
Suecic Sarf. Ilarf.

Habitat in lacubus et fluviis vulgaris.

Puncta lineae lateralis 60 elevata Læxer. 30 utrinque Bloch. An Ros Osbeck in Act. R. Ac. Su. 1731.

p. 152. t. 4?

119. *CYPRINUS Aspius* pinna ani radiis sedecim, maxilla inferiore longiore incurva. L. S. N. XII. T. I. p. 530. Fn. Su. 361.

Cyprinus maxilla inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani ossiculorum quindecim. Art. Gen. 6. Syn. 14. Spec. 14.

Cyprinus maxilla inferiore incurva, pinna ani radiis sedecim. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 48. t. 7.

Suecic Asp.

Habitat in lacubus et fluviis Upsaliensi, Arbogensi, Swartån, Roxen, Helje à Gothungiae etc.

120. *CYPRINUS Alburnus* pinna ani radiis viginti. L. S. N. XII. T. I. p. 531. Fn. Su. 373.

Cyprinus quadriuncialis, pinna ani ossiculorum viginti. Art. Gen. 6. Syn. 10. Spec. 17.

Cyprinus maxilla inferiore prominente, pinna ani radiis XXI. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 54. t. 8. f. 4.

Bleak. Penn. Britt. Zool. 3. p. 370. t. 73. f. 176.

Alburnus. Will. ichth. 273.

Suecic Löja. Benlöja.

Habitat in omni lacu Sueciae vulgarissimus.

121. *CYPRINUS Wimba* pinna ani radiis viginti quatuor, rostro nasiformi. L. S. N. XII. T. I. p. 531. Fn. Su. 368.

Cyprinus rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani ossiculorum viginti quatuor. Art. Gen. 6. Syn. 14. Spec. 18.

Cyprinus Capito Anadromus dictus. Art. Syn. 8.

Cyprinus maxilla superiore prominente, pinna ani radiis viginti tribus. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 38. f. 4.

Capito Anadromus. Will. ichth. 257.

Sueci Wimma, Noswimma, Wimba.

Habitat in lacu Mälaren, amne Uplaliensi, lacu Rösen etc. forte ex mari Balthico ascendens.

122. *CYPRINUS Erama* pinna ani radiis viginti septem, pinnis fuscis. L. S. N. XII. T. I. p. 531. Fn. Su. 360.

Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officulorum viginti septem. Art. Gen. 6. Syn. 4. Spec. 20.

Cyprinus pinnis nigrescentibus, pinna ani officulorum viginti novem. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 75. t. 13.

Bream. Penn. Britt. Zool. 3. p. 362. t. 70. f. 169.

Cyprinus latus l. *Brama*. Will. ichth. 248.

Sueci Braxen, Ruslicis Scaniae Brasen.

Habitat in plerisque lacubus Sueciae. Parit eo tempore, quo Juniperus mas pollinem fundit.

Varietas gibbosa in latu Wetteru ad Askerfund.

123. *CYPRINUS cultratus* pinna ani radiis triginta, linea laterali declinata, ventre scutissimo. L. S. N. XII. T. I. p. 531. Fn. Su. 370.

Skärknif. it. Scan. p. 81. t. 2. f. 1.

Cyprinus pinna dorli anali opposita. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 255. t. 37.

Scanis Skärknif.

Habitat in Helje å ad Christianstad rarius.

124. *CYPRINUS Biverkna* pinna ani radiis triginta quinque. L. S. N. XII. T. I. p. 532. Fn. Su. 371.

Cyprinus quincuncialis pinna ani officulorum viginti quinque. Art. Gen. 3. Syn. 13. Spec. 20.

Sueci

Sueci Björka, Björkna, Bjerka, Bjerke, Björkfiak. Habitat in lacubus vulgaris.

Singulare quod Artedi 25, Linné vero 35 radios in pinna anali numeravit.

125. *CYPRINUS Farenus* pinna ani triginta septem, iridibus flavis. L. S. N. XII. T. I. p. 532. Fn. Su. 369.

Cyprinus iride flava, pinna ani officulorum triginta septem. Art. Spec. 23.

Uplandis, Faren, Farren.

Habitat in lacu Mälaren, praesertim ad pontem Öresundsbro.

126. *CYPRINUS Balleus* pinna ani radiis quadraginta. L. S. N. XII. T. I. p. 532. Fn. Su. 365.

Cyprinus admodum latus et tenuis, pinna ani officulorum quadraginta. Art. Gen. 3. Syn. 12. Spec. 25.

Cyprinus pinna ani radiis XLI. Bloch. Pisc. Germ. 1. p. 62. t. 9.

Sueci. Blicka, Braxenpanka, Braxenblicka. Smolandis Braxenlicka. Scanis Flira, Braxenflira.

Habitat in omnibus facile Sueciae lacubus vulgaris.

L A M P R I S.

Os edentulum, maxillis nudis.

Lingua carnosa, lata.

Membrana Branchioflegm radiis VI.

Foramen longum pone pinnas pectorales.

Sternum osseum.

127. *LAMPREIS guttatus*. N. Act. R. Ac. Su.

Piscis autis maculis etc. Sibb. Scot. t. 6.

Opah

Opah or *Kingfish*. Phil. Transact. Vol. 46. n. 498. p. 518. abridg. Vol. XI. p. 379. t. V.

Zeus cauda bifurca. Ström. Söndm. Beskr. p. 323. t. 1. f. 20. Prodr. Zool. Dan. 370.

Zeus Opah. Penn. Britt. Zool. 3. p. 225. t. 42.

Zeus gustatus. Act. Hafn. Nov. 3. p. 398. t. A.

Zeus Luna. Gmel. Syst. Lin. T. I. P. III. p. 1225.

Poisson Lune. Du Hamel Tr. des Pêches. T. 3. P. 2. S. 4. p. 74. T. XV.

Habitat in Pelago, mare occidentale rarius intrans.



Libri sequentes venduntur pretiis adjectis

apud

Siegfried Lebrecht Crusium,

cujus sumtibus illi impressi sunt:

In Reichsthaler à 24 Groschen.

- Baumgarten, Jo. Christ. Gottl., Flora Lipsiensis, sistens plantas circuli Lipsici spontaneas sec. Systema sexuale revivum emendatumque distributas cum synonymis perpaucis etc. cum IV Tab. senis, 8. maj. 1790. 2 thlr. 8 gr.
- — cum fig. coloratis. 2 thlr. 20 gr.
- Broussonet, A., Ichthyologia, sistens piscium descriptiones et icones, fol. Londini, 782. 3 thlr. 12 gr.
- Feller, Chr. Gottl., de methodis suffusionem oculorum curandi à Casparata et Simone cultis. 8. maj. 782. 2 Gr.
- Fischer, Joh. Leonh., Descriptio anatomica Nervorum Lumbelium, Sacralium et extremitatum inferiorum, cum IV Tabulis linearibus et IV adumbratis, fol. maj. 793. 3 thlr.
- historia tæniæ hydatigense in plexu choroideo inventæ, accedunt nonnullæ alius argumenti de vermibus intestinalibus observationes, cum tabula senis. 8. maj. 789. 6 gr.
- Geer, Caroli Lib. Bar. de, genera et species insectorum e generosissimi sutoris scripæ extraxit, digessit, lat. quoad partem edidit, et terminologiam insect. Linneamam addidit Andr. Joh. Kerzler, 8. maj. 782. 12 gr.
- Hedwigii, Joan., Fundamentum historis naturalis muscorum siccatorum, concernens eorum flores, fructus, seminalem propagationem, adjecta generum dispositione methodica iconibus illustrat. Pars I. et II. 4. maj. 781. 4 thlr. 12 gr.
- idem, cum iconib. color. 7 thlr.
- Historia pathologica singularis cutis turpitudinis Jo. Godofr. Rheinhardi viri I. annorum. Præfatus est D. Christianus Fridericus Ludwig. Cum 3 Fig. coloratis, lat. et germanice, fol. maj. 795. 1 thlr.
- Hoffmanni, Georg. Franc., historis salicum iconibus illustrata, Vol. I. fasc. 1—IV, fol. maj. 1785. et Vol. II. fasc. 1. 1791. 5 thlr. 8 gr.
- Eadem cum Fig. coloratis. Vol. I. fasc. I—IV. et Vol. II. fasc. I. 10 thlr.
- plantæ lichenoisæ delineatæ et descriptæ, Vol. I. fasc. I—IV. Vol. II. fasc. 1—IV. et Vol. III. fasc. I. II. III. cum LXVI fig. coloratis, fol. 1789—1799. quisque Fasc. 3 thlr. 12 gr. 15 thlr. 12 gr.
- Kreyssig, F. L., de Peripneumonia nervosa seu maligna commentatio, 8. 796. 8 gr.
- Kuehni, C. G., Bibliotheca medica, continens scripta medicorum omnis ævi, ordine methodico disposita, Vol. I. 8. maj. 794. 1 thlr.
- Leske,

Leske, Nath. Gudofr., Ichthyologiae Lipsiensis specimen, 8. maj. 6 gr.

Linné, Carol. a. plantarum rariorum horti Upsalienfis fasciculus I. sive descriptiones et figurae plantarum minus cognitarum, fol. maj. 267. 20 gr.

Ludwigii, Chr. Fr., primae lineae anatomiae pathologicae sive de morbofa partium corp. human. fabrica libellus in usum discipulorum, 8. maj. 785. 8 gr.

— delectus opusculorum ad scientiam naturalem spectantium, Vol. I. cum fig. 2. maj. 789. 1 thlr. 20 gr.

— Icones Cavertum thoracis et abdominis a tergo apertarum, cum 2 fig. fol. maj. 759. 16 gr.

Lumitzeri, Steph., Flora Potosiensis exhibens plantas circa Potosium sponte crescentes secundum Systema Sexualis Linnæi digesta cum figuris, 8. maj. 791. 1 thlr. 12 gr.

Mead, Richard, monita et praecepta medica, editio secunda, 8. 759. 4 gr.

Müller, Otho Fridericus, Hydrachnas quas in aquis Daniae palustribus decessit, descriptis, pugi et tabulis XI aetatis incidi curavit, 4. maj. 781. 2 thlr. 12 gr.

Flameri, Ernesti, Quaestionum physiologicarum libri duo: primum est prooemium in partem de constituenda physiologiae disciplina, 8. maj. 791. 1 thlr.

Berzi, And. Joannis, Observationes botanicae, VI Fasc. fol. maj. 778—91. 5 thlr.

— cum figuris coloratis, fol. maj. 8 thlr. 16 gr.

— Flora Scandinaviae prodromus; editio altera et emend. 8. maj. 795. 1 thlr. 4 gr.

Sancroni, Sanct., spherium de medicina statica cum scholiis Andr. Rudigeri, 8. 750. 4 gr.

Sauri, M. l'Abbe, Precis d'histoire naturelle, 7 Tom. gr. 12. 779.

Scarpa, Ant. oratio de promovendis anatomicarum administrationum rationibus, 8. maj. 785. 3 gr.

Schwaderi, Henr. Adolphi, nova genera plantarum, Pars Ima, cum tab. aeneis coloratis, fol. 797. 1 thlr. 12 gr.

Schreberi, Joh. Christ. Han., plantarum vernicillatarum unilobatarum genera, et species. Cum icon. aeneis, 4. maj. 774. 16 gr.

— de Phasco Observationes, quibus hoc Genus Muscorum vindicatur atque illustratur, cum Tabulis seri incis. 4. maj. 770. 6 gr.

Schürze, Aug., de methodi in morbis expectandi praesentia, 8. 785. 1 R.

Selig, D. Joa. Th. Val., Observationes medicae in morbis quibusdam difficilioribus, 8. 795. 12 gr.

Werneri, Paul. Chr. Fr., verumque intestinalium, praesertim rennae humanae, brevis expositio, cum Conjectat. 1. 2. et 3. et Tab. aeneis illustrata, 8. maj. 781—83. 2 thlr.

— et Felseri, Chr. Goth., viscerum lacteorum atque lymphaticorum anatom. physiol. descriptio, Fasc. I. c. fig. 4. maj. 785. 1 thlr. 12 gr.

Abriss der Forstbewirtschaftung in den Königl. Preussischen Staaten, gr. 8. 792. 8 gr.

Ackermanns, Doct. I. C. H., medicinische Skizzen, 12 u. 28 Hefte, 8. 790. 8 gr.

Adams, Georg, Vorlesungen über die Experimentalphysik, nach ihrem gegenwärtigen Zustande, in unterhaltenden und fasslichen Erklärungen der vornehmsten Erscheinungen in der Natur mit Rücksicht auf die Güte, Weisheit und Macht ihres Urhebers, a. d. Englischen mit Anmerk. von I. G. Geisler, 12 u. 12 Theil mit Kupfern, gr. 8. 798—99. 5 thlr. 8 gr.

Apothekerbuch, Londner, nach der neuesten Originalausgabe übersetzt und mit einigen Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben von Doct. Chr. G. Eschenbach, 8. 789. 10 gr.

Bauer, Carl Gottfr., über die Mittel, dem Geschlechtsrieche eine unschädliche Richtung zu geben, eine gekürzte Preisschrift, mit einer Vorrede und Anmerkungen von C. G. Salzmann, 8. 791. 1 thlr. 8 gr.

Bayen, Herrn, chymische Untersuchung über das Zinn, und Beantwortung der Frage: Ob man sich ohne Gefahr zu ökonomischem Gebrauche der zinnernen Gefäße bedienen könne? a. d. Franz. und mit Anmerkungen übersetzt von I. G. Leubardt, gr. 8. 784. 14 gr.

Bechers, Dr. Dav., neue Abhandlung vom Carlsbade, mit Kupf. gr. 8. 789. 1 thlr. 20 gr.

Becksteins, J. M., gemeinnützige Naturgeschichte Teutschlands nach allen drey Reichen. Ein Handbuch zur deutlichen und vollständigen Selbsterlehrung, besonders für Forstkünstler, Junggelehrer und Oekonomen, 11 Band, enthält die vierfüßigen Thiere. Mit schwarzen Kupfern, gr. 8. 789. 3 thlr.

— — mit illum. Kupf. 4 thlr.

Derselben 2ter, 3ter und 4ter Band, welche die Vögel enthalten. Mit schwarzen Kupf. gr. 8. 791—95. 9 thlr. 8 gr.

Dieselben mit illuminirten Kupfern, gr. 8. 13 thlr.

— kurzgefaßte gemeinnützige Naturgeschichte des In- und Auslandes für Schulen und den häuslichen Unterricht, 12ter u. 13ter Band, in 4 Abtheil, mit Kupf. gr. 8. 792—97. 7 thlr.

Bericht vom Bergbau, mit Kupf. 4. 772. 2 thlr.

Beiträge zur Forstwissenschaft, aus der praktischen Geometrie von C. W. Hennert. Mit 11 Kupf. gr. 8. 783. 1 thlr. 8 gr.

Bider, Herrn, vom Anbau und Verbesserung des Weinbocks, a. d. Franz. mit Kupf. 8. 754. 4 gr.

Blumhoffs, J. G. L., über die rechte Construction der Wellfüße oder Klämme zu einem gleichförmigen Gebläse besonders bey Hochöfen und Frischheerden, nach Binmann, Elvius etc. Mit Zusätzen u. eignen v. C. H. Schmel, in Kpf. gr. 4. 800. 18 gr.

- Brugmanns, Ant., Beobachtungen über die Verwandtschaften des Magnets. Aus dem Lateinischen übersetzt u. mit Anmerkungen von M. C. G. Eichenbach, nebst 1 Kupf. 8. 781. 8 gr.
- — philosophische Versuche über die magnetische Materie und deren Wirkung in Eisen und Magnet, als der zweyte Theil des vorstehenden Buchs. Aus dem Lateinischen mit Anmerkungen und Zusätzen des Verfassers, herausgegeben von Eben demselben mit 6 Kupfern, 8. 784. 13 gr.
- Busse, F. G., kleine Beyträge zur Mathematik und Physik und deren Lehrmethode, 1r Theil, gr. 8. 786. 16 gr.
- — Beruhigung über die neuen Wetterleiter, eine Schrift fürs große Publikum, 8. 791. 4 gr.
- Campers, Pet., sämtliche kleinere Schriften, die Arzney-, Wund- arzneykunst und Naturgeschichte betreffend, aus dem Holländischen übersetzt, mit neuen Zusätzen des Verfassers bereichert und mit Anmerkungen herausgegeben von S. F. M. Hebell, 1r bis 3r Band, in 5 Stücken, mit Kupfern, gr. 8. 782 — 90. Jedes Stück 16 gr. 4 thlr.
- Charpentier, Joh. Friedr. Wilh., mineralogische Geographie der churfürstlichen Lande, mit Kupfern und einer Charte, gr. 4. 778. 4 thlr. 22 gr.
- Die Charte besonders 16 gr.
- du Coudray, Tronson, Beschreibung der Eisen-Manipulation auf der Insel Corfica, a. d. Franz. mit Anmerk. von C. L. A. Wille, mit 3 Kupfern, gr. 8. 786. 10 gr.
- Cramers, J. A., Anfangsgründe der Metallurgie, mit vielen Kupf. 1ter, 2ter u. 3ten Theils 1r Bd. fol. 775. u. 777. 6 thlr. 16 gr.
- Crusius, Dr. S. G., der Mensch, ein Volks- u. Schulbuch, 1r Theil. Wie der Mensch beschaffen ist, mit 4 Kupf. gr. 8. 793. 16 gr.
- — von der Tollheit, Wasserischen oder Hundswuth. Ein Buch für Jedermann, 8. 795. 6 gr.
- Danz, D. I. G., Semiotik oder Handbuch der allgem. Zeichenlehre zum Gebrauch für angehende Wundärzte, gr. 8. 791. 1 thlr.
- Demachy's, Herrn, und D. Duiffon's Liqvensfabrikant a. d. Franz. mit einigen Anmerkungen des Herrn Doctor Struve übersetzt, und mit Zusätzen bereichert von D. Sam. Hahnemann, 2 Bde, mit Kupf. gr. 8. 785. 2 thlr. 12 gr.
- — Kunst des Essigfabrikanten mit einigen Anmerkungen Herrn D. Struve's herausgegeben, mit Bemerkungen und einem Anhang von D. Sam. Hahnemann, mit 1 Kupf. gr. 8. 787. 12 gr.
- DeBillier-Kunst, worinnen die rarsten, bereitesten künstlichen Stücke, nebst einem Anhang einiger chymischen approbirten Künstliche, 8. 753. 5 gr.
- Herber Feld- und Gartenprodukte mit Rücksicht auf das Klima in Deutschland, 2 Theile, 8. 791. u. 95. 1 thlr. 2 gr.
- Four.

- Fourcroy, A. F., philosophische Chemie oder Grundwahrheiten der neuern Chemie, auf eine neue Art geordnet, nach der 1ten Auflage aus dem Franz. übersetzt von Dr. I. S. T. Gehler, 8. 796. 12 gr.
- Gläser's, Fr. Gottl., Versuch einer mineralogischen Beschreibung der gefürsteten Grafschaft Henneberg Churfürstlichen Antheils, mit 1 petrograph. Charte, gr. 4. 775. 1 thlr. 4 gr.
- Die illuminierte Charte besonders, 4. 16 gr.
- — Beyträge zur Naturgeschichte und Bergpolizewissenschaft, in 4 Abhandlungen, mit Kupf. gr. 8. 780. 10 gr.
- Gmelins, Joh. Friedr., Abhandlung über die Wurmtrocknis, mit illuminierten Kupf. 2 Theile, gr. 8. 787. 2 thlr.
- Görzens, Joh. A. E., neue Entdeckung, daß die Finnen im Schweinefleisch keine Drüsenkrankheit, sondern wahre Blasenwürmer sind, mit Kupf. 8. 784. 5 gr.
- — Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper, mit 44 Kupfern, gr. 4. 787. 6 thlr.
- — erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Mit Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben von Dr. J. G. H. Zeder, mit 6 Kupf. gr. 4. 4 thlr. 8 gr.
- Graf, J. F., Grundsätze der Blitzableitungskunst, geprüft und durch einen merkwürdigen Fall erläutert, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Joh. Friedr. Wilh. Widenmann, mit 1 Kupfer, gr. 8. 796. 18 gr.
- Grundlinien oder Revision der ganzen praktischen Arzneykunde zum Handbuch praktischer Aerzte und Wundärzte bestimmt, 2 Theile, 8. 787. 1 thlr.
- Haens, Ant. de, Vorlesungen über die Krankheitslehre nach dem Boerhave, gesammelt, durchgesehen, mit Zusätzen vermehrt und herausgegeben v. F. v. Waiferberg, A. d. Lateinischen, 1r Band, gr. 8. 786. 2 thlr. 12 gr.
- Hahnemanns, Dr. Sam., Anleitung alte Schäden und faule Geschwüre gründlich zu heilen, nebst einem Anhang über eine zweckmäßigere Behandlung der Fieber, der Knochenfaule, des Windtoros, des Krebses, des Ghedichschwams und der Lungensucht, 8. 784. 8 gr.
- — über die Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung, 8. 786. 14 gr.
- — Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten, nebst einem neuen Quecküberpräparate, gr. 8. 789. 18 gr.
- — Freund der Gesundheit, 1r Band, 2s Hest, 8. 795. 6 gr.
- — Apotheketexticon, 1ter u. 2ter Band, in 4 Abtheilungen, gr. 8. 793 — 99. 4 thlr.

- Hedwig's, Dr. Joh., Sammlungen seiner zerstreuten Abhandlungen und Beobachtungen über botanisch-ökonomische Gegenstände, 1stes u. 2tes Bändchen, mit illuminierten Kupf. gr. 8. 791. u. 97. 2 thlr. 8 gr.
- Heyne, des jüngern, Beantwortung der Frage, welches sind die besten Mittel, den kranken Verstand eines Kindes gesund zu machen? eine gekrönte Preischrift mit einer Zugabe des Herrn Rath Beckers, 8. 785. 10 gr.
- Hippokrates, Celsus und Pauls von Aegina, Abhandlungen über die Fisten und Vorfälle des Afters, übersetzt und mit Anmerkungen und Beobachtungen erläutert von P. Camper, aus dem Holländischen vermehrte Ausgabe, 8. 781. 6 gr.
- Hoffmanns, J. C., praktische Anweisung auf eine leichte und wohlfeile Art gute Elektrifirmaschinen zu bauen, mit einem dazu neu erfundenen Reibzeug von gespanntem Taffet, mit 2 Kupf. 8. 798. 8 gr.
- Journal für das Forst- und Jagdwesen, 1r bis 5n Bandes 2tes Heft, mit Kupf. gr. 8. 790-99. 5 thlr. 16 gr.
- Kinderarzt, der Englische, nach den Grundsätzen der Herren Moss und Underwood für Eltern sowohl als auch für Ärzte, gr. 8. 786. 16 gr.
- Kölpins, Alex., medizinisch-chirurgische Betrachtungen über die Kopfwunden, nebst einigen Wahrnehmungen, aus dem Latein. übersetzt und mit einer neuen Vorrede vermehrt, 8. 779. 6 gr.
- Krankheitsgeschichte Joh. Gottfr. Reinhardts, mit einer Vorrede von Dr. Chr. Fr. Ludwig, Deutsch u. Lateinisch, mit illum. Kupf. Fol. 793. 1 thlr.
- Kronstedt, Axel von, Versuch einer Mineralogie, aufs neue aus dem Schwed. übersetzt und nachst. verschiedenen Anmerkungen vorzüglich mit künftigen Beschreibungen der Fossilien vermehrt von A. G. Werner, 10 Bände 1r Theil, gr. 8. 780. 16 gr.
- Laurup, C. P., über den Anbau der Birke und deren Vorzüge vor andern Holzarten, besonders in holzarmen Gegenden. Ein Beytrag zur Forstwirtschaft, gr. 8. 796. 4 gr.
- — über Forstwirtschaft, besonders über Erhaltung, Abtrieb und Wiederaufbau der Wälder, mit einer Forstcharre, gr. 8. 796. 1 thlr. 12 gr.
- Leitfaden zum naturhistorischen Unterricht nach Bechsteins gemeinnütziger Naturgeschichte des In- und Auslandes für Gymnasien und Schulen, (v. J. C. G. Richter) 8. 795. 6 gr.
- Lempe's, Joh. Friedr., gründl. Anleitung zur Markscheidekunst, mit 29 Kupferstein, gr. 8. 782. 2 thlr.
- — Fortsetzung der gründl. Anleitung zur Markscheidekunst, mit Kupf. gr. 8. 792. 6 gr.

Lempe's,

- Lempe's, J. Fr., Lehrbegriff der Milchzinnlehre, mit Rücksicht auf den Bergbau, 1ster Band, oder der technischen Metallzinnlehre, 1ste u. 2te Abtheilung, mit vielen Kupf. gr. 4. 797. 7 thlr.
- Lentins, Dr. Lebr. Friedr. Benj., Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft, 1r u. 2r Band, gr. 8. 797-98. 2 thlr. 8 gr.
- — Dr. A. G. L., Briefe über die Insel Angles, besonders in Hinsicht auf das dasige Kupferbergwerk etc. mit 3 Kupfern, 8. 1 thlr. 4 gr.
- Lenz, Dr. J. G., Versuch einer vollständigen Einleitung zur Kenntniß und Gebrauch der Mineralien, 2 Theile, gr. 8. 795. 3 thlr.
- Leonhard's, Joh. Gottfr., Kurzer Umriss der neuern Entdeckungen über die Luftarten, 8. 787. 4 gr.
- Leskens, Nathan, Gottfr., Anfangsgründe der Naturgeschichte, 1ster Theil. Allgemeine Natur- und Thiergeschichte, mit 12 Kupfern. 2te Auflage, gr. 8. 784. 2 thlr.
- — mit illum. Kupf. 4 thlr.
- Löschers, Carl Johann, bergmännische Briefe über verschiedene Gegenstände des Freybergischen Bergbaues, mit 5 Kupfern, 8. 785. 10 gr.
- — Angabe einer Schwammmaschine, wodurch in einem geringen Zeitraume aus einer beträchtl. Tiefe eine ansehnliche Menge Wasser empor gebracht werden kann. Mit 4 Kupfersteinen, gr. 8. 788. 8 gr.
- — Uebergangsordnung bey der Kristallisation der Fossilien, wie sie aus einander entspringen und in einander übergehen, mit 6 Kupf. 4. 794. 16 gr.
- — Befindung eines atmosphärischen Kunstzeuges, womit ohne alles Schöpfen- und Pumpenwerk, oder wie es bisher nur nach den bekannten hydraulischen Maschinen den Namen haben mag, auf etliche hundert Ellen hoch Röhrenwasser gebracht werden kann, mit Kupf. 4. 797. 16 gr.
- Lorry's, A. Carl, Abhandlung von den Krankheiten der Haut, a. d. Latein, von Ch. F. Jield, 2 Bände, gr. 8. 779. 3 thlr.
- Mahony, Lord, Grundsätze der Elektrizität, nach dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von J. F. Seegen, mit Kupf. gr. 8. 789. 20 gr.
- Marat, des Herrn, physische Untersuchungen über das Feuer, a. d. Franz. mit Anmerk. von Chr. Ehr. Weigel, mit Kupfern, gr. 8. 782. 18 gr.
- — Entdeckungen über das Licht, durch eine Reihe neuer Versuche bestätigt, welche sehr vielmal vor den Augen der Herren Commissäre der Akademie der Wissenschaften angestellt sind, a. d. Franz. mit Anmerk. von C. E. Weigel, gr. 8. 783. 8 gr.
- — physische Untersuchungen über die Elektrizität, aus dem Franz. übersetzt mit Anmerk. v. C. E. Weigel, mit 5 Kupfern, gr. 8. 784. 1 thlr. 16 gr.

Maribala,

- Mitchell's, Humphrey, Beschreibung der in den vereinigten Staaten von Nordamerika wild wachsenden Bäume und Sträucher, aus dem Englischen mit Anmerk. und Zusätzen v. E. F. Hoffmann, 8. 788. 18 gr.
- Martin, E., Philosophia Britannica, oder neuer und falscher Lehrbegriff der Newtonschen Weltweisheit, Astronomie und Geographie in 12 Vorlesungen mit Noten, die physische, mechanische, geometrische und durch Versuche bestätigte Beweise und Erläuterungen der gesammten Naturkunde enthalten. Wie auch eine genaue Nachricht und Erklärung der Erfindung, Bauart, Verbesserung und des Gebrauchs aller nützlichen Werkzeuge und Maschinen, nebst einer neuen Berechnung ihrer Kräfte u. Wirkungen; alles aus den vornehmsten Schriftstellern und öffentlichen Nachrichten, welche bisher herausgekommen sind, sorgfältig zusammengetragen, und in eine genaue Ordnung gebracht, mit 8 Kupfertafeln, nach der letzten Ausgabe a. d. Englischen übersetzt mit einer Vorrede und einigen Erinnerungen von A. G. Kästner, 3 Bände, gr. 8. 778. 5 thlr.
- Metheric, de la, über die reine Luft und verwandte Lufarten und Stoffe, nach der neuesten Ausgabe übersetzt von Dr. S. Hahnemann, 2 Theile, gr. 8. 790. 91. 2 thlr. 20 gr.
- Montrévil's Versuch über die Theorie des magnetischen Sonnenmagnetismus; a. d. Franz. gr. 8. 788. 9 gr.
- de Morveau, Maré und Berthollet's Anfangsgründe der theoretischen und praktischen Chemie, zum Gebrauch der öffentlichen Vorlesungen auf der Akademie zu Dijon, nach den neuern Entdeckungen in eine neue Ordnung gebracht. Aus dem Französischen mit Anmerkungen von C. E. Weigel, 3 Bände, gr. 8. 779. 780. 1 thlr. 22 gr.
- Mund, S. F. G., vom Unkraute, eine Abhandlung, welche von der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften u. schönen Künste zu Berlin im Jahre 1785, das Accessit erhalten, gr. 8. 787. 6 gr.
- Naumburg, D. I. S., Abhandlung von der Beinkrümmung, nebst einer Beschreibung der Ehrenmann'schen Fußmaschine, und einigen angehängten bemerkungswerthen Beobachtungen; unter andern über ein Substrat der Eisengranulirbäder und den Gebrauch des kubischen Salpeters, mit 3 Kupfern, 8. 796. 1 thlr.
- Nollet, Hrn. Abr. Kunst physikalische Versuche anzustellen; oder Anweisung für die Liebhaber der Naturlehre, in Ansehung der Wahl, der Verfertigung und des Gebrauchs ihrer Instrumente, ingleichen der Zubereitung und des Gebrauchs der zu physikalischen Versuchen dienlichen Materialien, mit Kupfern, 3 Bände, 8. 771. 3 thlr.
- Oryktognosie, oder Handbuch für die Liebhaber der Mineralogie, vermittelst welcher die Mineralien aus ihrer äußerlichen Beschaffenheit leicht zu erkennen, von einander zu unterscheiden, und andern kenntlich zu machen sind, 8. 792. 16 gr.
- Pennant's nördliche Polarzoologie, a. d. Engl., 2 Theile, mit den engl. Originalkupfern, gr. 4. 787. 9 thlr.
- Pfaff,

- Pfaff, D. C. H., über thierische Elektrizität und Reizbarkeit. Ein Beytrag zu den neuesten Entdeckungen über diesen Gegenstand, gr. 8. 795. 1 thlr. 4 gr.
- Platner's, Dr. Ernst, neue Anthropologie für Aerzte und Weltweise, 1ster Theil, gr. 8. 790. 1 thlr. 20 gr.
- Quellmalzens, S. T., Anweisung zu einer der Gesundheit dienlichen neu erfundenen Art der Bewegung, Lateinisch und Deutsch, mit Kupfern, 4. 735. 3 gr.
- Raulin, von Erhaltung der Kinder, von dem ersten Augenblick ihres Entstehens an, bis zu ihrer Mannbarkeit, 2 Bände, gr. 8. 769. 770. 1 thlr. 6 gr.
- Retzius, A. I., Versuch einer Aufstellung des Mineralreichs, ein Handbuch zum Gebrauche bey Vorlesungen, a. d. Schwed. übersetzt, gr. 8. 793. 1 thlr. 4 gr.
- Saint Yves, Carl de, Traktat von den Krankheiten der Augen, in welchem die dazu dienlichen Hülfsmittel, wie auch die chirurgischen Operationen, so zu derselben Genesung erforderlich sind, gründlich gezeigt werden; a. d. Franz. von I. A. Mischel, 8. 730. 6 gr.
- Scheele, C. Wihl., chemische Abhandlung von Luft und Feuer, nebst einem Verbericht von Torbern Bergman, 2te verbesserte Ausgabe mit einer eignen Abhandlung über die Luftgattungen, wie auch mit der Herren Kirwan und Priestley Bemerkungen und Herrn Scheele's Erfahrungen über die Menge der im Dunkelfeuer befindlichen reinsten Luft, vermehrt und mit einem Register auch 2 Kupfern versehen, von I. G. Leonhardt, 8. 782. 12 gr.
- Schmalings, L. Chr., Nachrichten aus dem Blumenreiche, 1—68 Stück, gr. 8. 784—89. 1 thlr. 12 gr.
- Schmidlein's, Gottfr. Bened., Insektologische Terminologie, oder Grundbegriffe der Insektenlehre, durch Beispiele und Beobachtungen nach dem System des Ritters von Linné erläutert, mit Kupf. gr. 8. 789. 20 gr.
- Schreber's, I. C. D., Beschreibung der Gräser, nebst ihren Abbildungen nach der Natur, 1ster Theil in 5 Abtheilungen, und 2ten Theils 1te, 2te und 3te Abtheilung, in Folio mit illuminirten Kupfern, 769 bis 779. 11 thlr. 8 gr.
- Ebendieselbe in Folio, mit schwarzen Kupf. 7 thlr. 2 gr.
- Schulze, Blizard und Wehen, der Herren, Abhandlungen von der Heilung der Thränenfistel und den neuesten dazu vorgeschlagenen Operationsmethoden, mit Kupfern, 8. 784. 6 gr.
- Senac, des Herrn von, praktische Abhandlung von den Krankheiten des Herzens, a. d. Franz. gr. 8. 781. 1 thlr. 12 gr.
- Seneca's, L. Ann., physikalische Untersuchungen, a. d. Latein. übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Fr. E. Ruhkopf, 1ster Theil, gr. 8. 794. 1 thlr.

- Skette, Thomas, Erfahrungen und Beobachtungen über die röthliche und röthe pruvianische Rinde, nebst einer Anleitung, die Fieber, die Bräune, die Scropheln und andre Krankheiten zu heilen, a. d. Engl. überfetzt, nebst einigen Beylagen des Deutschen Herausgebers, 8. 787. 16 gr.
- Sömmering, Th., von Hirn- und Rückenmark, 8. 788. 8 gr.
- — über die Schädlichkeit der Schnürbrüste, nebst noch einer Abhandlung darüber von einem Ungenannten, und einer Vorrede von Salzmann, 8. 788. 8 gr.
- Sommers, I. C., Geschichte einer Zwillinge-Kaisergeburt, gr. 8. 788. 4 gr.
- Trommsdorfs, I. E., Journal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker, 1r Band bis 8n Bandes 18 Stück, 8. 793 — 1800. 12 thlr. 8 gr.
- Trotter, Thom., neue Bemerkungen über den Scorbut, a. d. Engl. überfetzt von Chr. Fr. Michaelis, 8. 787. 6 gr.
- Verfuch einer Prüfung des von Herrn Jacob aufgestellten Beweises für die Unsterblichkeit der Seele, 8. 793. 8 gr.
- den sichern Gebrauch der spanischen Fliegen- und Elafenspflaster zu bestimmen, 8. 793. 4 gr.
- über den Ursprung menschlicher Seelen, allen wehren Psychologen und Theologen freundschaftlich gewidmet, 8. 789. 5 gr.
- Wallerius, Joh. Gottsch., Anfangsgründe der Metallurgie, besonders der chymischen, a. d. Latein., mit 1 Kupfer, gr. 8. 770. 20 gr.
- — der physischen Chemie, 1r Theil, ins Deutsche überfetzt mit Anmerkungen von Chr. Andr. Mangold, 2te Auflage mit Anmerkungen von Christ. Ehrenfr. Weigel, 2 Theile mit Kupfern, gr. 8. 776 — 780. 3 thlr. 12 gr.
- Weigel's, Chr. Ehrenfr., Einleitung zur allgemeinen Scheidekunst, 1ter bis 3ten Bds. 2ter Theil, allgemeine Büchereykunde enthaltend, gr. 8. 788 — 794. 9 thlr.
- Werth, der verkannte, des Sächsischen Bergbaues und desselben gute Sache, gr. 8. 781. 5 gr.
- Widenmann's, J. F. W., Handbuch der Mineralogie, mit einer illuminirten Farbenabelle und einem Kupfer, gr. 8. 794. 3 thlr.
- Ziegler, G. I. A., Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft, Chirurgie und gerichtlichen Arzneykunde, nebst einer Untersuchung und Beschreibung des Quedlinburgischen Gesundbrunnens, gr. 8. 787. 16 gr.
- Zopf, C., die Nonne im Walde, (Phlana bombyx Monacha) kein Roman, 8. 798. 8 gr.



