




INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

HOJA 05-06 • ORDENES

**INFORMACION COMPLEMENTARIA
ALBUM MICROFOTOGRAFIAS**

MADRID. 1978




Foto 05-06-TC-DR-1.001.- Filita granatífera. Grandes blastos de biotita pre- S_2 . (NII-x10).



Foto 05-06-TC-DR-1.014.- Filita. Microkinkado de 3a. Fase sobre la S_2 , en un tramo pelítico. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-DR-1.040.- Esquisto granatífero. Micropliegues de 2^a.
Fase producidos en moscovitas. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-DR-1.047.- Tonalita esquistosada. Cristales aciculares de Apatito. (NII-x63).




Foto 05-06-TC-DR-1.047.- Tonalita esquistosada. Textura general de la roca, con un cristal de Granate alotriomorfo. (NII-x10).



Foto 05-06-TC-DR-1.052.- Ortoamfibolita. Aspecto general de los gran
des cristales de Anfíbol. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-DR-1.052.- Ortoanfibolita. Detalle de los cristales de Anfibol. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-DR-1.052.- Ortoanfibolita. Cristales de Ilmenita transformándose en su borde a Leucoxeno. (NII-x63).




Foto 05-06-TC-HU-102.- Filita-esquisto estaurolítico. Textura grano blástica de grano fino recrystalizada, con abundantes cristales independientes de Estauroлита. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-107.- Esquisto anfibólico granatífero. Prismas de -
anfíboles. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-107.- Esquisto anfibólico granatífero. Primas de
Anfibol. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-127. - Filita. Aspecto textural de S_1 y S_2 . (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-203.- Esquisto granatífero. Cristales de Granate - pre-S₂. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-212.- Filita clorítica. Esquistosidad de crenulación.
(NII-x25).



Foto 05-06-TC-HU-222. - Filita granatífera. Kink-band de S_3 sobre S_2 .
(NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-231.- Esquisto granatífero. Textura microplegada.
(NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-231.- Esquisto granatífero. Micropliegues en una intercalación cuarzosa. (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-247.- Filita. Microplegado y aboudinado de las ve-
nas cuarcíferas, por la F_2 . (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-256.- Filita. Microcrenulación de S_2 , produciendo S_3 . (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-256.- Filita. (Detalle de la foto anterior). (NII-x25).



Foto 05-06-TC-HU-257.- Filita-Cuarcita. Micropliegues de 2^a. Fase, sobre niveles competentes (filíticos) e incompetentes. Obsérvese como en los niveles filíticos se desarrolla una microcrenulación de plano axial, no penetrativa en los tramos cuarcíticos (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-260.- Filita clorítica. Alternancia de niveles filíticos y cuarcíferos definiendo S_0 , y con microplegado de 2a. Fase. La mica que se observa es clorita. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-260.- Filita clorítica. Clorita primaria en un micropliegue de un nivel cuarçífero de 2a. Fase. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-260.- Filita clorítica. Clorita primaria en los niveles cuarcíferos. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-272.- Cuarzofilita granatífera. Transformación de Granate a clorita. (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-274. - Filita carbonosa. Micro kink-bands de β 3^a. -
Fase?. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-274. - Filita carbonosa. Micropliegue de 2a. Fase.
(NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-274.- Filita carbonosa. Microcrenulación de 2a. Fa
se. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-290.- Esquisto granatífero. Gran cristal de Granate idiomorfo con carácter precinémático. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-298.- Filita granatífera. Microplegado de una vena de Q, según la F_2 . (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-342.- Filita granatífera. Micropliegue de vena de cuarzo plegado por la F_2 . (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-345. - Filita. Microcrenulación de 2a. Fase sobre la S_1 . (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-348. - Filita. Microkinkado de 3^a. Fase sobre la S₂. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-348. - Detalle de la foto anterior. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-350.- Filita-esquisto granatífero. Microcrenulación muy apretada sobre micas (moscovita) de 2a. Fase. (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-363.- Filita. Microkinkado de 3a. Fase. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-372.- Filita-metagrauvaca. Microkinkado de 3a. Fa
se sobre la S_2 . (NIL-x10).




Foto 05-06-TC-HU-445.- Cuarzo-anfibolita. Cristales idiomorfos de Anfiboles poikiliticos (inclusiones de Q.) definiendo esquistosidad nematoblastica. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-445.- Cuarzo-anfibolita. Cristales idiomorfos de Anfíboles poikilíticos (inclusiones de Q.) definiendo esquistosidad neoblastica. (NII-x10).



Foto 05-06-TC-HU-449. - Ortoanfibolita. (NII-x25).



Foto 05-06-TC-HU-450.- Micropliegues de 2^a. Fase en moscovitas, -
con cristales de Granate pre-S₂. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-487.- Esquisto granatífero. Fenoblasto de Granate alterado a Clorita en su borde, con carácter pre- S_2 . (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-527.- Cuarzoesquisto plagioclásico. Aspecto general de la textura y de los cristales alterados de plagioclasa. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-533.- Granodiorita muy deformada granatífera. -
Cristal idiomorfo de Allanita, fuertemente transformada. (NII-x10).




Foto 05-06-TC-HU-98.- Esquisto estaurolítico. Cristales de Estauroli
ta subidiomorfos. (NII-x25).




Foto 05-06-TC-HU-98.- Esquisto estaurolítico. Cristales de Estauroli-
ta alotriomorfos. (NII-x25).