



04-07/GP/PM-277.

Diques graníticos de grano fino en la granodiorita preeoz con megacristales (${}^b\gamma\eta^2$).



04-07/GP/PM-278.

Enclave de granodiorita precoz con megacristales (${}^b\gamma\eta^2$) dentro de un dique granítico que atraviesa a ésta.



04-07/GP/PM-282.

Aspecto de la granodiorita precoz con megacristales (γ^2).



04-07/GP/PM- 283.

Detalle de la anterior.



04-07/GP/PM-284.

Diferenciación (autolito) de grano más fino pero aparentemente de la misma composición dentro de la granodiorita precoz con megacristales (${}^b\gamma\eta^2$)



04-07/GP/PM-286.

Cuarzo con bordes de anfíbol, en uno de
los precursores básicos (γ_1^2 - η^2) de la
granodiorita



04-07/GP/PM-287.

Cuarzo con bordes de anfíbol, en uno de los precursores básicos ($\gamma\eta^2$ - η^2) de la granodiorita



04-07/GP/PM-291.

Apófisis graníticas en los esquistos migmatizados (PC-Se).



04-07/GP/PM-293.

Granito de dos micas de grano medio a grueso, con megacristales. ($_{3-4}\gamma_{mb}^2$)



04-07/GP/PM-294.

"Folded structure", en los metasedimentos
migmatizados (PC-Se).



04-07/GP/PM-295.

Granito de dos micas grano medio a grueso
con megacristales ($2-3\gamma^2_{mb}$)



04-07/GP/PM-296.

Orientación de flujo en el granito de dos
micas de grano medio a grueso con megacrís-
tales ($_{2-3}\gamma^2_{mb}$)



04-07/GP/PM-298.

Fase pegamtoide. Granitoide migmatítico
($\gamma\psi^2$).



04-07/GP/PM-299.

Restitos biotítico-cloríticos en el granito de dos micas de grano fino a medio ($_{3-4}Y_{mb}^2$).




04-07/GP/PM-300.

Idem anterior.

04-07/GP/PM-301.

Idem anterior.





04-07/GP/PM-304.

Filones pegmatíticos en el granito de dos
micas grano fino a medio ($_{3-4}\gamma^2_{mb}$)



04-07/GP/PM-305.

Filón de pegmatita marcando el movimiento
relativo de la fractura que cicatriza.



04-07/GP/PM-308.

Esquisto (PC-Se) migmatizado. Grandes cris
tales de moscovita.



04-07/GP/PM-309.

Recubrimiento de cantos del Terciario de
Bertamirans (T).



04-07/GP/PM-310.

Filones de granito de grano grueso en los metasedimentos del "D. migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage".



04-07/GP/PM-311.

Idem anterior.



04-07/GP/PM-314.

Ortoneis glandular ($_{NG}^1\gamma_{mb}$) algo migmatiza-
do



04-07/GP/PM-318.

Aspecto de las migmatitas (PC-Se - $\gamma\psi^2$).



04-07/GP/PM-319.

Idem anterior.



04-07/GP/PM-320.

Idem anterior.



04-07/GP/PM-321.

Idem anterior.



04-07/GP/PM-322.

Idem anterior.



04-07/GP/PM-324.

Granito de dos micas de grano medio a grueso con megacrístales ($2-3\gamma_{mb}^2$)

04-07/GP/PM-325.

Filones del NE de la

Cuarzo cristalizado.

hoja (q).





04-07/GP/PM-326.

Cuarzo zonado con cuarzo ahumado. Filones
del NE de la hoja (q).



04-07/GP/PM-327.

Vista del ortoneis biotítico ($N\gamma_b^1$). SE de
la hoja




04-07/GP/PM-328.

Cristales de feldespato en el ortoneis biotítico (N_b^1).



04-07/GP/PM-331.

Granito de dos micas grano fino a medio
con megacristales ($_{3-4}\gamma_{mb}^2$)



04-07/GP/PM-332.

Detalle de la anterior.



04-07/GP/PM-333.

Coluvión (O_2C).



04-07/GP/PM-338.

Textura gráfica de turmalina y cuarzo en
un filón de pegmatita dentro de la grano-
diorita precoz con megacristales (γ^2).



04-07/GP/PM-339.

Gota de cuarzo plegada posiblemente durante la segunda fase. Precursor básico ($\gamma\eta^2$ - η^2) de la granodiorita.



04-07/GP/PM-340.

Bandeado composicional en un precursor bá-
sico ($\gamma\eta^2-\eta^2$) de la granodiorita



04-07/GP/PM-341.

Detalle de la anterior con cuarzos pequeños rodeados de anfíbol.



04-07/GP/PM-342.

Fluorita secundaria en planos de fractura
en el granito de dos micas de grano fino
a medio ($_{3-4}\gamma_{mb}^2$)



04-07/GP/PM-343.

Feldespatos procedentes posiblemente, del
ortoneís glandular ($_{NG} \gamma_{mb}^1$) dentro del gra-
nitoide migmatítico ($\gamma \psi^2$).



04-07/GP/PM- 344.

Idem anterior.