

Nº HOJA: 15-07

NOMBRE: RIAÑO

PROVINCIA: LEON

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: ENADIMSA

NOMBRE LOCAL EL AGUASALIO

1

COORDENADAS:

Fecha: NOVIEMBRE 1978

[illegible]

Nº HOJA: 15-07

NOMBRE: RIAÑO

PROVINCIA: LEON

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA


AUTOR: ENADIMSA

NOMBRE LOCAL ALEJE

2

COORDENADAS: x = x =
y = y =
z = z =

Fecha: NOVIEMBRE 1978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA:		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 60 80 100	AMBIENTE	PISO O EDAD
250			2087		Calizas grises masivas, en estratos de 50-100 cm con abundantes bioclastos de crinoides y menos abundantes Briozoos, Braquiopodos y Ostreacodos	4c	5a						
			2086										
			2088		Calizas grises, capas de 10-15 cm con capas de dolomitas, crinoides y braquiopodos.								
			2089		Chert en pedruzcos y bloques. Dolomias grises claras con restos de corales, Estromatoporidos, crinoides, Braquiopodos y Ostreacodos. Pellets.	5a							
					Calizas grises alternando con margas grises en capas de 10-50 cm. Crinoides, corales etc.								
150			2090		Calizas grises en estratos de 50-100 cm, con Estromatoporidos, corales, Briozoos, Crinoides y Braquiopodos. Pellets	4c	5a	5a2					
					Calizas grises amarillentas en estratos de 50-100 cm alternando con margas grises. Restos de Estromatoporidos, corales, Crinoides, Briozoos y Ostreacodos	4c	5a	5a2					
			2091		Dolomias grises amarillentas, Crinoides, Briozoos, Braquiopodos. Estilolitos								
			2092		Alternancia de calizas grises y margas en estratos de 50 a 10 cm. Braquiopodos, Crinoides, y Estromatoporidos, Briozoos y Ostreacodos, laminacion paralela. Bioturbacion.	4c	5a						
			2093		Dolomias en estratos de 50-100 cm. Briozoos, Braquiopodos y Crinoides. Estromatoporidos y Corales menos abundantes.	4c		5a					
					Calizas y margas alternando Crinoides etc.								
50			2094		Calizas gris claro, masivas en la base que hacia el todo pasan a estratos de 50 a 100 cm. Briozoos abundantes, Ostreacodos, Braquiopodos y Crinoides menos abundantes	4c	5a	5a2					
					Dolomias gris clara, amarillenta en estratos de 10-50 cm. Braquiopodos y Briozoos abundantes, Crinoides y Ostreacodos. Laminacion paralela, bioturbacion.			5a					
0			2095										

EMSIENSE SUP. — EIFELIENSE INF.

EMSIENSE SUP. — EIFELIENSE INF.

Nº HOJA: 15-07 NOMBRE: RIAÑO

PROVINCIA: LEON

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: ENADIMSA

NOMBRE LOCAL: CORNIERO

3

COORDENADAS: x = y = z =

Fecha: NOVIEMBRE 1978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESSION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:1000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300	PISO O EDAD SERIE
300			1586		Calizas grises bioclásticas en estratos de 50-100 cm. en abundancia crinoides y Braquiopodos. Estilolitos.	6d					
250			1587		Calizas grisáceas bien estratificadas en fragmentos de crinoides, braquiopodos, corales y corales solitarios. Parches dolomíticos aislados, de poca extensión. Dolomías grisáceas, a veces gris amarillentas en estratos que oscilan entre 50 y 100 cm de potencia. Restos de Briozoos y crinoides fragmentados.	4c 5a					
200			1588		Calizas dolomíticas en la base que al techo pasan a calizas grisáceas en bancos de 50-100 cm. Fauna arrecifal de Estromatopóridos corales y corales solitarios interconectados y en posición de crecimiento (facies arrecife). Troncos abundantes crinoides, briozoos y Balanoides.	6d					
150			1589		Caliza grisácea masiva, ligeramente estratificada al techo. Poco estromatopóridos. Laminación paralela.	6d					
100			1590		Calizas grisáceas en bancos de 50-100. Parches de dolomitización poco extensos. Ostreoides y Lamelibranchios. Laminación. Bioturbación. Estructuras geopetales al techo.	4c 5a					
50			1591		Calizas grises bien estratificadas, en alguna intercalación mas masosa, grisácea. Crinoides, Aulopóridos, Ostreoides, Braquiopodos, Gasterópodos poco abundantes. Laminación paralela. Dismicrita.	4c 5a 5aR					
0			1592		Calizas grises alternando en masas. Calizas grises en estratos de 50-100 cm. Dismicrita poco abundante.	4c 5a					
			1593		Alternancia de calizas gris amarillentas en masas. Estromatopóridos, corales, briozoos, Braquiopodos Dismicrita.						
			1594		Caliza gris clara en capas de 50-100 cm. con restos de Briozoos, Estromatopóridos, corales y Ostreoides. Abundancia de Calizas grises y masas grises oscuras.						
			1595		Calizas grises en bancos de 50-100 cm. en alguna hilada de masas. Ostreoides, Aulopóridos, etc.						

EMSIENSE SUP. — EIFELIENSE INF.