



23-14/AD-DN/01F

Vista panorámica de los alrededores de Soria, desde el Cerro de Santa Ana. En primer término las calizas cretácicas, a la izquierda, y los conglomerados calcáreos de la Formación San Saturio, en el centro. En segundo plano, la estructura cretácica del Alto del Santo al Oeste, en el centro la ciudad de Soria asentada sobre el Terciario neógeno de la Formación Los Quemados y sobre la facies Weald; a la derecha, el encajamiento del Duero sobre la superficie peneplanizada mesozóica. Al fondo, los relieves cretácicos superiores de Picofrentes y wealdenses de las estribaciones de los Picos de Urbión.



23-14/AD-DN/02F

Vista panorámica de un área situada al E de Soria. A la izquierda se observa el encajamiento del río Duero sobre la superficie peneplanizada jurásico-cretácica de Los Pajarejos. A la derecha, en la zona de la antena, las facies Weald quedan cubiertas por los depósitos subhorizontales neógenos.



23-14/AD-DN/03F

Vista panorámica del gran anticlinal cretácico del Cerro de Santa Ana, desde el cerro del Castillo. En primer término el cabalgamiento de las calizas cretácicas, sobre los conglomerados de la Formación San Saturio.




23-14/AD-DN/04F

Aspecto de la Formación Los Quemados al ser atravesada por la "Falla de Soria". Puede observarse el gran número de fallas (F) que afecta a la formación. Constituye en realidad una banda de cizalla. Nueva circunvalación de Soria, al N del Km 148, de la carretera N-122



23-14/AD-DN/05F

Otro aspecto de la banda de cizalla (Falla de Soria)



23-14/AD-DN/06F

Arcillas rojas y yesos de la Facies Keuper (Tk), en posición cabalgante sobre las formaciones "Carniolas de Cortes de Tajuña" y "Calizas de Cuevas Labradas".




23-14/AD-DN/07F

Aspecto de las "Carniolas de Cortes de Tajuña" y de las "Calizas y dolomías de Cuevas Labradas" en la base del cabalgamiento de Valdecurueña-La Pica.




23-14/AD-DN/08F

Calizas tableadas de la Formación "Cuevas Labradas"



23-14/AD-DN/09F

Calizas bioclásticas de Barahona



23-14/AD-DN/10F

Calizas y areniscas cíclicas de Aldealpozo



23-14/AD-DN/11F

Areniscas y arcillas rojas de la parte inferior de la Facies Weald. Grupo Tera.



23-14/AD-DN/12F

Calizas lacustres de la Facies Weald, Grupo Oncala, Carretera Soria-Logroño, vértice Belosillo.



23-14/AD-DN/13F

Calizas oncolíticas de la Facies Weald, también pertenecientes al tramo medio cartografiado. Grupo Oncala.



23-14/AD-DN/14F

Conglomerados cuarcíticos y areniscas de la parte superior de la Facies Weald.



23-14/AD-DN/15F

Arenas blancas de la Formación Utrillas, en la serie de Valdelharina.



23-14/AD-DN/16F

Aspecto de las calizas bioclásticas de Sta María de las Hoyas.



23-14/AD-DN/17F

Calizas nodulosas y margocalizas de la Formación Monterde, bajo la antena de TV en el Cerro de Santa Ana.



23-14/AD-DN/18F

Calizas bioclásticas y masivas de la Formación Jaraba, en contacto mediante una falla inversa con los conglomerados calcáreos neógenos de la Formación San Saturio.



23-14/AD-DN/19F

Calizas de la Formación Burgo de Osma



23-14/AD-DN/20F

Dolomías y calizas dolomíticas de la Formación Sto Domingo de Silos, al S de Los Rábanos.



23-14/AD-DN/21F

Conglomerados, areniscas y arcillas, pertenecientes al Sistema del N de Alconaba



23-14/AD-DN/22F

Calizas lacustres del Sistema del N de Alconaba




23-14/AD-DN/23F

Arenas y areniscas del Sistema Los Rábanos-Ribarroya



23-14/AD-DN/24F

Facies de conglomerados del Sistema Los Rábanos-Ribarroya



23-14/AD-DN/25F

Conglomerados calcáreos subverticales de la Formación San Saturio, que constituyen el cerro del Castillo sobre el que se asienta el Parador Nacional "Antonio Machado". Coronando el cerro, directamente debajo del Parador, aparece la Formación Numancia.



23-14/AD-DN/26F

Conglomerados y arenas de la Formación Tartajo, en el Neógeno del Norte de la Hoja



23-14/AD-DN/27F

Arenas y limos rojizo-amarillentos con bloques de areniscas y cuarcitas. Formación Los Quemados.



23-14/AD-DN/28F

Aspecto de la Formación Los Quemados en la misma ciudad de Soria



23-14/AD-DN/29F

Formación Numancia (bloques de cuarcitas y areniscas en una matriz limo-arenosa), coronando el cerro donde se asienta Numancia.



23-14/AD-DN/30F

Superficie peneplanizada del Sistema Los Rábanos-Ribarroya. Al fondo destacan los relieves constituidos por los conglomerados calcáreos de la Formación Sierrecita.



23-14/AD-DN/31F

Areniscas carbonatadas y calizas lacustres de la Formación Almenar, bajo el castillo de dicha localidad.



23-14/AD-DN/32F

Detalle de la anterior, de la Formación Almenar



23-14/AD-DN/33F

Terrazas del río Duero



23-14/AD-DN/34F

Aspecto de la superficie peneplanizada jurásico-cretácica del área de Peña Parda-Los Catellanos (Km 5 de la carretera de Soria a Almajano) sobre la que destaca el "inselberg" del Tiñoso.