

COMPOSICION MINERALOGICA TOTAL						COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS				
MUESTRA	Guarzo	Filosil.	Calcita	Dolomita	Yeso	Caolinita	Illita	Esmeotit.	Clorita	Observaciones
25-17 GS - P.O. 01.05.01	40%	60%	-	-	-	55%	45%	-	-	Caolinita parcialmente ordenada Illita dioctaédrica de baja cristalinidad
25-17 GS - A.H. 02.01.01.	Indic.	60%	-	30%	10%					Los filosilicatos presentan una cristalinidad extremadamente baja, lo que impide su cuantifi- cación. Están representados por Illita muy abier- ta junto con indicios de esmeotitas
25-17 GS - P.O. 05.02.01	55%	40%	5%	-	-	20%	80%	-	-	Illita dioctaédrica con cristalinidad media. Caolinita con alta cristalinidad
26-17 GS - A.O. 01.01.02.	10%	65%	-	25%	-	10%	90%	Indic.	-	Illita dioctaédrica con buena cristalinidad. Caolinita desordenada.
26-17 GS - A.O. 01.12.01	10%	90%	-	-	-	10%	65%	25%	-	Illita dioctaédrica de baja cristalinidad. Caolinita relativamente bien ordenada. Esmeotita calcica
26-17 GS - A.O. 04.02.L2	15%	85%	-	-	-	10%	90%	Indic.	-	Illita dioctaédrica con buena cristalinidad Caolinita parcialmente desordenada. Indicios de Esmeotitas y de interestratificados del tipo Illita-kaolinita.
26-17 GS - A.O. 04.04.L3	10%	90%	-	-	-	5%	40%	55%	-	Illita dioctaédrica con buena cristalinidad. Esmeotita calcica. Caolinita desordenada.
26-17 GS - A.O. 04.04.L4	10%	70%	20%	-	-	-	60%	40% (X)	-	Illita dioctaédrica con cristalinidad media. Se incluye en este porcentaje pequeños contenidos de interestratificados del tipo 10-14 h.
26-17 GS - A.O. 05.02.L6	20%	60%	-	-	-	5%	75%	20%	Indicios	Illita con muy buena cristalinidad. Esmeotita calcica. Caolinita parcialmente desordenada.

[illegible]