



































































COLECCION DE FOTOGRAFIAS

HOJA 25-24 (CAÑETE)

Foto RM-9701:

Barras y canales. Formación calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas. Serie de la Carretera de La Huérguina.

Foto RM-9702:

Niveles slumpizados dentro de secuencias "shallowing-upward" en la Formación Cuevas Labradas. Serie de la Carretera de La Huérguina.

Foto RM-9703:

Base canalizada de un estrato. Formación Cuevas Labradas. Serie de la Carretera de la Huérguina.

Foto RM-9704:

Laminación estromatolítica en la Formación Cuevas Labradas. Serie de la Carretera de La Huérguina.

Foto RM-9705:

Sets de estratificación cruzada de tipo trough. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9706:

Laminación de ripples de corriente. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9707:

Canal de arenisca con estratificación cruzada de tipo surco. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9708:

Crescent casts en la base de un estrato. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la carretera de Cañete.



Foto RM-9709:

Detalle de un crescent casts deformado por carga. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9710:

Megaestratificaciones cruzadas en surco. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9711:

Sets con estratificación cruzada de tipo surco. Tramo superior del Buntsandstein. Serie de la Carretera de Cañete.

Foto RM-9712:

Panorámica del Cretácico Superior. Formas de erosión en las Dolomías de la Ciudad Encantada. Paraje del Alto Fraile (Borde N de la Hoja de Cañete).

Foto RM-9713:

Secuencias con ripples de corriente, estratificación flaser laminación paralela y bioturbación de Talasinoides y Planolites en la Formación Aras de Alpuente. Serie de La Huérguina III.

Foto RM-9714:

Estratificación cruzada a megaescala en una barra. Formación Aras de Alpuente. Serie de La Huérguina III.

Foto RM-9715:

Estratificación flaser y cruzada planar a megaescala. Formación Aras de Alpuente. Serie de La Huérguina II.

Foto RM-9716:

Secuencias estratocrecientes. Formación Villar de Vés. Serie de La Huérguina II.

Foto RM-9718:

Calizas con estratificación flaser y laminación de algas dentro de una llanura de mareas. Formación Villar de Ves. Serie de La Huérguina II.

Foto RM-9719:

Laminación estromatolítica con las láminas rotas. A techo, posible tepee. Formación Villar de Vés. Serie del Barranco de Los Cubos del Hoyo.

Foto RM-9720:

Nivel de rudistas. Brechas de Cuenca. Serie del Barranco de Los Cubos del Hoyo.

Foto RM-9721:

Barras y canales en calizas con characeas. Formación Calizas de La Huérguina. Serie de La Huérguina I.

Foto RM-9722:

Nivel edáfico y charca. En la base, brecha. A techo, canal. Fm. calizas de La Huérguina. Serie de La Huérguina I.

Foto RM-9723:

Brechas de colapso por disolución de evaporitas. Techo del Tramo Superior del Muschelkalk. Serie de Valdemorillo-Sierra.

Foto RM-9724:

Laminación estromatolítica y tepee. Parte alta del Muschelkalk superior. Serie de Valdemorillo-Sierra.

Foto RM-9725:

Ripples de oscilación. Muschelkalk superior. Serie de Valdemorillo-Sierra.

Foto RM-9726:

Dolomitización irregular afectando a calizas oolíticas. Formación Carbonatada de Chelva. Serie del Río Guadazaón.

Foto RM-9727:

Estratificaciones cruzadas planares en calizas bioclásticas. Formación carbonatada de Chelva. Serie del Río Guadazaón.

Foto RM-9728:

Rill bioclástico en la base de un canal. Formación carbonatada de Chelva. Serie del Río Guadazaón.