

GRUPO DE TRABAJO: G. S.

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás), J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: RAMBLA HONDA

1

COORDENADAS:

x = 773.330

y = 597.108


z = 1020 m.

x = 772.188

y = 596.912

z = 980 m.

Fecha: Mayo 1973



GRUPO DE TRABAJO: GS


AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: CABRIEL - I

2

COORDENADAS: x = 772.056 x = 771.629
y = 596.974 y = 596.659
z = 1000 m. z = 980 m.

Fecha: Mayo 1973



NOMBRE LOCAL: AYUNTADEROS

3

Fecha: Mayo 1973

DEVONICO SUPERIOR	DEVONICO INFERIOR
-------------------	-------------------

GRUPO DE TRABAJO: GS


AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: CARRETERA DE BONICHES A LA DE CUENCA-TERUEL

4

COORDENADAS: x = 773.767 x = 775.693
y = 600.444 y = 600.529
z = 1020 m. z = 1060 m.

Fecha: Junio 1973



GRUPO DE TRABAJO: G. S.

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero Garcia), A.T. (Mariano Aguilar Tomás), J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: CORTE CABRIEL II (Valle de Boniches)

7

COORDENADAS: $x = 777.154$
 $y = 598.561$
 $z = 1050 \text{ m.}$

$$\begin{aligned}x &= 777.036 \\y &= 601.407 \\z &= 1150 \text{ m.}\end{aligned}$$

Fecha: Junio 1973

[illegible]

GRUPO DE TRABAJO: GS


AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás), J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: VILLAR DEL HUMO - 1

8

COORDENADAS: x = 776.541 x = 779.390
y = 587.193 y = 586.405
z = 1000 m. z = 1185 m.

Fecha: Junio 1973



GRUPO DE TRABAJO: G. S.

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: PAJARONCILLO -II

9

	x = 767.260	x = 766.996
COORDENADAS:	y = 593.959	y = 594.004
	z = 930 m.	z = 935 m.

Fecha: Mayo 1973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA		
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 100 200	AMBIENTE	PISO O EDAD	SERIE
			JP	ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90						
40					13 2 m. de dolomias arcillosas grises de aspecto lajoso localmente con laminación paralela. 12 6 m. de dolomias y calizas dolomíticas grises de aspecto brechoideo correlacionables con 501, 502, 503 del corte Pajaroncillo I. 11 1 m. de calizas dolomíticas rosadas. En la base 5 cm. de arcillas limolíticas gris verdosas. 10 1'50 m. de dolomias gris amarillentas, dolomias lajosos al techo con margas dolomíticas en la base. 9 1 m. calizas ligeramente dolomíticas grises con restos de bivalvos que pasan a bandeas y calcareníticas (563). 8 9 m. de dolomias y calizas dolomíticas grises, masivas con 2 bancos de 0'80 m. bien estratificados en el centro. Conjunto de aspecto brechoideo. 7 4'5 m. de dolomias grises blanquecinas y rosadas (560), generalmente de aspecto arcilloso bien estratificadas en capas de 0'50 a 1 m.. 6 2'5 m. de dolomias arcillosas muy diacadas de tonos gris blanquecinos y aspecto brechoideo y coloraciones rojizas y amarillentas en 559. 5 2 m. de dolomias gris con tintes rojizos masiva en la base y con cristales gruesos. 4 1'5 m. de calizas dolomíticas grises con lentejones muy delgados de calizas grises con pequeños equeroides. 3 2 m. de dolomias grises masivas, brechoideas en la base. 2 1 m. de dolomias y calizas dolomíticas grises, calcareníticas pseudooolíticas. 1 5 m. de dolomias grises, bien estratificadas en capas de 0'70 a 1 m.. Localmente aparecen algunos restos de lamelibranchios ?.					<i>Theumatoporella parvovesiculifera</i> (RAINIERI) <i>Ammobaculites</i> sp.; <i>Ataxophragmiidae</i> (Valvulinidae) <i>Gastropodos</i> , <i>Ostreidae</i> ; restos <i>Crinoides</i> Restos de lamelibranchios y de Gastropodos <i>Ataxophragmiidae</i> (Valvulinidae)		MARINO LITORAL	HETTANGIENSE - SINEMURIENSE	L I A S

10

Fecha: Mayo 1973

Geological Profile and Stratigraphic Column

Geological Profile (Left): Shows a sequence of rock layers with varying thicknesses and colors. The layers are labeled with numbers 1 through 12, corresponding to the stratigraphic column. The profile is oriented vertically, with the top of the column at the bottom of the profile.

Stratigraphic Column (Right): Lists the geological units and their fossil content.

Unit	Thickness (m)	Description	Fossil Content
1	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
2	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
3	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
4	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
5	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
6	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
7	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
8	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
9	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
10	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
11	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
12	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
13	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
14	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
15	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.
16	0.5	Calizas microporosas, grises, con restos de bivalvos y brachiopodos.	Ammonites, bivalves, brachiopods.

NOMBRE LOCAL: BONICHES

11

Fecha: Abril 1973

[illegible]

GRUPO DE TRABAJO: GS

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: VILLAR DEL HUMO - II

12

COORDENADAS: x = 773.132 x = 773.371
y = 585.698 y = 585.372
z = 950 m. z = 900 m.

Fecha: Junio 1973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₂ Ca (CO ₂) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 60 80 100	PISO O EDAD
			JP				0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90		AMBIENTE	SERIE
					12 Delomias masivas, brechoides, agujeros en pasiones (D. de Buelache)						KIMMERIDG. - PORTLAND.
				0753		4 5 6 7 9R			Ammobaculites cf. coprolithiformis (SCHWAB), Lenticulina sp.; Glomospira sp.; Epistomina (Brotzenia) sp.; Frondicularia sp.; Gasterópodos; Lamelibranchios; restos Crinoideos		OXFORDIENSE SUPERIOR
				0752	11 12 m. calizas microcristalinas y bioclásticas localmente algo calcáreas. Color rosado	5 7 9			Ophthalmidium sp.; Lenticulina sp.; Glomospira sp.; Textularia sp.; Ammobaculites cf. coprolithiformis (SCHWAB); Vidalina sp.; Brizoarios; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0751		5 6			Protopenereopsis striata WEYNSCH; Textularia sp.; Lenticulina sp.; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0750	10 m. calizas calcáreas con colitos ferruginosos en fco. Algunas microcristalinas preferentemente hacia el techo. Tapizada en capas de 0.20-0.30 m. Color café amarillento - café con leche.	5 7 8R			Labyrinthina mirabilis WEYNSCH; Lenticulina sp.; Textularia sp.; Frondicularia sp.; Ammobaculites cf. fontinensis TERQ; Gasterópodos; Ataxophragmiidae; fragmentos de Ostreoides		
				0749	14 m. calizas tabeadas microcristalinas grisáceas. Con colitos ferruginosos. Hacia el techo pasan a calizas microcristalinas de color grisáceo-amarillento. Crinoideos y microfósiles en fco.	8			Lenticulina sp.; Dentalina sp.; Textularia sp.; Ataxophragmiidae; Microfilamentos; Ostreoides; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0748	8 m. Tramo cubierto. Probablemente calizas arcillosas con alguna intercalación margosa.	5 8R			Nubecularia cf. reicheli RAT; Lenticulina sp.; Dentalina sp.; Textularia sp.; Spirillina sp.; Pseudoglandulina sp.; Ostreoides; Microfilamentos; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0747	5 m. calizas tabeadas microcristalinas. Color café con leche - grisáceo.	20			Microfilamentos; Ostreoides; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0746	4 m. Tramo parcialmente cubierto. Calizas arcillosas tabeadas café amarillento con alguna delgada intercalación de margas poco visible.	5			Microfilamentos; Nubecularia sp.; Lenticulina sp.; Dentalina sp.; Glomospira sp.; fragmentos de Ostreoides; Gasterópodos; restos Crinoideos		
				0745	7 m. Tramo parcialmente cubierto. Calizas microcristalinas tabeadas en capas de 0.10 a 0.30 m. Color beige. Lenticulinas en fco.	6R 7R 8R			Microfilamentos; Lenticulina sp.; Textularia sp.; Gasterópodos; fragmentos de Ostreoides; restos Crinoideos		
				0744	2 m. Calizas dolomíticas tabeadas; amarillentas	9R 12			Radicalarios?		
				0743	6 m. Calizas microcristalinas tabeadas en capas de 0.20 cm. con pellets. Color café con leche, grisáceo.	5 8 20			Cardinia hybrida, SOW.; Rhynchonella podialis, TATE.; Pecten pradeanus, VERN.; Terebratula identata, SOW.; Rhynchonella tetradra, SOW.; Pecten pradeanus, VERN.; Pecten p. personatus, GOLD.		
				0742	14 m. margas amarillentas con dos niveles de calizas bioclásticas intercaladas.				Ostreoides sp. 36 OERTLI; Arbores y radiales Crinoideos (Pentast.)		
				0741					Ophthalmidium sp.; Glomospira sp.; Dentalina sp.; Lingulina gr. pupa TERQ; Ataxophragmiidae (Valvul.) Trochamminoides Psp.; Vidalina sp.; Ostreoides; restos Crinoideos		
				0740							
				0739	5 m. Calizas microcristalinas grises lujas. Lujas recristalizadas con alguna probable nivel de arcillas verdes limpíficas. Estratificadas en capas de menor de 0.5 m. Al techo costra limonítica roja.	6 7 8 8R 12					

PROVINCIA: CUENCA

GRUPO DE TRABAJO: G S

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: CARBONERAS

13

COORDENADAS:

x = 759.550	x = 759.780
y = 580.248	y = 588.070
z = 1020 m.	z = 1030 m.

Fecha: Junio 1973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRAFIA	
				GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA		RELACION DE CONSTITUYENTES	COMPLEXOMETRIA: CO ₂ Ca CO ₂ Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 60 80 100 120	AMBIENTE	PISO O EDAD
				ESCALA: 1/100		Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90					
			JP										
			0832		8 Arenas de Utrillas							CONTINENTAL - FLUVIAL	ALBIENSE
			0831		7 0,6 m. de arenisca microconglomerática	1 2 9 12						CONTINENTAL SALOBRE (WEALD)	APTIENSE
			0830		6 3 m. de arenas muy arcillosas y arcillas arenosas rojizas y grises							MARINO LITOR.	APTIENSE
			0829		5 1 m. de arenas finas con niveles cementados rojo ladrillo							CONTINENTAL SALOBRE (WEALD)	BARREMIENSE
			0828		4 2 m. de areniscas calcáreas y calcarenitas rojizo amarillentas alternantes con arenas limosas finas. Estratificación en capas de 0,20 a 0,50 m	1 2 4 6 7 9						MARINO LITOR.	BARREMIENSE
			0827		3 2 m. de limos pardo amarillentos y rosados que se hacen más arcillosos hacia el techo	1 2 9						MARINO LITOR.	BARREMIENSE
			0826		2 5 m. de limos arenosos rojos-violetáceos oscuros							MARINO LITOR.	BARREMIENSE
					1 Dolomías rosadas con gruesos cristales de dolomita, que hacia el techo pasan a calizas microcristalinas blancuecinas, con pellets y microfauna (826)	6 7 8						MARINO LITOR.	KIMMERIDG. - PORTLAND.
												MARINO LITOR.	MALM
												MARINO LITOR.	MALM

14

Fecha: Junio 1973

Ostreidae

NOMBRE LOCAL: CAMPILLOS PARAVIENTOS -I

15

Fecha: Abril 1973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₂ Ca (CO ₂) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE	
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90				
140			JR		25 Mas de 3 m. Arenas blanco-amarillentas, friables, grano medio a grueso, con intercalaciones de arcillas limolíticas, violáceas							
				0044	24 0.5 m. Arenas grano medio pardo-grisáceas, micáceas, grandes dactilópodos	1 2 10				Pterocera pelagi BRONG.		
				0043	23 2 m. Margas gris-claro con pequeñas intercalaciones de calizas	1 6R 7 8R 20				Choffatella decipiens (SCHLUMB.) Everticyclammina greigi (HENSONI) Sabaudia minuta (HOFKER) Haplophragmium sp.; Quinqueloculina sp.; Ostrácos.		
				0042	22 3 m. Calcareñas nodulosas, bien estratificadas, bancos de 0.30 m. "Muy crasas" en el techo	1 6 9				Choffatella decipiens (SCHLUMB.) Palorbitolina lenticularis (BLUMENB.) Haplophragmium sp. Osteoides (Exogyra) Clithrocytheridea aff. brevis (CORNUEL) Neocythere mertensi OERTLI Cythereis buchlerae OERTLI Paracypris cf. acerta (CORNUEL) Platocythereis sp. Choffatella decipiens (SCHLUMB.) Neocythere mertensi OERTLI Cythereis buchlerae OERTLI Clithrocytheridea aff. brevis (CORNUEL)		
				0041	21 8 m. Limos arcillosos amarillentos	1 2 6 8 10						
				0040	20 6 m. Calizas arenosas y limolíticas, algo nodulosas, blancas grisesas con intercalaciones de arcillas calcáreas limolíticas, grises con manchas blancas. Bancos de 0.20 m.	1 2 6 8 10						
				0039	19 6 m. Tramo cubierto. Posibles arcillas calcáreas limolíticas							
				0038	20 6 m. Calizas arenosas y limolíticas, algo nodulosas, blancas grisesas con intercalaciones de arcillas calcáreas limolíticas, grises con manchas blancas. Bancos de 0.20 m.	1 2 6 8 10						
				0037	18 0.5 m. Arenas blanco-amarillentas, grano medio a grueso con puntos limolíticos	1 2 9 10 20						
				0036	17 10 m. Arenas arcillosas y arcillas limolíticas, gris claro a amarillento, micáceas, parcialmente cubiertas							
				0035	16 1 m. Calizas arenosas, nodulosas, grisesas con abundantes Exogyra y Graciliorthis, localmente arenosas calcáreas	1 2 4 6 7 10				Choffatella decipiens (SCHLUMB.) Palorbitolina lenticularis (BLUMENB.) Ostreoides; Gasterópodos Tubos de Anélidos; restos Echinodermos		
				0034	15 15 m. Arenas y arenas en bancos irregulares, masivas. Estratificación oblicua en gran escala (aportes del Sur). Localmente niveles microporcelanéticos. Intercalación de 0.15 m. de arcillas bajas grises y de limos	1 2 4 6 7 10						
				0033	14 5 m. Arenas, Arenas limosas y limos, nodulosas, calcáreas en zonas, de tonos grises y amarillentos, tubos de gusanos en parte inferior. Estratificación cruzada a lenticular. Granulometría decreciente hacia arriba pudiendo separarse ritmos	1 2 9 10				Glauconia lujani VERN.		
				0032	13 5 m. Arenas gruesas, poco compactas, con patadas microporcelanéticas. Estratificación cruzada a lenticular							
				0031	12 3 m. Arenas gruesas, pardo-amarillentas, masivas, muy calcáreas en el techo	1 2 10						
				0030	11 8 m. Arenas conglomeráticas y conglomeradas con cemento amarillento limolítico	1 2 10						
				0029	10 5 m. Tramo cubierto. Posibles arenitas y arcillas limolíticas							
				0028	9 5.5 m. Arenas calcáreas, grano medio a fino, gris a pardo, generalmente mas calcáreas hacia el techo del banco. Estratificación lenticular	1 2 11						
				0027	8 5.5 m. Arenas pardo-grisáceas, grano grueso, estratificación cruzada. Masas grisesas, bancos finos y el grano es mas fino. Intercalaciones de arcillas gris-amarillentas, plásticas	1 2 10						
				0026	7 7 m. Arcillas plásticas, calcáreas, grises en base, abigarradas en 0023 y gris-verdosas en 0023. Tramo parcialmente cubierto					Atopochara trivolvis (PECK) Clavatorites sp. Choffatella decipiens (SCHLUMB.)		
				0025	6 3 m. Arenas gruesas, con patadas lenticulares, microporcelanéticas, cemento calcáreo irregularmente distribuido, color pardo-amarillento	1 2 9						
				0024	5 5 m. Arcillas calcáreas grises, amarillentas a violáceas. Limolíticas en parte superior					Atopochara trivolvis Clavatorites sp.		
				0023	4 17 m. Arcillas algo calcáreas, abigarradas (tonos amarillos, rojos, grises y violáceos dominantes), plásticas, con intercalaciones de calizas pisolíticas y nodulosas (cantos de 0.10 a 0.20 m.), lenticulares, de tonos grises	5 6 7 8 9 10 20				Atopochara trivolvis (PECK) Globator trochiliscoides GRAMB. Nodosoclavator nodosus (PECK) Clavatorites sp. Atopochara trivolvis (PECK) Nodosoclavator nodosus (PECK) Clavatorites sp.		
				0022	3 5 m. Calizas microcristalinas, brechoides, con intercalaciones de arcillas limolíticas amarillentas y violáceas con nodulos micríticos de 2 a 6 cm.	6 7 8 9 20					Atopochara trivolvis (PECK) Globator trochiliscoides GRAMB. Clavatorites sp. Cypridea (Urwellaia) paulsgrovensis ANDERS.	
				0021	2 1.5 m. Caliza microcristalina, color crema, con manchas amarillas. Bancos de 0.2 a 0.4 m. Abajo brechas calcáreas dolomíticas con cantos dismétricos	6 7 8 9 20					Ammobaculites sp. Ataxophragmiidae Favreina sp.; Ostrácos	
				0020	1 7 m. Calizas microcristalinas, muy finas, blanco-grisáceas con algunas racemizadas; de 0.1 m. con bancos de 0.3 a 1 m. Intercalación de 0.6 m. de dolomita cristalina	6 7 8 9 20				Ostrácos Gasterópodos		
				0019						Favreina sp. Ostrácos		
				0018								
				0017								
				0016								
				0015								
				0014								
				0013								
				0012								
				0011								
				0010								
				0009								
				0008								
				0007								
				0006								
				0005								
				0004								
				0003								
				0002								
				0001								
					Facies Weald. (Arcillas abigarradas)							

GRUPO DE TRABAJO: GS

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás), J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: CAMPILLOS PARAVIENTOS-II

16

	x = 784.132	x = 784.738
COORDENADAS:	y = 600.001	y = 599.789
	z = 1180 m.	z = 1310 m.

Fecha: Junio 1973

[illegible]

GRUPO DE TRABAJO: G.S.

AUTORES: J.P. (José Manuel Portero García), A.T. (Mariano Aguilar Tomás),
J.R. (José Ramírez del Pozo)

NOMBRE LOCAL: VILLAR DEL HUMO III

17

	$x = 772.616$	$x = 773.852$
COORDENADAS:	$y = 583.885$	$y = 584.854$
	$z = 850 \text{ m.}$	$z = 950 \text{ m.}$

Fecha: Junio 1973

[illegible]