



25-26/TH/0D/301.- Panorámica del Cretácico en las proximidades de Enguídanos. En la foto:  
Tramo 1: Albiense (Arenas de Utrillas); tramo 2: Cenomaniense Inferior  
(Calcarenitas con Ostreidos); tramo 3,4: Cenomaniense Medio-Superior  
(3, arcillas verdes; 4, dolomías y margas); tramo 5: Dolomías masivas  
del Turoniense.



25-26/TH/0D/302.- Keuper con niveles areniscosos en  
el núcleo del anticlinal de Yémeda.



25-26/TH/0D/303.- Dolomías del tramo alto del Dogger.



25-26/TH/0D/304.- Dolomías del tramo alto del Dogger.



25-26/TH/0D/305.- Detalle de las dolomías de grano grueso del Dogger alto, donde se aprecian los romboedros de dolomita.



25-26/TH/0D/306.- Jurásico Superior muy tectonizado;  
Tramo 1: techo del Dogger, tramo 2:  
Oxfordiense.



25-26/TH/0D/307.- Travertinos pliocuaternarios (tramo 2) discordantes sobre el Oxfordiano (tramo 1).



25-26/TH/0D/308.- Aspecto del Oxfordiense en el barranco del río Cabriel.



25-26/TH/0D/309.- Detalle de las arcillas grises con  
intercalaciones calcáreas del Kimme  
ridgiense Inferior.



25-26/TH/0D/310.- Calizas fosilíferas del Barremien-  
se-Aptiense.



25-26/TH/0D/311.- Aspecto de las calcarenitas con  
Ostreídos del Cenomaníense Inferior, al N de Cardenete.



25-26/TH/0D/312.- Detalle de las calcarenitas con  
Ostreidos del Cenomaniense Inferior.



25-26/TH/0D/313.- Cenomaniense del Sur de Paracuellos.  
Tramo 1: arcillas verdes; tramo 2:  
dolomías.



25-26/TH/0D/314.- Aspecto general del Cenomaniense.



25-26/TH/0D/315.- Detalle de las dolomías amarillentas tableadas del Cenomaniense.



25-26/TH/0D/316.- Aspecto general del Terciario  
(Vindoboniense).



25-26/TH/0D/317.- Detalle de los conglomerados polimícticos del Vindoboniense.



25-26/TH/0D/318.- Travertinos del Pliocuaternario,  
de gran potencia, situados al N  
de Enguídanos.

20664

HOJA 25-26 (ENGUIDANOS)

20664

RELACION DE LEYENDAS DE LAS FOTOGRAFIAS DE CAMPO

- 301.- Panorámica del Cretácico en las proximidades de Enguídanos. En la foto: Tramo 1: Albiense (Arenas de Utrillas); tramo 2: Cenomaniense Inferior (calcarenitas con Ostreídos); tramo 3,4: Cenomaniense Medio-Superior (3, arcillas verdes; 4, dolomías y margas); tramo 5: dolomías masivas del Turoniense.
- 302.- Keuper con niveles areniscosos en el núcleo del anticlinal de Yémeda.
- 303.- Dolomías del tramo alto del Dogger.
- 304.- Dolomías del tramo alto del Dogger.
- 305.- Detalle de las dolomías de grano grueso del Dogger alto, donde se aprecian los romboedros de dolomita.
- 306.- Jurásico Superior muy tectonizado; tramo 1: techo del Dogger, tramo 2: Oxfordiense.
- 307.- Travertinos pliocuaternarios (tramo 2) discordantes sobre el Oxfordiense (tramo 1).
- 308.- Aspecto del Oxfordiense en el barranco del río Gabriel.
- 309.- Detalle de las arcillas grises con intercalaciones calcáreas del Kimmeridgiense Inferior.
- 310.- Calizas fosilíferas del Barremiense-Aptiense.
- 311.- Aspecto de las calcarenitas con Ostreídos del Cenomaniense Inferior, al N de Cardenete.
- 312.- Detalle de las calcarenitas con Ostreídos del Cenomaniense Inferior.
- 313.- Cenomaniense del Sur de Paracuellos. Tramo 1: arcillas verdes; tramo 2: dolomías.
- 314.- Aspecto general del Cenomaniense.
- 315.- Detalle de las dolomías amarillentas tableadas del Cenomaniense.
- 316.- Aspecto general del Terciario (Vindoboniense).
- 317.- Detalle de los conglomerados polimícticos del Vindoboniense.
- 318.- Travertinos del Pliocuaternario, de gran potencia, situados al N de Enguidanos.