

FOTO 473.— Contacto de potentes paquetes estratiformes de yeso y areniscas rojas del Keuper. En la cima se observan bloques de conglomerados miocénicos.





FOTO 474.- Detalle del contacto entre areniscas y arcillas= con yeso del Keuper.



FOTO 475.- Conglomerados miocénicos. En primer plano arenis
cas rojas del Keuper.



FOTO 476.- Detalle de los conglomerados miocénicos.



FOTO 477.- Panorámica general de las alineaciones montañosas de Gestalgar. En primer plano, valle aluvial del Turia. El pueblo se asienta sobre Keuper. Los == montes al NO del pueblo son Jurásicos, mientras que las alturas del NE == pertenecen al Cretácico (La Lobera). El fondo montañoso pertenece a la == alineación de Serretilla con edad Kimmeridgense Medio.



FOTO 478.- Panorámica de una parte del Eje de Bugarra. Al Oeste de la foto se tiene el contacto de una barra Muschelkalk con el Keuper. La ladera del Este está ocupada por Keuper. La carretera conduce de Liria a Gestalgar.



FOTO 479.- Explotación de areniscas Buntsandstein en la Sie
rra de Rodana.



FOTO 480.- Alternancia de calizas dolomitizadas y margas fósilíferas dentro de una barra de Muschelkalk al Este de Bugarra.



FOTO 481.- Explotación de arenas Albienses en Benaguacil ==
(Ermita de Montiel).



FOTO 482.- Módulos areniscosos sobre una cantera de arenas-Albienses.



FOTO 483.- Panorámica de la alineación de Serretilla (NE de Gestalgar). La primera elevación es de calizas = Aptienses, el resto es Albiense-Cenomaniense. La carretera se apoya en Kimmeridgiense detrítico.



FOTO 484.- Detalle de un pliegue suave en calizas del Dogger.



FOTO 485.- Formación Roja de Pedralba.



FOTO 486.- Margas y calizas Terciarias al Norte de Pedralba.



FOTO 487.- Calizas miocénicas lacustres.



FOTO 488.- Frente de cantera abierto en las calizas del ==
Dogger, cerca de la carretera que vá desde Ribar-
roja del Turia a Loriguilla y a la carretera na-
cional III.



FOTO 489.- Aspecto típico del tramo de margocalizas con braquiópodos del Toarcienense. Foto tomada a la altura del kilómetro 3 de la carretera que comunica a Ribarroja del Turia con la Nacional III.



FOTO 490.- El Triás del ámbito Suroeste de la Hoja. Al fondo se observa una barra rígida de las dolomías = negras del Muschelkalk envuelta en las facies == abigarradas del Keuper.




FOTO 491.- Capa de unos 20 cms. de espesor, que constituye una verdadera lumaquela de Ammonites cuya aparición señala el hiato Callovo-Oxfordiense.



FOTO 492.- Impresionante panorámica tomada desde el camino que vá a la Fuente del Enebro, en el Suroeste de la Hoja. Los niveles calcáreos de la parte inferior y el tramo detrítico pertenecen al Kimmeridgiense Medio; el primer resalte lo forman calizas con Orbitolinas del Albiense Superior y los resaltos constituyen la formación dolomítica del Cretácico Superior.