




14/28 IB-GS-9200.- Facies "bandeada" en la base del Vendienense Superior en la "Pista militar". Nivel con "Vendotaenida".



14/28 IB-GS-9201.- Conglomerado polimictico del Vendieno Su
perior al N-E de Alía.



14/28 IB-GS-9202.- Vista panorámica de la Raña y de la terminación del Paleozoico desde Puertallano.




14/28 IB-GS-9203.- Detalle de la "Raña" en una cárcava.



14/28 IB-GS-9204.- Disposición general de la cuarcita Armori
cana. Este de Cañamero.



14/28 IB-GS-9205.- Detalle de la cuarcita Armoricana.



14/28 IB-GS-9206.- Pizarral clásico del Complejo Esquisto-grauvaquico.



14/28 IB-GS-9207.- Paisaje anómalo del Esquisto-grauvaquico que en el Gran Anticlinario Centroextremeño suele dar una extensa penillanura. N. de Cañamero.



14/28 IB-GS-9208.- Cuarcitas tableadas del Caradoc.



14/28 IB-GS-9209.- Resalte común de las cuarcitas pardas del Caradoc.



14/28 IB-GS-9210.- Cuarcitas Silúricas.



14/28 IB-GS-9211.- Crestón de las cuarcitas Silúricas en el Valle de Santa Lucía.



14/28 IB-GS-9212.- Aspecto de las pizarras pardas del Ordovícico terminal.



14/28 IB-GS-9213.- Pizarral que comunmente ofrece el Ordovícico Superior.



14/28 IB-GS-9214.- Pizarras del Llandeilo. Presentan una fuerte esquistosidad.



14/28 IB-GS-9215.- 1^{er} Resalte: Pizarras del Llandeilo.
2do Resalte: Cuarcitas del Caradoc.
3er Resalte: Cuarcita Armoricana.
Al fondo la Raña del Sur de Cañamero.