



FOTO 100. Aspecto general de las dolomías del Dogger (J_{1-2}^3) cerca de Tobarra (Sierra Huerta).



FOTO 101. Detalle de las dolomías del Dogger.



3-2

FOTO 102. Margas del Kimmeridgiense inferior. Unidad Jm₃₁₋₃₂.



FOTO 103. Otro detalle de la misma unidad, donde se observan - intercalaciones más detríticas.



FOTO 104. Sierra del Romeral y Montesinos (Dogger). Al fondo - la Muela de Peñarrubia (Serravalliene).



FOTO 105. Margas y margo-calizas ("ritmita") (Jc_{31-32}^{3-2}) cerca del Arroyo de la Manga.



FOTO 106. Afloramientos del Cretácico superior (C_{21-22}) en Casas de Vilches.



FOTO 107. Dolomías con Rudistas y margas verdes en la base del Cretácico superior en Albacete.



FOTO 108. Casas de Vilches. Contacto entre las dos formaciones marinas. Entre ambas los conglomerados poligénicos - del Langhiense.



FOTO 109. Mioceno marino (Serravalliene). (T_{12-11}^{Bb-Bc}) Casas de Vilches.



FOTO 110. Margas blancas marinas con yesos (Tmy_{11}^{Bb}) del Serravlliense. Mora de Santa Quiteria.



FOTO 111. Cerro del Tomillo. Mioceno marino apoyándose sobre distintas unidades del Jurásico.



FOTO 112. Margas con yesos del Mioceno superior-Plioceno. Mórrones de Albatana.



FOTO 113. Detalle de los yesos (Tyc_{c12-2}^1). Bc_1-B



FOTO 114. Margas con yesos bajo los depósitos cuaternarios. -
Falda meridional del Cerro Tomillo.



Bc₁-B
FOTO 115. Arcillas rojas y conglomerados (Tcg₁) del Mioceno superior-Plioceno en las proximidades a Ricon del Moro.



FOTO 116. Calizas tableadas (Mioceno superior-Plioceno) en la carretera de Pozohondo.



FOTO 117. Conglomerado poligénico, areniscas y arcillas aflo-
rante en la salida de Hellín en dirección Tobarra -
Mioceno superior-Plioceno.



FOTO 118. Tobas y Travertinos (Tc_2^B) del Plioceno en la Venta -
del Vidrio.



FOTO 119. Detalle de la misma unidad (Tc_2^B).



FOTO 120. Sierra del Madroño. Aspecto general de los afloramientos jurásicos del Lias-Dogger.



FOTO 121. Muela de Peñarrubia. Complejidad tectónica motivada por cabalgamientos. Carretera Hellín-Lietor.



FOTO 122. Sierra de Huerta. Anticlinal jurásico (Dogger) volcado con el nucleo erosionado.



FOTO 123. Cabalgamiento del Dogger sobre el Kimmeridgiense inferior. Carretera de Hellín a Pozohondo.



FOTO 124. Explotación de aguas subterráneas. Pozos del Boquerón.



FOTO 97 Dolomías tableadas (TG₃^d) del tránsito Triásico-Jurásico. Casas de Ochoa.



FOTO 98. Aspecto general de los yesos del Keuper y las dolomías tableadas en Casas de Ochoa



FOTO 99. Calizas oolíticas y calizas (J_1^2) en la parte inferior. Hacia techo, dolomías del Dogger (J_3^3).
 J_{1-2}^2 J_{1-2}^3