

-20887

REINT. ADAR. I.C.M.E.
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFIA

11B

(H)

Muestras cogidas de techo a muro

22-35-AD-LG

X 575

Bicintrasparrita arenosa.

Lituólidos

Ataxophrágmiidos

Moluscos y Equinodermos

¿ Barremiense superior - Aptense ?

X 576

Biosparita de Orbitolinas.

Neotrocholina

Moluscos y Equinodermos

Dasycladáceas

Bacinella irregularis ?

Barremiense superior - Aptense

X 577

Biointrasparita de Orbitolinas.

Moluscos y Equinodermos

Dasycladáceas

Corales

Bacinella irregularis

Lagénidos

Neomeris

Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense

X 579

Biomicrita de Orbitolinas.

Palorbitolina lenticularis

Daxia

Lagénidos

Corales

Ataxophrágmidos

Moluscos y Equinodermos

Barremiense sup. - Aptense inferior
(probable Bedouliense)

X 5 8 0 L

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga.

Se determinan:

Orbitolina spp.

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 1

Biomicrota de Orbitolinas.

Neotrocholina cf. valdensis

Lagénidos

Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 2

Biosparita arenosa de Orbitolinas.

Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 3

Biomicrota.

Textuláridos

Ostrácodos
Miliólidos
Orbitolínidos
Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 4

Biogravelsparita.

Miliólidos
Choffatella
Permocalculus
Sabaudia minuta
Textuláridos
Verneulínidos
Orbitolínidos (raros)
Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 6

Biointramicrita.

Sabaudia minuta
Miliólidos
Orbitolinopsis
Pseudocyclammina
Cuneolina
Massilina
Boueina

Ataxophrágmidos
Nautiloculina
Mayncina ?
Moluscos y Equinodermos
Anélidos
Pianella

Barremiense superior - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

X 5 8 7

Gravelsparita.

Miliólidos
Orbitolínidos (Parakoskinolina sunni-
landensis elongata en-
tre ellos)
Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense inferior

X 5 8 8

Gravelmicrosparita.

Miliólidos
Moluscos y Equinodermos

Barremiense - Aptense inferior

X 5 9 0 L

El residuo de levigación está formado por trozos de
marga.

Se observan:

Tubos calizos de algas
Fragmentos de oogenios de Characea
Sabaudia minuta

Barremiense - Aptense inferior
(por posición estratigráfica)

591

Biomicrota.

Miliólidos
Boueina
Daxia
Massilina
Permocalculus
Ostrácodos
Pianella
Moluscos y Equinodermos

Barremiense - Aptense inferior

592

Microta.

Ostrácodos
Moluscos
Caráceas

Neocomiense - Aptense inferior

594

Intramicrota.

Miliólidos
Ostrácodos
Moluscos
Glomospira
Textuláridos
Ataxophrágmíidos
Caráceas

Daxia ?

Lithocodium aggregatum ?

Neocomiense - Aptense inferior

X 596

Biomicrota, lacustre

Moluscos

Caráceas

Ostrácodos

Neocomiense - Aptense inferior

X 597

Micrita, lacustre. Algo de cuarzo detrítico.

Caráceas

Ostrácodos

Moluscos

Neocomiense - Aptense inferior

X 598

Biomicrota lacustre salobre. Algo de cuarzo detrítico.

Caráceas

Moluscos

Miliólidos

Ataxophrágmidos

Orbitolinidae ?

Moluscos

Neocomiense - Aptense inferior

X 599

Biomicrota arenosa.

Ostrácodos
Caráceas
Lagénidos
Miliólidos
Cayeuxia
Textuláridos
Moluscos y Equinodermos
Mayncina ?

Neocomiense - Aptense inferior

X 600

Micrita lacustre.

Caráceas
Ostrácodos
Moluscos

Neocomiense - Aptense inferior

22-35-AD-LG

Puente_sobre_el_río_Madera

X 601

Biointramicrita arenosa.

Miliólidos
Trocholina
Textuláridos
Ostrácodos

Permocalculus
Pseudocyclammina lituus
Acicularia
Moluscos y Equinodermos

Berriasiense - Valanginiense inferior

X 602

Biogravelmicrita arenosa.

Pseudocyclammina lituus
Trocholina alpina
Trocholina elongata
Miliólidos
Ostrácodos
Permocalculus
Cayenxia
Alveosepta
Nautiloculina
Feurtillia frequens ?
Dasycladáceas
Moluscos y Equinodermos
Alveosepta jaccardi (resedimentada)

Berriasiense - Valanginiense inferior