

12B

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESPANOLA

-20887

N

X 22-35-AD-LG-634

Biomícrita algo arenosa.

Se determinan: Lithothamnium
Equinodermos
Moluscos
Amphisteginas
Operculinas
Anomalínidos
Elphidium
Rotálidos
Radiolarios
Orbulínidos
Miogypsinas
Briozoos
Globigerinas

Burdigaliense superior-Langhiense inferior

X 22-35-AD-LG-635

Biomícrita algo arenosa. Parece que existe algo de rese
dimentación del Cretácico y Eoceno.

Se determinan: Radiolarios
Equinodermos
Moluscos
Briozoos
Lithothamnium
Globigerinoides

Amphisteginas

Operculinas

Textuláridos

Lagénidos

¿Miogypsinas?

Elphidium

Burdigaliense superior-Langhiense inferior

X 22-35-AD-LG-636 ↓

El residuo de levigación, escasísimo, está formado por margas y cuarzo.

Se observan algunos minúsculos globigerínidos de imposible identificación.

Edad indeterminada.

X 22-35-AD-LG-637 ↓

El aspecto del residuo de levigación es el de haber sufrido un proceso de silicificación observándose algunas formas que quizás hayan sido orgánicas pero que son imposibles de reconocer.

Edad indeterminada.