

-20887

E. N. "ADARO"  
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA  
ESTRATIGRAFICA

PASAVO - MC<sup>L</sup>1 y MC<sup>L</sup>2

2235-AD-LG

(5B)

(A)

CORTE DE SEGURA DE LA SIERRA

Las muestras van de abajo a arriba

✗ 314

Biointramicrita

Globigerina oxfordiana, Ostrácodos, Globochaetes, Lagénidos, Saccocoma, Trocholina, Equinodermos.

Oxfordiense superior

✗ 317

Micrita con vénulas de esparita.

Ostrácodos

Espículas

Kimmeridgiense inferior

✗ 318

Micrita algo arcillosa ligeramente siltosa

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos (raros)

Kimmeridgiense inferior

✗ 320

Micrita arcillosa de aspecto grumoso, ligeramente siltosa.

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos (raros)

Kimmeridgiense inferior

✗ 321

Pelmicrita arcillosa ligeramente siltosa

Epistominas

E. N. «ADARO»  
 LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA  
 ESTRATIGRAFICA

Ostrácodos

Kimmeridgiense inferior

✗ 324

Micrita ligeramente siltosa

Ostrácodos

Epistominas

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

✗ 325

Micrita ligeramente siltosa

Ostrácodos

Lagénidos

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

✗ 326

Micrita algo siltosa. Pajuelas de muscovita

Ostrácodos

Lagénidos

Restos menudos de Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

E. N. "ADARO,"  
 LABORATORIO DE MICROFAUNA  
 ESTACIÓNEA

X 328

Micrita

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 329

Micrita

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 330

Micrita

Ostrácodos

Epistomina

Kimmeridgiense inferior

X 331

Micrita algo siltosa, ligeramente arcillosa

Lagénidos

Ostrácodos

Restos de Moluscos

Kimmeridgiense inferior

E. N. "ADARO"  
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA  
ESTATIGRÁFICA

X 332

Micrita ligeramente siltosa

Globochactes

Ostrácodos

Lagénidos

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 333

Micrita ligeramente siltosa. Pajuelas de mica.

Ostrácodos

Lituólidos (raros)

Epistomina

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 336

Micrita muy ligeramente siltosa.

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos

Kimmeridgiense inferior

X 338

Micrita muy ligeramente siltosa

Ostrácodos

Restos menudos de Moluscos

Kimmeridgiense inferior

E. N. "ADARO"  
LABORATORIO DE MICROFAUNA  
ESTRATIGRAFICA

X 339

Micrita

Epistominas

Lituólidos (raros)

Ostrácodos

Espículas (raras)

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 340

Micrita algo arenosa

Ostrácodos

Restos de Moluscos

Finos restos de Equinodermos

Epistomina

Kimmeridgiense inferior

X 341

Micrita finamente arenosa (silt)

Ostrácodos

Restos de Moluscos

Kimmeridgiense inferior

X 343

Micrita algo arcillosa, ligeramente siltosa. Mica.

Trocholina ?

Restos menudos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

E. N. «ADARO»  
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGÍA  
ESTADÍSTICA

X 344

Micrita con algunos granos de cuarzo detrítico  
 Ostrácodos  
 Epistominas  
 Restos de Moluscos y Equinodermos  
Kimmeridgiense inferior

X 345

Micrita a pelmicrita. Algo de cuarzo.  
 Lituólidos  
 Ostrácodos  
 Lagénidos (Epistominas)  
 Restos de Moluscos y Equinodermos  
Kimmeridgiense inferior

X 346

Micrita con algunos granillos de cuarzo detrítico.  
 Ostrácodos  
 Restos menudos de Moluscos y Equinodermos  
Kimmeridgiense inferior

X 347

Micrita con algo de cuarzo detrítico.  
 Ostrácodos  
 Epistominas  
 Acicularia  
 Miliólidos (raros)

Restos de Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 348

Micrita con cristales de esparita y algo de cuarzo detrítico.

Ostrácodos

Finos restos de Moluscos

Kimmeridgiense inferior

X 349

Micrita

Ostrácodos

Saccocoma

Protoglobigerina ??

Restos de Moluscos y Equinodermos

Epistominas

Kimmeridgiense inferior

X 350

Micrita con cristales de esparita o dolosparita - desperdigados por toda la matriz.

Lagénidos

Restos de Equinodermos

Kimmeridgiense inferior

X 351

Micrita o dolomicrita recristalizada.

Kimmeridgiense

X 352

Microsparita

Kimmeridgiense

X 353

Dolosparita

Kimmeridgiense

X 354

Dolomicrosparita

Kimmeridgiense

X 355

Dolomicrosparita

Restos epigenizados de Moluscos

Kimmeridgiense

X 356

Dolosparita

Kimmeridgiense

E. N. ADARO,

LITERATURA DE LOS MUSEOS  
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

488

Biomicrita

Miliólicos

*Clypeina jurassica*

Ataxophragmidos

*Bankia striata*

Trocholina

Textuláridos

*Marinella lugeoni*

Ostrácodos

Pfenderina

Lituola

Verneuilinidos

Pfenderina ?

Dasycladáceas

Kurnubia

Restos de Lamelibranquios y Gasterópodos

Portlandes

489

Biomicrita

Miliólicos

Pfenderina ?

Dasycladáceas

*Bankia striata*

*Clypeina jurassica*

Verneuilinidos

Nautiloculina oolithica

Kurnubia

Moluscos

Portlandes

490

Biomicrita

Nautiloculina

Acicularia

Lagénidos

Miliólidos

Gasterópodos

Bankia ?

Briozoos

Portlandes

491

Biointrasparrudita con oolitos

Numerosos Gasterópodos

Lituólidos

Feurtillia frequens

Textuláridos

Neotrocholina

Marinella lúgeoni

Lamelibranquios, Equinodermos

Portlandes

E. N. «ADARO»  
 LABORATORIO DE MOLUSCOS  
 ESTRATIGRÁFICOS

492

Biomicrudita. Algunos oolitos.

Numerosos restos de Moluscos y Equinodermos.

Lituólidos

Marinella lugeoni

Ostrácodos

Portlandes

360 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga muy arenosa y gran cantidad de cuarzo.

Se observan tubos calizos de Algas.

Edad indeterminada

361 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga arenosa.

Se observan tubos calizos de Algas.

Edad indeterminada

362

Dolomicrosparita algo arenosa.

Fantasmas de Orbitolinas

Cenomanense (por posición estratigráfica)

E. N. «ADARÓ»  
LABORATORIO DE MICROFAENAS  
ESTACIONAL

X 364

Micrita, cierto aspecto brechoide.

Edad indeterminada

X 366

Pelsparita

Restos de Moluscos y Equinodermos

Stomiosphaeras? Melobesias, *Valinlammina*

Senonense probable

X 367

Pelsparita

Restos de Moluscos y Equinodermos

Stomiosphaeras ?

Probable Senonense

X 368

Pelsparita igual que las precedentes

Probable Senonense

X 369

Micrita

Restos de Moluscos y Equinodermos

Ostrácodos, Miliólidos, Stomiosphaeras ?

Misma microfacies

E. N. «ADARO»  
ESTACIONES DE METROPOLEO  
MOLINARIA

370

Pelstrarita

Restos de Moluscos y Equinodermos

Misma microfacies

371

Micrita en parte recristalizada

Ostrácodos

Discorbidae ?

Finos restos de Moluscos

Spirillina

Miliólidos

Probable Senonense

374 L

El residuo de levigación está formado, en su casi totalidad, por cuarzo.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada