

-20887

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

REVISADO I GME

Serie desde el Cortijo de Goldines a la Carretera a Yeste.

La serie va de abajo a arriba de 419 a 407.

7B

F

X 22-35 AD-LG 419

Intramicrita algo arenosa.

Ostrácodos

Trocholina

Eggerella

Lituólidos

Clypeina jurasica

Feurtillia frequens?

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 417

Biodolomicrita.

Marinella lugeoni

Trocholina

Cylindroporella?

Eggerella

Clypeina jurasica

Actinoporella

Moluscos y Equinodermos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 413

Biopelmicrita.

Clypeina jurasica

Ostrácodos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 412

Pelmicrita en vias de dolomitización

Clypeina jurasica

Ostrácodos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 409

Biomicrita

Miliólidos

Eggerella

Clypeina jurasica

Actinoporella

Nautiloculina

Clypeina lucasi?

Trocholina

Moluscos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 408

Micrita

Miliólidos

Clypeina jurasica

Ostrácodos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 407

Dolosparita de aspecto pseudoolítico

No se observan restos fósiles

Edad indeterminable

Esta nueva serie va de abajo a arriba y está tomada en el otro flanco del anticlinal.

X 22-35 AD-LG 420

Biomocrita en vias de dolomitización.

Miliólidos

Trocholina

Clypeina jurasica

Ataxophragmidos

Feurtillia frequens?

Marinella lugeoni

Cuneolina

Ostrácodos

Moluscos

Esta muestra está comprendida entre 417 y 413 según el esquema que se nos adjunta.

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 421

Dolosparita, con arcilla intersticial

No se observan restos fósiles

Según el esquema está encima de 408 y debajo de 407.

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 422

El residuo de levigación está formado por trozos de arenisca de grano fino.

No se aprecian restos fósiles.

X 22-35 AD-IG 423

Biomicrota con intraclastos

Clypeina jurasica

Nautiloculina

Feurtillia frequens

Permocalculus

Lagénidos

Boueina

Trocholina

Lituólidos

Moluscos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-IG 425

Biodolomicrita.

Miliólidos

Clypeina jurasica

Ostrácodos

Verneulinidos

Nautiloculina

Moluscos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-IG 426

Dolomirosparita arenosa

No se observan restos fósiles

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 427

Biointrasparita dolomitica.

Clypeina jurasica

Nautiloculina

Miliólidos

Trocholina (T. elongata entre ellas)

Pianella

Lituólidos

Gasterópodos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 428

Biodolomicrita.

Nautiloculina

Trocholina

Clypeina jurasica

Miliólidos

Pianella

Caráceas

Clypeina cf. marteli

Verneulinidos

Gasterópodos, Equinodermos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-LG 429

Biomicrita con intraclastos

Miliólidos

Clypeina jurasica

Feurtillia frequens

E. N. SADRAS
LABORATORIO DE GEOLOGIA
1970

-20887

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

Caráceas

Textularidos

Nautiloculina

Ataxophragmiidos

Trocholina

Moluscos

Portlandense-Berriasiense

X 22-35 AD-IG 430

Biomicrota .

Ostrácodos

Trocholina

Clypeina jurasica

Verneulinidos

Moluscos

Portlandense-Berriasiense