

27-35 AD-LC 1.-

Biomicrota

Se determinan:

Heterohelix globulosa

Globotruncana linneiana

Hedbergella

Senoniense

27-35 AD-LC 3.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza y caliza algo arcillosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Globotruncana aff. elevata

Globotruncana linneiana

Senoniense

(probable Campaniense)

27-35 AD-LC 4.-

Biomicrota

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Globotruncana elevata

Heterohelix globulosa

Lagénidos

¿*Rugo globigerina*?

Hedbergella

Campaniense

27-35 AD-LC 5.-

Biomicrita algo arcillosa

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Hedbergella

Senoniense27-35 AD-LC 6.-

Biomicrita

Se determinan:

Hedbergella

Globotruncana linneiana

Heterohelix globulosa

Senoniense27-35 AD-LC 7.-

Calcedonia.

27-35 AD-LC 8.-

Caliza arcillosa

Se determinan:

Radiolarios

Hedbergellas

¿Rotalipora?

Cenomaniense-Turonense27-35 AD-LC 9.-

Se observan:

Hedbergellas

Radiolarios

Cenomaniense-Turonense

27-35 AD-LC 10.-

Micrita

Se observan:

Hedbergella

Heterohelix

Globotruncana?

Turonense-Senonense27-35 AD-LC 11.-

Biomicrita

Se determinan:

Hedbergella

Globotruncana

Heterohelix

Senonense (inferior probable)27-35 AD-LC 12.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Rotalipora sp.?

Hedbergella sp.

Cretácico superior27-35 AD-LC 13.-

Micrita arcillosa

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Heterohelix globulosa

Hedbergella

Senonense

27-35 AD-LC 14.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa arenosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Globotruncana sp.

¿Rotalipora?

Cenomaniense-Turonienso

27-35 AD-LC 15.-

Biomicrota

Se determinan:

Globotruncana aff. elevata

Heterohelix globulosa

Globotruncana linneiana

Hedbergella

Anomalínidos

Senoniense

(probable Campaniense)

27-35 AD-LC 16.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga rojiza.

Se observan:

Heterohelix

Globotruncana

Rotalipora?

Turonienso-Senoniense

27-35 AD-LC 17.-

Caliza arcillosa

Se determinan:

Heterohelix globulosa

Globotruncana linneiana

¿Rugoglobigerina?

Hedbergellas

Senoniense

27-35 AD-LC 18.-

Biomicrocitra arcillosa

Se determinan:

¿Globotruncana linneiana?

Heterohelix globulosa

Hedbergellas

Lagénidos

Globotruncana aff. bulloides

Senoniense

27-35 AD-LC 19.-

Se determinan:

Heterohelix

Globotruncana

Textuláridos

Lagénidos

Hedbergellas

Turonense-Senoniense

27-35 AD-LC 20.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Globotruncana

¿Rotalipora?

Turonense-Senoniense

27-35 AD-LC 21.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa.

Se determinan:

¿Rotalipora?

Hedbergella

Heterohelix

Praeglobotruncana

Turonense-Senoniense

27-35 AD-LC 22.-

Biomicrota

Se determinan:

Hedbergella

Heterohelix

Globotruncana linneiana

Globotruncana aff. elevata

Globotruncana aff. stuarti

Senoniense

(probable Campaniense-Maastrichtiense)

27-35 AD-LC 24.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa arenosa.

Hay Truncorotalias escasas

Paleoceno-Eoceno inferior

27-35 AD-LC 25.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa. Fósiles. muy mal conservados.

Se determinan:

Globorotalia loeblichii

Globorotalia aff. aequa

Globigerina spp.

probable Ypresiense

27-35 AD-LC 26.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa arenosa.

No se aprecian restos fósiles.

27-35 AD-LC 27.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa arenosa. Fósiles escasísimos.

Se observan:

Nummulites sp.

probable Eoceno

27-35 AD-LC 30.-

Micrita

Se observan:

Globigerina

Bolivina

Anomalinidos

Ostrácodos

Radiolarios

Terciario

27-35 AD-LC 31.-

Biomicrosparita

Se observan:

Textuláridos

Anomalínidos
Ophthalmidiidos
Bolivinas

Terciario

27-35 AD-LC 32.-

Biomicrota

Se determinan:

Bolivinas
Anomalínidos
Globigerinas
Moluscos
Equinodermos
espículas

Terciario

27-35 AD-LC 33.-

Roca parecida a la anterior

Se determinan:

Textuláridos
Globigerinas
Bolivinas
Anomalínidos
Globorotalias
Moluscos
Ostrácodos

Terciario

27-35 AD-LC 34.-

Biomicrota arcillosa

Se determinan:

Stilostomella
Globigerinas
Bolivinas
espículas

Terciario

27-35 AD-LC 35.-

Micrita arcillosa

Se determinan:

Globigerinas
Bolivinas
Equinodermos
espículas

Terciario

27-35 AD-LC 36.-

Micrita en roca conglomerática

Se determinan:

Anomalínidos
Globigerinas
Bolivinas
Equinodermos
Globorotalia

Terciario

27-35 AD-LC 37.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga arenosa.

Se determinan:

Equinodermos
Cibicides pseudoungerianus
Eponides aff. praecinctus

Terciario

27-35 AD-LC 38.-

Caliza muy arenosa

Se determinan:

Globigerinas
Globorotalias
Anomalfnidos
Miliólidos
Discorbidos
Bolivinas

Terciario

27-35 AD-LC 39.-

Micrita

Se determinan:

Anomalfnidos
Globigerinas
Globorotalias
Bolivinas
espículas
Virgulina schreibersiana
Globigerina sp.

Terciario

27-35 AD-LC 40.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa. La roca, con algunos fósiles, no ha disgregado bien siendo imposible la clasificación de los restos orgánicos.

Edad indeterminada

27-35 AD-LC 43.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga arenosa.

Se observan:

Lamelibranquios
Equinodermos
Globigerina sp.
Eponides praecintus
Elphidium sp.

27-35 AD-LC 53.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza arcillosa arenosa.

Se determinan:

Elphidium crispum
Ammonia beccarii
Nonion boueanum
Cibicides lobatulus
Lamelibranquios
Equinodermos
Ostrácodos
Globigerina sp.

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 54.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
caliza margosa arenosa.

Se determinan:

Lamelibranquios
Equinodermos
Ostrácodos
Ammonia beccarii
Nonion boueanum

¿Orbulina?
 Elphidium crispum
 Eponides praecintus
 Bulimina elongata lappa
 Globorotalia ex. gr. menardii
Mioceno superior

27-35 AD-LC 56.-

Pelmicrita

Se observan:

Anomalínidos
 Bolivinas
 Globigerinas
 Virgulina?
 Moluscos

Terciario

27-35 AD-LC 57.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
 caliza arcillosa arenosa.

Se determinan:

Lamelibranquios
 Equinodermos
 Ostrácodos
 Nonion boueanum
 Ammonia beccarii
 Eponides praecintus
 Globigerina sp.

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 58.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa y marga, arenosas.

Se determinan:

Lamelibranchios

Equinodermos

Robulus calcar

Ammonia beccarii

Nonion boueanum

Orbulina universa

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 59.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa y marga, arenosas.

Se determinan:

Equinodermos

Ostrácodos

Globorotalia obesa

Globigerina sp.

Ammonia beccarii

Nonion boueanum

Orbulina universa

Globorotalia aff. acostaensis

probable Mioceno superior

27-35 AD-LC 60.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Ammonia beccarii

Globigerina aff. bulloides

Globigerinoides trilobus

Orbulina universa

Nonion boueanum

probable Mioceno superior

27-35 AD-LC 61.-

El residuo de levigación, escasísimo, está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Nonion boueanum

Ammonia beccarii

Globorotalia obesa

Globigerinoides obliquus

Globulina gibba tuberculata

Globigerina sp.

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 62.-

El residuo de levigación, muy escaso, está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Lagena striata

Nonion boueanum

Ammonia beccarii

Orbulina universa

Globigerina sp.

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 63.-

El residuo de levigación, escasísimo, está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Ammonia beccarii
 Nonion boueanum
 Globigerina sp.
 Globorotalia scitula ventriosa
 Elphidium complanatum
 Globorotalia aff. acrostoma

probable Tortoniense superior-Andalu
ciense

27-35 AD-LC 64.-

El residuo de levigación está formado por trozos de ca
liza arcillosa arenosa.

Se determinan:

Eponides praecintus
 Ammonia beccarii
 Nonion boueanum
 Globigerina spp.

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 65.-

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
ga. Los fósiles son muy pequeños.

Se Observan:

Globigerina spp.
 Cibicides sp.

Edad indeterminada

27-37 AD-DC 66.-

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
ga y yeso.

Se determinan:

Eponides haidingeri
Eponides praecinctus
Ammonia beccarii
Globorotalia acostaensis
Spiroplectammina carinata
Nonion boueanum
probable Tortoniense

27-35 AD-LC 68.-

Caliza groseramente arenosa.

Se observan:

Anomalínidos
Globigerinas
Elphidium crispum
Textuláridos
Globorotalia

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 69.-

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
ga impregnada de óxido de hierro y yeso.

Se determinan:

Equinodermos
Globigerinoides trilobus
Globigerinoides quadrilobatus
Ammonia beccarii
Nonion boueanum
Globigerina aff. bulloides

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 70.-

El residuo de levigación está formado por trozos de mar
ga.

Se determinan:

Nonion boueanum
Globigerina aperta
Globorotalia incompta
Orbulina universa
Globorotalia scitula
Equinodermos
Ostrácodos

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 74.-

Biomicrota con filamentos?

Se determinan:

Moluscos
Equinodermos
Ostrácodos
Radiolarios
Lagénidos
Saccocoma
Globochaete alpina
Stomiosphaera
Spirillina
Aptychus

Jurásico superior

(probable Kimmeridgiense)

27-35 AD-LC 75.-

Micrita llena de filamentos.

Se determinan:

Stomiosphaera
Lagénidos

probable Dogger

27-35 AD-LC 76.-

Micrita ^{con} ~~llena de~~ filamentos.

Se determinan:

Equinodermos
Radiolarios
Stomiosphaera
Miliólidos
Globigerina oxfordiana
Oxfordiense superior

27-35 AD-LC 77.-

Micrita

Se determinan:

Radiolarios
Ostrácodos
Lagénidos
Globochaete alpina
Calpionella alpina
Aptychus
Calpionella elliptica
Titónico superior

27-35 AD-LC 79.-

Micrita

Se determinan:

Ostrácodos
Radiolarios
Globochaete alpina
Saccocoma
Spirillina
Kimmeridgiense probable

27-35 AD-LC 80.-

Micrita

Se determinan:

Ostrácodos
Radiolarios
Equinodermos
Ammodiscidos
Moluscos
Spirillina
Globigerina oxfordiana?
Globochaete alpina
Aptychus

Kimmeridgiense probable

27-35 AD-LC 86.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga y yeso.

Se determinan:

Ammonia beccarii
Nonion boueanum
Orbulina universa
Nonion seidenii
Globigerinoides trilobus

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 87.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga y yeso.

Se determinan:

Ammonia beccarii
Orbulina universa
Nonion boueanum
Elphidium crispum
Globigerina sp.
Globorotalia obesa
Orbulina suturalis

Mioceno medio-superior

27-35 AD-LC 89.-

El residuo de levigación está formado por algún trozo de marga y gran cantidad de yeso.

Se observan algunas pequeñas Globigerinas

Terciario27-35 AD-LC 90.-

El residuo de levigación está formado por trozos de - marga arenosa.

Se determinan:

Ammonia beccarii
 Bulimina elongata lappa
 Globigerina bulloides
 Orbulina universa
 Valvulineria bradyana
 Nonion soldanii
 Orbulina bilobata
 Nonion boueanum
 Uvigerina schwageri
 Globorotalia ex. gr. menardii
 Vaginulinopsis inversa carinata
 Globigerina decoraperta

Tortonense27-35 AD-LC 91.-

El residuo de levigación está formado por trozos de - marga arenosa.

Se determinan:

Allomorphina trigona
 Orbulina universa
 Cibicides pseudoungerianus
 Globigerinoides trilobus
 Ammonia beccarii
 Globigerina decoraperta
 Bulimina buchiana

Mioceno superior27-35 AD-LC 92.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga y yeso.

Se determinan:

Globigerina decoraperta
Orbulina universa
Ammonia beccarii
Eponices praecintus
Valvulineria bradyana
Nonion boueanum
Globigerinoides obliquus
Pullenia bulloides
Globigerinoides quadrilobatus
Cancris auriculus
Globigerinoides ruber
Globigerina aff. bulloides
Allemorphina trigona
Bulimina buchiana

Mioceno superior27-35 AD-LC 93.-

El residuo de levigación está formado por trozos de -
marga y yeso.

Se determinan:

Valvulineria bradyana
Globigerina decoraperta
Cancris auriculus
Cibicides pseudoungerianus
Globigerinoides trilobus
Orbulina universa
Pullenia bulloides
Eponides praecintus
Robulus Calcar

probable Mioceno superior27-35 AD-LC 94.-

El residuo de levigación está formado por trozos de - caliza arcillosa arenosa.

Se determinan:

Nonion boueanum
Globigerinoides trilobus
Globorotalia ex. gr. menardii
Nonion pompilioides
Pullenia bulloides
Valvulineria bradyana
Nonion soldanii
Orbulina universa
Siphonina planoconvexa

Mioceno superior

27-35 AD-LC 95.-

Muestra del mismo tipo que la anterior y con una micro fauna muy semejante.

Mioceno superior

27-35 AD-LC 96.-

El residuo de levigación está formado por trozos de - marga y yeso.

Se determinan:

Nonion boueanum
Spiroplectammina carinata
Bulimina exilis
Ammonia beccarii
Valvulineria bradyana
Virgulina schreibersiana
Globigerinoides obliquus
Allomorphina trigona

Orbulina universa
Globorotalia scitula ventriosa
Orbulina suturalis
Bulimina elongata lappa
Globigerinoides trilobus
Mioceno superior

27-35 AD-LC 97.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Globigerinoides trilobus
Globigerinoides obliquus
Spiroplectammia carinata
Bulimina exilis
Valvulineria bradyana
Martinottiella communis
Globigerinoides quadrilobatus
Hopkinsina bononiensis
Globigerinoides obliquus amplus
Uvigerina peregrina
Ammonia beccarii
Mioceno superior