

7B

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROFALANTOLOGÍA
ESTRATIGRÁFICA

X 22-36 AD-CD 263

Abundante residuo arenoso. Foraminíferos pequeños y recris-
talizados.

Urrutia 'L'
menor 272,
que no lleve
letra.

- Globorotalia spp.
- Globigerina cf. detertrei
- Globigerinoides trilobus
- Globigerinoides cf. quadrilobatus
- Globorotalia scitula
- Globigerina spp.
- Globorotalia cf. mayeri
- Globigerina praebulloides
- Globigerina woodi
- Bolivinooides miocenicus
- Bolivina scalprata miocenica
- Globoquadrina cf. conglomerata
- Foraminíferos resedimentados del Cretáceo

Posible Mioceno superior con resedimen-
taciones del Mioceno inferior y Cretáceo

X 22-36 AD-CD 265

- Abundante yeso
- Fragmentos de Moluscos
- Foraminíferos ausentes

¿Mioceno superior?

X 22-36 AD-CD 267

Fragmentos margo-siltosos y cuarzo. Foraminíferos escasos y recristalizados. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

Globorotalia spp.

Globigerina spp.

Globigerinoides trilobus

Globoquadrina sp. (cf. langhiana)

Globigerina cf. apertura

Foraminíferos resedimentados del Cretáceo

Depósito leustre de un posible Mio-Plioceno con resedimentaciones del Mioceno inferior y del Cretaceo.

X 22-36 AD-CD 269

Fragmentos de calcita y cuarzo. Foraminíferos escasos y en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

Globigerinoides trilobus

Globorotalia spp.

Globigerina spp.

Globorotalia cf. scitula gigantea

Globoquadrina cf. conglomerata

Globoquadrina globosa

Globoquadrina dehiscens (?), fragmento

¿Mio-Plioceno? (Ver observaciones en la muestra 267)

X 22-36 AD-CD 271

Resíduo formado por fragmentos de marga y cuarzo. Foraminíferos en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= in crustaciones de Algas).

- Globigerina spp.
- Globoquadrina cf. conglomerata
- Globorotalia spp.
- Globoquadrina altispira
- Globoquadrina cf. dehiscens
- Globigerinoides ruber
- Globorotalia scitula
- Globorotalia praescitula

Déposito lacustre de un posible Mio-
-Plioceno con resedimentaciones del
Mioceno inferior.

X 22-36 AD-CD 272

Resíduo formado por fragmentos de marga, calcita y cuarzo. Foraminíferos en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= in crustaciones de Algas).

- Globigerinoides trilobus
- Globorotalia spp.
- Globoquadrina globosa
- Globigerinoides ruber (cf. altiapertura)
- Globigerina praebulloides

E. N. «ADARDO»
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
LABORATORIO DE GEOPALAEONTOLOGIA

Depósito lacustre de un posible
Mio-Plioceno con resedimentaciones del Mioceno inferior.

X 22-36 AD-CD 273

Fragmentos margosos, calcita y cuarzo. Foraminíferos en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

Globigerinoides cf. altiapertura

Globigerinoides trilobus

Globigerinoides bisphaericus

Globoquadrina altispira

Globoquadrina globosa

Depósito lacustre de un posible
Mio-Plioceno con resedimentaciones del Mioceno inferior.

X 22-36 AD-CD 274

Fragmentos margosos, calcita y cuarzo. Foraminíferos muy escasos y en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

Globoquadrina sp.

Globorotalia praescitula

Globorotalia sp.

Depósito lacustre de un posible
Mio-Plioceno con resedimentaciones del Mioceno inferior.

X 22-36 AD-CD 275

Residuo formado por fragmentos margosos, calcíticos y cuarzo. Foraminíferos escasos y en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

- Globoquadrina cf. langhiana
- Globigerinita sp.
- Globorotalia spp.
- Globigerina spp.
- Globoquadrina dehiscens

Depósito lacustre de un posible Mio-Plioceno? con resedimentaciones del Mioceno inferior.

X 22-36 AD-CD 276

Fragmentos margosos, calcíticos y cuarzo. Foraminíferos en mal estado de conservación. Tubos margo-calizos (= incrustaciones de Algas).

- Globigerinoides cf. trilobus
- Globigerinoides cf. primordius
- Globigerinoides altiperturus
- Globoquadrina dehiscens
- Globigerinoides bisphericus
- Globorotalia spp.

Depósito lacustre de un posible Mio-Plioceno con resedimentaciones del Mioceno inferior.

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOG
ESTRATIGRAFICA

X 22-36 AD-CD 277

Fragmentos margosos, calcíficos y cuarzo. Foraminíferos escasos y en mal estado de conservación. Abundantes tubos margo-calizos, correspondientes a incrustaciones de Algas.

Globoquadrina cf. dehiscens

Globigerina spp.

Globorotalia spp.

Depósito lacustre de un posible
Mio-Plioceno con resedimentaciones
del Mioceno inferior.