

26-36 AD-LJ 72.-

Globotruncana linneiana
Globotruncana cf. angusticarinata
Globotruncana tricarinata
Globotruncana cf. arca
Globotruncana cf. rosetta
Globotruncana fornicata

Santoniense superior

(Son casi todas formas no típicas, sino de transición, según las líneas evolutivas)

26-36 AD-LJ 73.-

Globotruncana carinata
Globotruncana coronata
Globotruncana cf. rosetta
Globotruncana linneiana
Globotruncana tricarinata
Globotruncana cf. fornicata

Santoniense superior

(tirando a Campaniense inferior)

26-36 AD-LJ 74.-

Globotruncana linneiana
Globotruncana arca
Globotruncana conica
Globotruncana rosetta
Globotruncana stuartiformis
Globotruncana fornicata

Campaniense inferior

26-36 AD-LJ 76.-

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana fornicata

Globotruncana rosetta

Globotruncana linneiana

Globotruncana cf. carinata

Globotruncana cf. caliciformis

Campaniense

(tirando a inferior)

26-36 AD-LJ 77.-

Globotruncana stuartiformis (frecuente)

Globotruncana fornicata

Globotruncana cf. tricarinata

Globotruncana ventricosa

Globotruncana cf. linneiana

Globotruncana cf. caliciformis

Pseudotextularia elegans

Campaniense

26-36 AD-LJ 78.-

Pseudotextularia elegans

Rugoglobigerina

Hedbergella

Globigerinelloides

Globotruncana elevata

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana arca

Globotruncana falsostuartiformis

Globotruncana stuarti

~~Globotruncana~~ Campaniense superior-Maastrichtiense inf.

(Tajantemente Maastrichtiense inferior, según Postuma; no hay ningún inconveniente en considerarla Campaniense superior, siguiendo a Sigal)

26-36 AD-LJ 79.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza margosa algo arenosa. Los restos orgánicos están mal conservados.

La microfauna, lo único que podemos decir, pertenece al Mioceno.

26-36 AD-LJ 80.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Nummulites (entre ellos W. grupo striatus)

Operculina

Rotalia aff. rimosa

Sphaerogypsina?

Ellipsoglandulina multicosata

Globigerapsis index

¿Truncorotaloides?

Clavulinoides szabo

Vulvulina spinosa

Globorotalia centralis

Globorotalia bullbrookii

Catapsydrax sp.

Globigerina venezolana

Luteciense superior-medio

26-36 AD-LJ 81.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas arenosas.

Se determinan:

Vulvulina spinosa

Globigerina venezolana

Asterocyclina

Discocyclina

Sphaerogypsina

Nummulites

Globorotalia centralis

Globorotalia pseudotopilensis

Globigerapsis index

Globigerapsis kugleri

Chapmanina

Luteciense medio-superior

26-36 AD-LJ 82.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Globigerina venezolana
Vulvulina spinosa
Globorotalia centralis
Clavulina parisiensis
Chapmanina
Operculina
Globigerapsis index
Globorotalia pseudotopilensis
Globigerapsis kugleri
Catapsydrax sp.
Truncorotaloides topilensis
Nummulites sp.

Luteciense medio-superior

26-36 AD-LJ 83.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Vulvulina spinosa
Nummulites (algunos del grupo de N. fabianii)
Globorotalia centralis
Operculina

Globigerapsis index

Globigerina venezuelana

Catapsydrax sp.

Globigerina aff. turgida

Luteciense

26-36 AD-LJ 84.-

El residuo de levigación está formado por trozos de m
ga.

Se determinan:

Globigerina venezuelana

Globorotalia centralis

Catapsydrax sp.

Globigerapsis index

Globigerinatheka barri

Luteciense

26-36 AD-LJ 85.-

Biomicrosparita.

Se determinan:

Melobesias

Discocyclinas

Operculina

Sphaerogypsina

Rotalia

Nummulites

Eoceno inferior-medio

26-36 AD-LJ 87.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas y yeso. Hay resedimentación del Cretácico superior.

Se determinan:

Globigerinas (tipo terciario)

Lenticulina sp.

Paleoceno-Eoceno

26-36 AD-LJ 88.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Globigerina venezolana

Vulvulina spinosa

Globigerapsis index

Globorotalia centralis

Globorotalia pseudotopilensis

Catapsydrax

Truncorotaloides topilensis

Clavulina parisiensis

Luteciense medio-superior

26-36 AD-LJ 90.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

-20912

Se determinan:

Vulvulina spinosa

Globigerina venezuelana

Catapsydrax sp.

Globigerapsis index

Globigerina aff. rohri

probable Priaboniense o Luteciense
medio-superior

26-36 AD-LJ 93.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas y yeso.

Se determinan:

Vulvulina spinosa

Globigerina venezuelana

Globigerinita dissimilis

Globigerina rohri

Cassidulina subglobosa horizontalis

probable Oligoceno