

26-36 AD-FJ 30.-

LEV. Resíduo formado en su casi totalidad por Foraminíferos. Se reconocen *Globoquadrina altispira*, *G. dehiscens*, *Globorotalia nana*, *Globigerina venezuelana*, *G. praebulloides*, *G. tripartita*, *Globulina gibba*, *Lagena marginata*, *Rotalia spinulsa*, *Eulepidina sp.*, *Gyroidina gibrardana*, *Martinottiella communis*, *Planulina ariminensis*, *P. marialana*, *Lenticulina cultrata*, *virgulina*, *Stilostomella monilis*, *Uvigerina barbatula*, *U. proboscidea*, *Guttulina*.

Mioceno inferior (Burdigaliense)

26-36 AD-FJ 31.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de margas sin deshacer y abundantes restos no bien conservados de *Globigerina venezuelana*, *G. praebulloides*, *Globoquadrina*, *Globigerinoides bisphericus*, *G. bisphericus*, junto con *Eggerella*, *Guttulina*, *Textularia*.

Mioceno inferior

26-36 AD-FJ 32.-

L.T. Biomicrita, algo arenosa, llena de Algas, Briozoos, Amphistegina, Planorbulina, junto con Textularia, Operculina, Equinodermos, Globigerinidos.

Mioceno inferior

26-36 AD-FJ 34.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos calizos y granos de cuarzo. No se observan fósiles.

Indeterminada

26-36 AD-FJ 35.-

L.T. Biomicrita con algo de óxido de hierro, llena de -  
*Pythonella sphaerica*, *P. ovalis*, Radiolarios, *Heterohelix*, *Gumbelina*, *Ostracodos* y escasos restos de *Globotruncanas* (*G. angusticarinata*).

Coniaciense-Campaniense inferior

26-36 AD-FJ 36.-

L.T. Biomicrita, finamente bandeada, con óxido de hierro, llena de restos de *Stomiosphaeras*, espículas, *Ostracodos*.

Senoniense

26-36 AD-FJ 37.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos y algo de cuarzo y pirita, abundantes restos de *Globotruncanas* (*G. angusticarinata*, *G. af. calcarata*, *G. sigali*, *G. schneegansi*), junto con *Heterohelix*, *Hedbergella*.

Coniaciense

26-36 AD-FJ 38.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, algo de cuarzo y frecuentes restos de *Globotruncana coronata*, *G. renzi*, *G. arca*, *G. angusticarinata*, *G. af. sigali*, *Rotalipora* sp., *Praeglobotruncana* sp., *Dentalina*, *Heterohelix*, fragmentos de Lamelibranquios.

Santoniente inferior

26-36 AD-FJ 39.-

L.T. Biomicrita, en parte recristalizada con frecuentes restos mal conservados de *Globotruncanas* (*G. coronata*, *G. lapparenti*, *G. af. fornicata*), *Heterohelix*, *Gumbelina*, *Ostracodos*.

Coniaciense-Santoniente

26-36 AD-FJ 40.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin deshacer, fragmentos calizos, algo de cuarzo y pirita óxidada y frecuentes -- restos de *Globotruncana renzi*, *G. fornicata*, *G. concavata*, *G. angusticarinata*, *G. af. primitiva*, *Guttulina*, *Gumbelina*.

Santonense inferior

26-36 AD FJ 41.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos calizos y de marga sin deshacer, algo de cuarzo y escasos restos mal conservados de *Globotruncana af. primitiva*, *G. fornicata*, *G. concavata*, *Ammodiscus*, *Gumbelina*, *Dentalina*.

Santonense inferior

26-36 AD-FJ 42.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, frecuente cuarzo y muy escasos restos pequeños de *Globotruncana angusticarinata*, *G. fornicata*, *G. concavata*, *G. primitiva*, *Heterohelix globulosa*, *Radiolarios*.

Santonense inferior

26-36 AD-FJ 43.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, frecuente cuarzo y muy escasos restos de *Globotruncana angusticarinata*, *G. fornicata*, *G. concavata*, *G. lapparenti*, *Dentalina*, *Marssonella*, *Radiolarios*.

Santonense

26-36 AD-FJ 44.-

Residuo formado por fragmentos calizos, de marga sin deshacer y frecuentes restos de *Globotruncana angusticarinata*, *G. conica*, *G. fornicata*, *G. af. ventricosa*, *G. elevata*, *G. lapparenti*, *Heterohelix*.

Campanense

26-36 AD-FJ 44.-

L.T. Biomicrita arcillosa con abundantes restos de Globotruncanas (*G. lapparenti*, *G. angusticarinata*, *G. ventricosa*), *Hedbergella*, *Heterohelix*, *Pithonella*, *Ostracodos*.

Campaniense inferior

26-36 AD-FJ 45.-

L.T. Biomicrita llena de Globotruncanas rotas (*G. af.* - *ventricosa*, *G. lapparenti*), *Heterohelix*, *Bolivina*, *Lenticulina*, *Rotaliidos*, *Heterohelix*, Foraminíferos arenaceos, Algas.

Campaniense

26-36 AD-FJ 46.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, algunos de marga sin deshacer, cuarzo y frecuentes restos de Globotruncana *lapparenti*, *G. conica*, *G. elevata*, *Heterohelix*, *Merssonella*.

Campaniense

26-36 AD-FJ 47.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin deshacer, fragmentos calizos, algo de cuarzo, frecuentes restos de Globotruncanas *stuartiformis*, *G. arca*, *G. conica*, *G. fornicata*, *Heterohelix*, *Ostracodos*, Radiolarios, Cibicides.

Campaniense

26-36 AD-FJ 48.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos y muy escasos restos de Cibicides, *Nonionella*, *Dentalina*, *Globotruncana*, *Heterohelix*, placas de Equinodermos.

Senoniense superior

26-36 AD-FJ 49.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin deshacer, fragmentos calizos y frecuentes restos de *Globotruncanas* (*G. arca*, *G. conica*, *G. lapparenti*), espículas, *Marssonella*.

Campaniense

26-36 AD-FJ 50.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga sin deshacer, fragmentos calizos y frecuentes restos de *Globotruncana contusa*, *G. stuarti*, *G. falsostuarti*, *Marssonella*, *Heterohelix*.

Maastrichtiense

26-36 AD-FJ 51.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga rosada sin deshacer, escasos fragmentos calizos y muy escasos restos de *Rotalia*, *Tritaxia*, *Heterolepa*, *Eouvigerina* y pequeños *Globigerinidos* mal lavados (*Globorotalia af. pseudobulloidies*, *G. af. trinidadensis*).

Paleoceno (Danés-Montiense)

26-36 AD-FJ 52.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga rosada sin deshacer y abundantes restos de *Globigerinidos* pequeños (entre ellos alguna *Globotruncana* resedimentada), *Globorotalia compressa*, *G. pseudobulloidies*, *Globigerina sp.*, *Ostracodos*, *Heterolepa*, *Nonionella*, *Asterigerina*, *Tritaxia*.

Paleoceno

26-36 AD-FJ 53.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de marga dura sin deshacer, frecuentes restos (entre ellos *Globotruncanas* resedimentadas) de *Hantkenina* sp., *Globorotalia af. bollbrooki*, *Globigerinas*, *Asterigerina*, *Textularia*, *Stilostomella*, *Rotalia*, pequeños *Nummulites*.

Eoceno. Probable Lutecienense inferior.

26-36 AD-FJ 54.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga dura sin deshacer, algo de cuarzo y muy escasos restos mal conservados de Cibicides, Bolivina, Lagena, Globigerinidos (*G. af. pseudomenardii*, *G. af. ehrenbergi*).

Probable Paleoceno superior

26-36 AD-FJ 55.-

L.T. Biomicrita recristalizada con frecuentes restos de Melobesias, Alveolina, Nummulites, Orthophragmina, Discocyclina.

Luteciense

26-36 AD-FJ 56.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, algo de cuarzo y Glauconita, muy escasos restos de Radiolarios.

Indeterminada

26-36 AD-FJ 105.-

L.T. Biomicrita algo arenosa con abundantes restos de Briozoos, fragmentos de Equinodermos, Lamelibranquios, Algas, Nummulites (*N. af. incrassatus*), Amphistegina, Operculina, Planorbolina.

Eoceno superior-Oligoceno