

Abundancia fósil 968
①

-20912

26-36-AD-LJ-10.-

El residuo de levigación formado por trozos de marga contiene escasísimas formas miocenas (Bolivina alta entre ellas), junto con una abundantísima microfauna del Senoniense superior, la cual por la posición indicada por el geólogo de ser resedimentada.

Tortonense

(por posición estratigráfica)

26-36-AD-LJ-11.-

Residuo de levigación formado por trozos de - de caliza arcillosa algo arenosa.

Hay resedimentación del Cretácico superior y del ¿Mioceno inferior?.

Se determinan:

Globigerinoides ruber
Bolivina arta
Orbulina universa
Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides
Uvigerina striatissima
Virgulina schreibersiana

Tortonienne

26-36-AD-LJ-12.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Parece existir resedimentación del Mioceno-inferior.

Se determinan:

Valvulineria bradyana
Globorotalia scitula
Orbulina universa
Stilostomella advena
Cassidulinoides bradyi
Globorotalia acostaensis
Globorotalia acrostoma

Tortonienne

26-36-AD-LJ-13.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Equinodermos
Ostrácodos
Pullenia bulloides
Globigerinoides trilobus
Cibicides pseudoungerianus

Nonion pompilioides

Tortonense

(por posición estratigráfica)

26-36-AD-LJ-14.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Truncorotaloides rohri
Truncorotaloides topilensis
Globorotalia bullbrooki
Globorotalia spinulosa
Globigerapsis index
Globigerapsis kugleri
Catapsydrex sp.

Luteciense

26-36-AD-LJ-15.-

Biomicrorita con algo de esparita.

Globigerinas
Anomalinidos
Globotruncanas
Hastigerina
Ataxophaegmiidósos
Melobesias
Moluscos, Equinodermos y Briozoos

Terciario en fauna resedimentada del Cretaceo superior.

26-36-AD-LJ-16.-

El residuo de levigación está formado por

trozos de marga.

Se determinan:

Pseudotextularia elegans
 Globotruncana linneiana
 Globotruncana ventricosa
 Globotruncana elevata

Campaniense

26-36-AD-LJ-17.-

Biomicrota.

Discocyclina
 Nummulites
 Melobesias
 Amphistegina
 Operculina
 Globigerinidae
 Moluscos y Equinodermos

Eoceno

26-36-AD-LJ-18.-

Caliza margosa algo arenosa. Hay resedimentación del Cretácico y Eoceno.

Se determinan:

Nonion beueanum
 Bolivina scalprata miocenica
 Globigerinoides trilobus
 Bolivina arta
 Globigerinita sp.
 Ammonia beccarii
 Gypsinidos
 Globorotalia pseudopachyderma
 ¿Praeorbulinas?

Helvetiense-Tortonense

(si las Praeorbulinas existieran y no fueran resedimentadas la muestra sería Langhiense).

26-36-AD-LJ-19.-

El residuo de livigación está formado por trozos de marga.

La microfauna es una mezcla de la del Lute-
ciense (la más abundante), Mioceno inferior (regular) y -
Cretácido superior (la más escasa).

26-36-AD-LJ-20.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Ticinella roberti
Hedbergella trocoidea
Gyroidina
Ammodiscus tenuissimus
¿Biticinella breggiensis?

Albiense26-36-AD-LJ-21.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas y mucho yeso.

Se determinan:

Globigerinoides trilobus
Cassidulinoides bradyi
Ammonia beccarii
Orbulina universa
Amphycorina semicostata
Globigerina bulloides

Mioceno superior
(probable Tortoniense)

26-36-AD-LJ-22.-

Pelmicrita arenosa

Radiolarios

Globigerinidae

Stomiosphaeras?

Edad indeterminada (¿Maestrichtiense-Campaniense?) *Panc's*

26-36-AD-LJ-23.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y abundante yeso.

La microfauna pertenece en su gran mayoría al Luteciense, con algunas formas del Mioceno inferior.

26-36-AD-LJ-24.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globigerina decoraperta

Orbulina universa

Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides

Amphycorina scalaris

Uvigerina striatissima

Uvigerina pygmaea

Globigerinoides trilobus

Globigerina bulloides

Bolivina arta

Globorotalia acostaensis

Tortoniense

Tortonienne
(probablemente inferior)

26-36-AD-LJ-26.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza margosa arenosa.

Se determinan:

- Ammonia beccarii
- Elphidium crispum
- Nonion boueanum
- Elphidium complanatum
- Globigerinas (pequeñas)
- Globorotalias (pequeñas)

Tortonienne
(por posición estratigráfica)

26-36-AD-LJ-27.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y abundante yeso.

Se determinan:

- Ammonia beccarii
- Cibicides pseudoungerianus
- Nonion granosum
- Reussella spinulosa
- Globigerinas (pequeñas)

Tortonienne
(por posición estratigráfica)

26-36-AD-LJ-28.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Globigerinita glutinata
Cassidulinoides bradyi
Sphaeroidina bulloides
Uvigerina schwageri
Globigerinoides trilobus

Tortoninse

26-36-AD-LJ-29.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Equinodermos
Nonion boueanum
Ammonia beccarii
Valvulineria bradyana
Virgulina schreibersiana
Orbulina universa
Bulimina buchiana
Discorbis orbicularis

Mioceno superior