



17-37-AD-RP - 700

Margas azules al S. De Villa del Río.



17-37-AD-RP 701

Panorámica de la cuesta del Mioceno al S.
de Villa del Río. Abajo aluvial del Guadalquivir.



17-37-AD-RP - 702

Diabasas, en la presa del Salto.



17-37-AD-RP - 703

Otra vista de las mismas diabasas.



17-37-AD-RP-704

Vista del "Paleozoico de la Meseta" des
de la presa del Salto.

17-37-AD-RP-705

Pizarras carboníferas.





17-37-AD-RP-706

Cuarcitas devónicas.

20924



17-37-AD-RP-707

Otra vista del crestón cuarcítico.

17-37-AD-RP-708



Areniscas rojizas
del Mioceno (Facies
de borde).

Vt
di

17-37-AD-RP-709

Afloramiento de
Permotrías.






17-37-AD-RP-710

Aspecto del Permotrías en el arroyo
de la Algamilla.

17-37-AD-RP-711

Afloramiento de
la serie arcilloo
so-cuarcítica
del Devónico.





17-37-AD-RP-712

Otra vista del afloramiento.

+ NO CORTE LOS NEGATIVOS



17-37-AD-RP-713

Vista panorámica de las margas azuladas del Mioceno en la "cuesta".



17-37-AD-RP-715

Paisaje conspicuo de la hoja; al fondo y
a la derecha Porcuna. Cerros de arenis-
cas, cuestas margo arenosas. Valles ta-
pizados por sedimentos cuaternarios.

20



17-37-AD-RP-716

Panorámica de las areniscas de Porcuna desde el puente del arroyo Salado.

Aspecto de las areniscas calcáreas de Porcuna, mostrando estratificación cruzada, realzada por la erosión diferencial.

17-37-AD-RP-718






17-37-AD-RP-720

Bloques de "Tiza" (albarizas), extraídos
de la cantera.

20944

17-37-AD-RP-721

Aspecto de la
cantera.





17-37-AD-RP-722

Vista de las areniscas calcáreas de Porcuna desde la cantera de "Tiza". E



17-37-AD-RP-723

20924

Cantera de losas para
construcción en el
pueblo de Porcuna.

17-37-AD-RP-724

Otro aspecto de
la misma cantera.





17-37-AD-RP-725

Vista desde el extremo S. de la hoja
del Valle del Guadalquivir. Al fondo
el Paleozoico de la Meseta.



17-37-AD-RP-726

Panorámica de la formación de areniscas
y margas miocenas.

Los pequeños escarpes en la cuesta, mar-
can la presencia de gruesos paquetes de
areniscas.



17-37-AD-RP-727

Panorámica de las areniscas calcáreas de Porcuna. Al fondo y a nivel inferior se aprecia el valle formado en el Ollitostro ma.



17-37-AD-RP-728

Afloramiento de Keuper, en las proximida
des del Cortijo Pezcolar.

17-37-AD-RP-729

Detalle del Keuper



17-37-AD-RP-730



Otro aspecto.



17-37-AD-RP-731

Panorámica mostrando las margas moronitoides blancas del Cortijo de Granadillos en contacto con las margas grises del Mioceno superior, a la derecha.



17-37-AD-RP-733

Aforamiento de margas y areniscas terciarias
en el seno del Olistostroma.



17-37-AD-RP-734

Valle del arroyo Saladillo, al S. de Porcuna, labrado en el Olistostroma. Al fondo cerros de arenas andaluzas.