

24-37

ADBA

Todos llevar
"T"

20931

24-37-AD-BA-171.-

Biomicrita arenosa.

Se determinan: Melobesias

Textuláridos

Orbulina

Elphidium

Bolivina

Anomalínidos

Lagénidos

Mioceno medio-superior

24-37-AD-BA-173.-

Intrabiomicrita.

Se determinan: Equinodermos

Nummulites

Alveolinas

Discocyclinas

Operculinas

Melobesias

Eoceno inferior-medio

20931

24-37-AD-BA-174.-

Biosparita.

Se determinan: Radiolarios

Anomalínidos

Textuláridos

Ophthalmididos

Lagénidos

¿Globigerinas?

Ataxophragmiidos

Gypsimidos

Cretácico superior- Eoceno

(posible Paleoceno- Eoceno)

24-37-AD-BA-177.-

Biomicrita.

Se determinan: Praeglobotruncana

Stomiosphaera sphaerica

Lithonella Ovalis

Hedbergella

Bonetocardiella conoidea

Pithonella treioi

Bonetocardiella bética

Cenomanense

(probable Cenomanense)

24-37-AD-BA-180.-

Caliza de aspecto lacustre.

20931

posible Plioceno

(según posición estratigráfica)

24-37-AD-BA-184.-

Biosparita arenosa.

Se determinan: Truncorotalia

Anomalínidos

Chiloquembelina

Globigerinas

Eoceno inferior- medio

(probable Eoceno inferior)

24-37-AD-BA-195.-

Caliza arcillosa.

Se determinan: Globotruncana spp.

Senonense24-37-AD-BA-198.-

Biomicrocrista. Hay formas del Eoceno.

Se determinan: Radiolarios, espículas

Bolivina

Textuláridos

Equinodermos

Globigerinoides?

Orbulinidos

Oligoceno-Mioceno inferior

(probable Burdigaliense superior - Langhiense)

20931

24-37-AD-BA-201.-

Pelmicrita.

Se determinan: Equinodermos
Textuláridos
Globigerinas
Miliolidos
Bolivinas
Radiolarios
Amphisteginas
Nummulites
Discocyclinas
Gypsínidos
Eoceno- Oligoceno

24-37-AD-BA-212.-

Biomicrita.

Se determinan: Lithothamnium
Briozoos
Sphaerogypsina
Lepidocyclina
Miogypsínoides
Heterostegina
Amphistegina
Globigerina
Oligoceno superior - Mioceno inferior

24-37-AD-BA-218.-

Biolithita de Algas Melobesias.

20931

Se determinan: Gasterópodos

Nummulites

Briozoos

Miliólidos

Litnólidos

Ataxophragmiidos

Amphisteginas

Equinodermos

Eoceno o *Mioceno con sedimentación*
*por cráter de campo*24-37-AD-BA-226.-

Biomicrita.

Se determinan: Radiolarios

Globigerinoides?

Globigerinas

Mioceno inferior- medio24-37-AD-BA-232.-

Biopelmicrita.

Se determinan: Briozoos

Lepidocyclinas

Miogypsinas

Sphaerogypsinas

Amphisteginas

Oligoceno superior - Mioceno inferior24-37-AD-BA-233.-

Biomicrosparita.

20931

Se determinan: Briozoos

Globigerinoides

Lepidocyclinas

Textuláridos

Sypsínidos

Mioceno inferior-medio (parte baja)

(probable Mioceno inferior)

24-37-AD-BA-235.-

Biomicrota.

Se determinan: Radiolarios

Bolivinas

Globigerinoides

Miogypsinas

Lepidocyclinas

Amphisteginas

Lagénidos

Mioceno inferior-medio (parte baja)

(probable Mioceno inferior)

24-37-AD-BA-239.-

Hay resedimentación del Eoceno.

Se determinan: Equinodermos

Briozoos

Elphidium

Amphisteginas

Lithothamnium

Miogypsinas?

20931

Lepidocyclinas?

Globigerinoides

Sphaerogypsina

Mioceno inferior-medio (parte baja)

24-37 AD-BA 246.-

Se determinan:

Radiolarios

Stomiosphaera sphaerica

Hedbergella

Bonetocardiella conoidea

Calcisphaerula innominata

Pithonella ovalis

Albense-Cenomanense

24-37 AD-BA 250.-

Se determinan:

Lamelibranquios

Hedbergellas

Heterohelix

Stomiosphaera

Cretácico superior

24-37 AD-BA 251.-

Se determinan:

Operculinas

Amphisteginas

Heterosteginas

Textuláridos

¿Eulepidina?

probable Oligoceno

24-37 AD-BA 252.-

Micrita.

Radiolarios

Lamelibranquios

Edad indeterminada

20931

24-37 AD-BA 259.-

Biomicrita.

Se determinan:

espículas

Radiolarios

Globorotalias

Globigerin^{ap}ídes?

Globigerinas

Orbulínidos

Terciario *Eoc. Sup.*
~~(probable Mioceno)~~

24-37 AD-BA 262.-

Biomicrita.

Se determinan:

Lamelibranquios

Ostrácodos

Radiolarios

Lagénidos

Globorotalias *subobesus*

Globigerinas

20931

Bolivinas

Miliólidos

Globigerinoides??

Terciario *Eol. sup.*

~~(posible Mioceno??)~~

24-37 AD-BA 297.-

Dolosparita.

No se observan restos fósiles

Edad indeterminada

(probable Jurásico)

24-37 AD-BA 379.-

Micrita

Se determinan:

Radiolarios

filamentos (abundantes)

probable Dogger

24-37 AD-BA 286.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza algo arenosa.

20931

Se determinan:

Globorotalia sp. (*Truncorotalia*)

Globigerina sp.

Paleoceno-Ilerdiense

24-37 AD-BA 287.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y caliza arcillosas.

Se determinan:

Globorotalia angulata

Globorotalia aff. *hispidicidaris*

Paleoceno-Ilerdiense

24-37 AD-BA 288.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globorotalia cf. *pseudomenardii*

Globorotalia aff. *velascoensis*

Paleoceno superior-Ilerdiense
(probable Ilerdiense)

24-37 AD-BA 289.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Nummulites spp.

Operculina

Globorotalia formosa

20931

Globigerina aff. boweri

Discocyclina

Globorotalia pseudotopilensis

Cuisiense-Luteciense inferior

(probable Cuisiense)

24-37 AD-BA 293.-

El residuo de levigación es escasísimo, observándose solamente algunos Radiolarios y pequeñas Globigerinas.

Edad indeterminada24-37 AD-BA 294.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Hay escasísimas Globorotalias terciarias entre la fauna.

Se determinan:

Radiolarios esféricos

Dictyomitra

Ammodiscus tenuissimus

Hedbergella planispira

Marssonella cf. trochus

Cretácico

(facies del Aptense-Albense, pero puede ser más alto y aún terciario)

24-37 AD-BA 395.-

Biomicrota.

de ser levigado

Se determinan:

Amphisteginas

Lepidocyclinas

Miogypsinas?

Globigerinas

Oligoceno superior-Mioceno inferior

20931

24-37 AD-BA 290.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globorotalia loeblichii

Globorotalia aragonensis

Globigerina soldadoensis angulosa

Cuisiense-Luteciense inferior

(probable Cuisiense)

24-37 AD-BA 292.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Globotruncana calcarata

Globotruncana elevata

Campaniense

24-37-AD-BA-250.-

Filamentos(abundantes)
Pithonella ovalis
Hedbergella
Heterohelix
Globotruncana fornicata
Globotruncana "ex.grege" linneiana
Rugoglobigerina
Globotruncana cf. cretacea
Senoniense inferior probable

24-37-AD-BA-253.-

Filamentos
Crinoideos
Ostrácodos
Lagónidos
Stomiosphaera
Radiolarios
Saccocoma(?)
Secciones que parecen a Pithonella ovalis
Dogger con muchas reservas, debido
a la posible reserva de Pithonella

24-37-AD-BA-267.-

Heterohelix
Hedbergella
Globotruncana fornicata
Globotruncana "ex grege" linneiana

20931

Globotruncana cf. plicata (?)Senoniense24-37-AD-BA-270.-

Radiolarios

Praeglobotruncana cf. stephani (?)*Rotalipora cf. reicheli**Praeglobotruncana cf. turbinata**Rotalipora cf. greenhornensis*Cenomanense superior24-37-AD-BA-271.-

Radiolarios

*Hedbergella**Rotalipora cf. greenhornensis**Praeglobotruncana af. stephani* (?)*Globigerinelloides*Cenomanense superior24-37-AD-BA-346.-

Miliólidos

Textuláridos

Lituólidos

Discórbidos

Rotálidos

Peneroplis

Amphistegina

Equinodermos

Algas

Operculina

Nummulites

Austrotrillina

Eoceno-Oligoceno

20931

24-37-AD-BA-348.-

Radiolarios
 Globigerinas
 Globorotalias
 Globorotalias (Truncorotalias)

Paleoceno-Eoceno inferior
 (probable Paleoceno)

24-37-AD-BA-356.-

Equínidos
 Rotálidos s. l.
 Amphistegina
 Briozoos
 Gypsina
 Miolepidocyclina
 Lepidocyclina
 intraclastos del Cretácico superior
 Globigerínidos
 Operculina
 Lagénidos
 Lituólidos

Oligoceno superior-Mioceno inferior

24-37-AD-BA-364.-

Puré de Equinodermos
 Lagénidos (Lenticulina)
 Glomospira
 Lingulina (?)

Lías superior (?)

24-37-AD-BA-384.-

Fronicularia cf. ~~wardi~~ *wardi*

Muschelkalk

20931

24-37-AD-BA-396.-

Radiolarios

Globigerinas

Globorotalia cf. angulata (?)

Globorotalia uncinata (?)

Paleoceno superior probable24-37-AD-BA-400.-

Puré de Equinodermos

Lenticulina

Lingulina

Glomospira

Lías superior24-37-AD-BA-403.-

Melobesias

Equínidos

Discocyclinas

Briczoos

Operculina

Heterostegina

Lepidocyclina

Rotalia spp.

Muestra muy parecida a la 356.

Mioceno inferior-Oligoceno inferior
con resedimentaciones (?) del Eoceno24-37-AD-BA-406.-

Radiolarios

Hedbergella

Globotruncana fornicata

Globotruncana cf. imbricata

Globotruncana cf. angusticarinata

posible Coniaciense

24-37 AD-BA 258.-

Lepidocyclinas

Miogypsínidos

Sphaerogypsina

Oligoceno superior-Mioceno inferior

24-37 AD-BA 263.-

Melobesias

Amphisteginas

Heterosteginas

Bolivinas

Equinodermos

Probable Mioceno

(hay resedimentación del Eoceno)

24-37 AD-BA 363.-

Filamentos (abundantes)

probable Dogger

24-37 AD-BA 365.-

Filamentos (abundantes)

probable Dogger

24-37 AD-BA 387.-

Lepidocyclinas

Miogypsínidos

Amphisteginas

Elphidium

Mioceno inferior-medio (parte baja)

Albina fulva 962

20931

24-37 AD-BA 408.-

Biomierita arenosa.

Se determinan:

Briozoos

Lithothamnium

Equinodermos

Amphisteginas

Anomalínidos

Elphidium

probable Mioceno

20931

24-37 AD-BA 283.-

Globotruncana linneiana

Globotruncana fornicata

Globotruncana arca

Globotruncana havanensis

Globotruncana rosetta

Globotruncana cf. plummerae

Campaniense

20931

24-37-AD-BA-398.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Ticinella roberti

Biticinella breggiensis

Planomalina buxtorfi

Albense superior.

24-37-AD-BA-397.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Ticinella roberti

Planomalina buxtorfi

Biticinella breggiensis

Albense superior.

Almoria Informe 9/15

73.

20931

24-37-AD-BA-407.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globorotalia mayeri

Globorotalia aff. acostaensis

Globorotalia miozea

Globigerina nepenthes

Uvigerina tenuistriata gaudryinoides

Nodosaria raphanistrum

Globigerinoides trilobus

Bolivina arta

Globorotalia acrostoma

Helvetiense superior-Tortonense

20931

24-37 AD-BA 381.-

Biomicrita.

Se determinan:

Radiolarios

Bonetocardiella conoidea

Stomiosphaera sphaerica

Hedbergellas

Pithonella ovalis

Albense-Cenomanense24-37 AD-BA 383.-

Biomicrita.

Se determinan:

Radiolarios

Heterohelix

Globotruncana linneiana

Stomiosphaera sphaerica

Hedbergella

Coniaciense superior-Campaniense24-37 AD-BA 385.-

Biomicrita.

Se determinan:

Radiolarios

Praeglobotruncana turbinata

Hedbergellas

Heterohelix

Cenomanense superior-Turonense

24-37 AD-BA 386.-

20931

Biomicrita.

Se determinan:

Radiolarios

Hedbergellas

Globotruncana linneiana

Heterohelix

Coniaciense superior-Campaniense