

14-38 AD-HE 202.-

Biosparita.

Se determinan:

Lithothamnium

Briozoos

Orbulinas

Heterosteginas

Globigerinas

Globorotalias

Elphidium crispum

Textuláridos

Mioceno medio-superior14-38 AD-HE 203.-

Intrabiomicrita arenosa.

Se determinan:

Lithothamnium

Briozoos

Heterosteginas

Textuláridos

Sphaerogypsinas

Globigerinas

Equinodermos

Dentalium

Mioceno medio-superior

20942

14-38 AD-HE 205.-

Intrabiomicrota.

Se determinan:

Lithothamnium

Briozoos

Textuláridos

probable Mioceno medio-superior

20942

907

14-38 AD-HE 212

El residuo de levigación está formado por trozos de mar-
ga.

Se determinan:

Cassidulina laevigata
Orbulina universa
Orbulina suturalis
Ehrenbergina alicantina
Sphaeroidinellopsis seminulina
Globigerinoides trilobus
Bolivinoides miocenicus
Globigerinoides obliquus
Planulina ariminensis
Amphycorina scalaris
Tortoniense-Andaluciense

14-38 AD-HE 213

El residuo de levigación está formado por trozos de mar-
ga y material diverso incluso de tipo metamórfico.

Se determinan:

tubos calizos de Algas
Orbulina universa
Orbulina suturalis
Cassidulina laevigata
Globigerinoides obliquus
Sphaeroidinellopsis seminulina
Tortoniense-Andaluciense
(puede haber resedimentación)

20942

14-38 AD-PE 35 Caliza de Crinoides

Edad indeterminada

20942

14-38 AD-PE 314 ↓

El residuo de levigación contiene abundante cuarzo y algo de yeso.

Se determinan:

Ammonia beccarii

Bulimina fusiformis

Globigerinoides obliquus

Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides

Bolivina arta

Orthomorphina tenuicostata

Bolivina alata

Orbulina suturalis

Andaluciense

14-38 AD-PE 315 ↓

El residuo de levigación está formado por trozos de margas y algo de cuarzo y yeso.

Se determinan:

Nonion boueanum

Bolivina arta

Cassidulinoides bradyi

Globigerinoides obliquus extremus

Bulimina buchiana

Bulimina fusiformis

Orthomorphina tenuicostata

Uvigerina tenuistriata siphogenerinoides

Andaluciense