S3P

Fig. 11

Nº HOJA 12-39 NOMBRE ALCALA DEL RIO PROVINCIA SEVILLA

GRUPO DE TRABAJO: INIMA NOMBRE LOCAL: CENTRAL HIDROELECTRICA DE GUILLENA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: SERIE Nº 01

COORDENADAS x: 417500 y: 754200 z: | x: 417550 y: 754350 z:

FECHA OCTUBRE 1996

CROQUIS

LOCALIZACION




| RELIEVE | MUESTRAS / POTENCIA | REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES) | PETROGRAFIA ARENAS | ANALISIS CUANTITATIVOS | TRAMOS | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA | AMBIENTE SEDIMENTARIO | UNIDADES ESTRATIGRAFICAS | | | | UNIDADES CARTOGRAFICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LITOESTRATIGRAFICAS | | CRONOESTRATIGRAFICAS | | |
| | | | | | | | | MIEMBRO | FORMACIONASIMILABLE | PISO | SUBSISTEMA | ESCALA 1:50.000 MAGNA |




Acúmulos multisecuenciales de secuencias grano decrecientes con un término inferior en areniscas de grano medio gradado con laminación hummocky (H.C.S.) en paso a lutitas con linsen flaser y lutitas grises bioturbadas.
Las secuencias varían de orden decimétrico a centimétrico. En estas últimas, las areniscas son de grano fino y sólo presentan laminación paralela.
El acúmulo multisecuencial se estructura en una megasecuencia grano y estrato creciente.
Es reseñable que en la fracción lítica de estas areniscas hay granos con estructuración previa.

ROCA BÁSICA

Secuencias centimétricas gradadas con H.C.S.

ROCA BÁSICA

Secuencias centi a decimétricas gradadas con H.C.S. y relación arena-pelítica de 3/2 a 3/1.

Areniscas (litarenitas) de grano medio en capas decimétricas amalgamadas con retoque de ola a techo.

PLATAFORMA EXTERNA | P - Q | DEVONICO | DEVONICO | 7