Nº HOJA: 11-44 (1.047) NOMBRE: SANLUCAR DE BARRAMEDA PROVINCIA: CADIZ

AUTOR (S) INGEMISA (NG) NOMBRE LOCAL: PLAZA DE TOROS DE SANLUCAR DE B.

IDENTIFICACION DE MUESTRAS SERIE Nº 1

COORDENADAS	X = 367.505	X = 367.565
	Y = 246,350	Y = 246,360
	Z =	Z =

FECHA: MARZO 1.985

CROQUIS



LOCALIZACION

Talud que hay junto a la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda.



Nº HOJA: 11-44 (1.047) NOMBRE: SANLUCAR DE BARRAMEDA PROVINCIA: CADIZ

AUTOR (S) INGEMISA (NG)

NOMBRE LOCAL: PUNTA DEL ESPIRITU SANTO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS

SERIE Nº 2

COORDENADAS		
	X = 364,700	X = 364,800
	Y = 245,485	Y = 245,585
	Z =	Z =

FECHA: MARZO 1.985

CROQUIS



LOCALIZACION

En playa de Sanlúcar de Barrameda.



FOTOS MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAC. SEDIMENTAR.		COMPONENTES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interés bioestratigrático)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				UNIDADES CARTOG.
		ESTRAT	ORDEN INTERNO	INTRAC. OOLITO. FOSILES PELETS. OTROS	MUDST WACK PACK GRAIN BOUNS. RECRIS. DOLOM.	BIOTURBACION	SIMBOLOS						LITOESTRATIGRAFICA MIEMBRO	LITOESTRATIGRAFICA FORMACION O ASIMILABL.	CRONOESTRATIGRAFICA PISO	CRONOESTRATIGRAFICA SUBSISTEMA	ESCALA 1:50.000 MAGNA
										Arenas finas rojo-amarillentas bioturbadas por raices (grises en esas zonas).		FLUVIAL			PLIO-CUATERNARIO		
										Arenas gris verdosas con restos de bivalvos		CANAL MAREAL COMPLEJO (EN ZONA SUBMAREAL)			PLIOCENO	MESSINENSE SUPERIOR	
RG-9018 RG-9032										Areniscas muy cementadas grises con chlamys pecten y ostreas. Cantos blandos.							
										Margas gris-azuladas arenosas a techo.		MAR ABIERTO PLATAFORMA			MIOCENO		

Nº HOJA: 11 - 44 (1.047) NOMBRE: SANLUCAR DE BARRAMEDA PROVINCIA: CADIZ

AUTOR (S) INGEMISA (NG) NOMBRE LOCAL: PUNTA DE MONTIJO A CHIPIONA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS SERIE Nº 3

COORDENADAS	X = 358.657	X = 361,500
	Y = 241,250	Y = 243,532
	Z =	Z =

FECHA: MARZO 1.985

CROQUIS



LOCALIZACION

Playa de Chipiona.

FOTOS MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAC. SEDIMENTAR.		COMPONENTES		CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interés bioestratigráfico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				UNIDADES CARTOG.
		ESTRAT	ORDEN INTERNO	INTRAC. OOLITO FOSILES PELETS.	OTROS	MUDST WACK PACK GRAIN BOUNS RECRIS DOLOM	BIOTURBACION	SIMBOLOS						LITOESTRATIGRAFICA: MIEMBRO	LITOESTRATIGRAFICA: FORMACION O ASIMILABLE	CRONOESTRATIGRAFICA: PISO	CRONOESTRATIGRAFICA: SUBSISTEMA	ESCALA 1:50.000 MAGNA
											Arenas arcillosas rojas con cantos de cuarzo Karstificación. Conglomerados y arenas conchíferas. Calcarenitas. Bioturbación y laminación paralela en calcarenitas. Facies ostionera. Arenas amarillas con bioturbación horizontal. Cementación de niveles arenosos por diagénesis. Arenas amarillas con niveles más cementados.		LITORAL SUBLITORAL COSTERO BARRA MAREAL SUBLITORAL SUBLITORAL GLACIS			PLEISTOCENO — INFERIOR Y MEDIO — SUPERIOR		

Nº HOJA: 11-44 (1.047) NOMBRE: SANLUCAR DE BARRAMEDA PROVINCIA: CADIZ

AUTOR (S) INGEMISA (NG) NOMBRE LOCAL: ARROYO HONDO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS SERIE Nº 4

COORDENADAS	X = 362,565	X = 362,565
	Y = 235,285	Y = 235,450
	Z =	Z =

FECHA: MARZO 1.985

CROQUIS



LOCALIZACION

Borde sur de la hoja de Sanlucar 2 Km al E de la linea de costa. Arroyo Hondo.

FOTOS MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAC. SEDIMENTAR.		COMPONENTES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interés bioestratigrático)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				UNIDADES CARTOG.
		ESTRAT.	ORDEN INTERNO	INTRAC. OOLITO. FOSILES PELETS. OTROS	MUDST WACK. PACK. GRAIN. BOUNS. RECRIS. DOLOM.	BIOTURBACION	SIMBOLOS						LITOESTRATIGRAFICA: MIEMBRO	LITOESTRATIGRAFICA: FORMACION O ASIMILABL.	CRONOESTRATIGRAFICA: PISO	CRONOESTRATIGRAFICA: SUBSISTEMA	ESCALA 1:50.000 MAGNA
										Arenas arcillosas rojas con cantos de cuarzo. Glacis.		GLACIS			PLEISTOCENO	INFERIOR	
										Karstificación. Conglomerados y arenas conchíferas.		MARINO SUBLITORAL CON MAREAS			PLIOCENO SUPERIOR		
										Alternancia de niveles de arena de espesor variable y niveles finos (5 cm arenosos cementados).							
										Conglomerados.							
										Rizocrecciones niveles bioturbados más cementados.							
										Nódulos carbonatados.							