



Fot. 1.- Panorámica general desde M^{ña} Mina, de la zona centro-meridional de la hoja, donde se aprecia la morfología llana y homogénea de los malpaíses cuaternarios, regularizados por recubrimientos detríticos y la actividad antrópica.
Autor: J.L. Barrera

Edad: Cuaternario

• PASA A LA HOJA DE TEGUISE (1082 IV) POR ESTÁR FUERA DE PLANO.



Fot.10.- Aspecto de las partes internas de las coladas de los malpaíses cuaternarios de la alineación Guardilama-M^{na} Blanca.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot.11.- Depósitos fosilíferos pertenecientes a la rasa marina erbanense, en Playa Honda.
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot.12.- Aspecto general de la rasa marina actual en Punta Lima, labrada sobre coladas basálticas de la alineación Gritana-Bermeja.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot.13.- Vista general de Playa Blanca, en Puerto del Carmen.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot.14.- Malpais de coladas basálticas escoriáceas y muy fragmentadas en bloques, pertenecientes al ramal de las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36), que se canalizó hacia Arrecife.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot.15.- Aspecto interno de las coladas basálticas históricas de las erupciones de Timanfaya (1730-36) al NE de Arrecife, con disyunción columnar y base plana. Se apoyan sobre depósitos arenoso-arcillosos.

Autor: J.L. Barrera

Edad: Mioceno



Fot. 2.- Relieves miocenos aislados (restos del paleopacantilado plioceno) en la zona de Pico Tegala y Morro de Molina, al sur de Tías, rodeados por malpaíses cuaternarios de la alineación Guardilama-M^{na} Blanca. Al fondo se observan los edificios La Guardilama (G), Caldera Gaida (CG), La Montañeta (M), M^{na} Tesa (T) y M^{na} Blanca (B). En primer término una depresión rellena de depósitos aluviales.
 Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 3.- Cantera en explotación en los Roferos, donde se observan las potentes coladas basálticas miocenas del período de 6,0 m.a.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 4.- Coladas basálticas miocenas del periodo de 6.0 m.a, en una cantera en explotación al sur de Güime. Encima se apoyan arenas eólicas pliocenas y depósitos piroclásticos de dispersión cuaternarios.

Autor: J.L. Barrera

Edad: Mioceno



Fot. 5.- Dunas pliocenas consolidadas, adosadas a los relieves miocenos al sur de Güime,
Autor: R. Balcells

Edad: Plioceno



Fot. 6.- Estratificación cruzada en los depósitos de arenas eólicas pliocenas en el barranco de M^{na} Blanca.

Autor: R. Balcells

Edad: Plioceno



Fot. 7.- Panorámica desde Mña Mina, en la que se observa el área de San Bartolomé, junto a diversos edificios volcánicos cuaternarios: Mña Bermeja (B), Mña Blanca (BL), Mña Guatisea (G), Caldera Honda (H), Mña Tizalaya (T), Mña Tamia (TM) y Lomo San Andrés (LS). En primer término se aprecian los recubrimientos de arenas cólicas.
 Autor: R. Balcells

Edad: Mioceno

.PASA A LA HOJA DE TEGUISE (1082 IV) POR ESTÁR FUERA DE PLANO.



Pot. 8.- Edificio cuaternario M^ª Guatisea, perteneciente a la alineación Guardilama-M^ª Blanca.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 9.- Piroclastos de dispersión junto al edificio M^{ña} Blanca cubiertos por arenas
eólicas pleistocenas.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario