



Fotografía 1.- Panorámica del acantilado costero en la zona del Paso de la Burra, donde se observa el Complejo Basal (CB) en la zona inferior y, encima, los sedimentos de la rasa marina pliocena (R) fosilizados por coladas basálticas pliocenas procedentes del volcán de la Ventosilla. TERCARIO



Fotografía 10.- Panorámica general de los relieves típicos del Complejo Basal en la zona oriental de la Hoja. **TERCIARIO**



Fotografía 11.- Arenas eólicas recientes en la desembocadura del barranco de Esquinzo adosadas al acantilado costero. CUATERNARIO



Fotografía 12.- Aspecto más detallado de la fotografía anterior. CUATERNARIO



Fotografía 2.- Discordancia erosiva (d) entre el Complejo Basal (C.B.), en la parte inferior, y sedimentos de la rasa marina pliocena, en el Barranco de Esquinzo. Las coladas basálticas superiores (c), son de edad pliocena y proceden -- del volcán de La Ventosilla. Plioceno



Fotografía 3.- Detalle del Complejo Basal en la Playa del Tebeto, donde se observan melteigitas con venulación sienítica y abundante fisuración. Terciario



Fotografía 4.- Acantilado costero en la zona de Playa del Aguila, en donde se aprecian las coladas basálticas miocenas, en la parte inferior, y las coladas basálticas pliocenas del volcán la Ventosilla en la superior. El nivel de color claro intermedio corresponde a los sedimentos de la rasa marina pliocena (R). **PLIOCENO**



Fotografía 5.- Panorámica del "planchón" traquítico de la zona del Tebeto. MIOCENO



Fotografía 6.- Panorámica de la costa occidental de Fuerteventura, desde la playa del Tebeto (en primer término) hacia el norte. Se observa la enorme continuidad de la colada pliocena (c) a lo largo de toda la costa y su disposición horizontal sobre la antigua plataforma de abrasión de la rasa pliocena (R). En la parte inferior melteigitas e ijolitas del Complejo Basal (CB). Plioceno



Fotografía 7.- Aspecto más detallado de la fotografía anterior donde se aprecia la rassa pliocena (R), la colada basáltica de La Ventosilla (c), y el Complejo Basal (CB). Plioceno



Fotografía 8.- Panorámica semejante a las anteriores en la que se pone de manifiesto los depósitos de caliche (Ca) sobre la colada basáltica pliocena. Debajo, pequeño escarpe de la rasa pliocena (R) sobre las melteigitas e ijolitas del Complejo Basal (CB). Playa del Tebeto. Plioceno



Fotografía 9.- Arenas eólicas de la rasa pliocena fosilizadas por coladas basálticas del volcán La Ventosilla, en la ladera norte del Barranco de Esquinzo.

PLIOCENO