



Fot.1.- Vista general de los apilamientos lávicos miocenos en los barrancos de la Guancha (G) y del Cabrito (C). En las partes superiores existen planchones de emisiones pliocenas (P).

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno.



Fot.10.- Resto erosivo de lavas pliocenas, en la cabecera del barranco del Revolcadero.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Plioceno.



Fot.11.- Intrusivo traquítico de Seima.

Fotografia: R.Balcells

Edad: Mioceno.



Pot.12.- Tobas piroclásticas sálicas procedentes del intrusivo de Seima. En la parte superior hay coladas basálticas pliocenas.

Fotografía: R. Balcells


Edad: Mioceno.



Fot.13.- Detalle de la brecha explosiva asociada a la intrusión traquítica de Seima.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno.




Fot. 14.- Intrusivo traquítico atravesando materiales miocenos (M) y pliocenos (P) entre los barrancos de La Guancha y El Cabrito. A la derecha se observa una potente colada traquítica (T).

Fotografía: R. Balcells

Edad: Plioceno.

• ESTA FOTOGRAFÍA PASA A LA HOJA (1097 I-II) SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA. POR ESTAR FUERA DE PLANO.



Fot.15.- Intrusivo traquítico de la fotografía anterior, atravesando coladas basálticas
pliocenas (P).

Fotografía: R.Balcells

Edad: Plioceno.

• ESTA FOTOGRAFÍA, PASA A LA HOJA DE SAN SEBASTIÁN
DE LA GONERA (1097 I-II) POR ESTAR FUERA DE PLANO.



Fot.16.- Coladas basálticas tardías de edad pliocena, cayendo al barranco de El Guincho.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Plioceno.



Fot.17.- Pequeña colada "intracanyon" (I) de edad pliocena, adosada a la ladera norte del barranco del Negro, constituida por coladas miocenas (M), en la parte inferior, y pliocenas en la superior (P).

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno y Plioceno.



Fot.18.- Detalle de la colada basáltica "intracanyon" de la fotografía anterior.

Fotografía: R.Balcells


Edad: Plioceno.



Fot.19.- Potente colada basáltica "intracanyon" relleno del antiguo cauce del barranco del Revolcadero.

Fotografía: R. Balcells

Edad: Plioceno.



Pot.2.- Vista del barranco del Cabrito, excavado en coladas basálticas miocenas. En primer término espigones de una potente colada traquítica (T) y detrás, el intrusivo traquítico de Roque Blanco (RB).



Fot.3.- Aspecto de las coladas basálticas miocenas en las laderas del barranco de La Guancha.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno.



Fot.4.- Relieve erosionado en los materiales basálticos miocenos, en la playa de Oroja.
En primer término, el roque de Oroja, un resto erosivo de coladas basálticas
pliocenas.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno y Plioceno.



Fot.5.- Vista de la desembocadura del barranco del Negro y de la Guancha, donde se observan las emisiones pliocenas (P), recubriendo discordantemente los apilamientos lávicos miocenos (M).

Fotografía: R. Balcells

Edad: Mioceno y Plioceno.



Fot.6.- Barranco de la Sabina Redonda, excavado en materiales miocenos (M). Las partes superiores de los interfluvios están constituidos por lavas pliocenas (P).

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno y Plioceno.



Fot.7.- Potente colada traquítica (T), emitida desde el domo Ancón de Minguama, sobre coladas basálticas miocenas (M).

Fotografía: R.Balcells

Edad: Mioceno.



Pot.8.- Vista general de los relieves meridionales de la hoja, formados por materiales lávicos pliocenos.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Plioceno.



Fot.9.- Barranco de El Guincho, excavado en materiales pliocenos. Se observan emisiones más tardías discordantes, también pliocenas.

Fotografía: R.Balcells

Edad: Plioceno.