




17-06-AD-MR-2201.- Turbiditas de la Formación Perapertú
B-B₂.
(Has₂₁₋₂₂). .



17-06-AD-MR-2202.- Bloques calcáreos (Hc_{21-22}^{B-3}) de la Formación Perapertú, incluidos en las turbiditas (Has_{21-22}^{B-3}), formadas por lutitas con intercalaciones delgadas de areniscas.



17-06-AD-MR-2203. - Detalle de los conglomerados de la Forma-
ción Carmen (Hag^{B-3}_{22-2B}).



17-06-AD-MR-2204. - Grauvacas masivas de la Formación Carmen
(^{B-2} Hs 22-2B)




17-06-AD-MR-2205.- Turbiditas de la Formación Carmen, formadas por lutitas con delgadas intercalaciones areniscosas (Hgs ⁶⁻⁸ 22-28)



17-06-AD-MR-2206. - Lutitas de la Formación Carmen (Hp^{B-3}₂₂₋₂₅)




17-06-AD-MR-2207. - Conglomerados de Curavacas (H_c^{B3-32}_{22-2c})
con matriz lutítica.



17-06-AD-MR-2208. - Conglomerado poligénico de Curavacas

(H⁹³⁻³²_{22-2C})

) con matriz grauváquica.



17-06-AD-MR-2209. - Turbiditas de la Formación Vañes (H₂₅^{B3-B1}₂₂₋₂₀). .




17-06-AD-MR-2210. - Laminación cruzada en niveles C de las turbiditas de la Formación Vañes (Hqs ^{B3-B1} 22-20).



17-06-AD-MR-2211.- Estratificación cruzada en turbiditas de la
Formación Vañes (83-191 Hqs 22-20).



17-06-AD-MR-2212.- Flute casts en muros de areniscas. Turbiditas de la Formación Vañes ($\beta_3-\beta_1$ $H_{25}22-20$).



17-06-AD-MR-2213. - Niveles de calizas ($H_{c_{24-20}}^{B-3}$) interestratificadas en las turbiditas de la Formación Vañes ($H_{cs_{22-20}}^{B3-B1}$).