



03-07/GP/PM-715.

Ortoneis glandular ($_{NG}\gamma_{mb}^1$) migmatizado.



03-07/GP/PM-716.

Granodiorita precoz con megacristales
(${}^b\gamma\eta^2$) banda estrecha en el SE de la hoja.



03-07/GP/PM-717. ,

Idem anterior en contacto con el granitoi-
de migmatítico ($\gamma\psi^2$).



03-07/GP/PM-720.

Estructura "layered" en migmatitas
(PC-Se - $\gamma\psi^2$).



03-07/GP/PM-721.

Idem anterior.



03-07/GP/PM-722.

Esquisto (PC-Se) muy migmatizado



03-07/GP/PM-726.

Sillimanita en los restitos del granitoide
migmatítico ($\gamma\psi^2$).



03-07/GP/PM-728.

Esquisto (PC-Se) migmatizado



03-07/GP/PM-731.

Esquistos (PC-Se) muy migmatizados



03-07/GP/PM-732.

Esquistos (PC-Se) muy migmatizados



03-07/GP/PM-733.

Ortoneis glandular ($_{NG}\gamma_{mb}^1$) migmatizado.



03-07/GP/PM-734.

Aspecto del granitoide migmatítico ($\gamma\psi^2$)
de origen, ortoneis glandular ($_{NG}\gamma_{mb}^1$)



03-07/GP/PM-735.

Aspecto del ortoneis con anfíbol ($N\gamma_A^1$).

03-07/GP/PM-738.

Contacto entre los ortoneis con anfíbol
($N\gamma_A^1$) y los metasedimentos (PC-CA) del
"Complejo de Noya"





03-07/GP/PM-739.

Enclave de los metasedimentos (PC-CA) del
"Complejo de Noya" en el ortoneis con an-
fíbol (γ_A^1).



03-07/GP/PM-741.

Cantera en el ortoneis biotítico (N_b^1). Bas
tantes niveles de anfibolita (ξA) concordan
te con la foliación de éste.



03-07/GP/PM-742.

Paraneíses (PC-CA) del "Complejo de Noya".



03-07/GP/PM-745.

Ortoneis glandular ($_{NB}\gamma_{mb}^1$).



03-07/TC/DR-378.

Al lado de la anterior. El filón de ortoanfibolita es intrusivo en los neises biotí-



03-07/TC/DR-379.

Neis glandular muy migmatizado ($_{NG} \gamma^1_{mb}$), se ven niveles (sin glandulas) que parecen provenir de metasedimentos.



03-07/TC/DR-380.

En la parte superior granito Ruña facies con
 megacrístales ($_{p2-3}\gamma^2_{mb}$), y en la parte infe-
 rior facies fina ($_{n3-4}\gamma^2_{mb}$)



03-07/TC/DR-381.

Granito Ruña facies de megacrystales (típica) (γ_{mh}^2)



03-07/TC/DR-411.

Granito de Ruña con megacristales ($p_{2-3} \gamma_{mb}^2$)
Facies típica orientación de flujo.