ALBUM DE FOTOGRAFIAS.
HOJA DE BENASQUE. 180

INDICE DE FOTOGRAFIAS:

Fotografía 1:

El circo de Castanesa desde su desembocadura por el rio Baliera. Al fondo el pico de Castanesa constituido por pliegues en las formaciones de la serie "Sierra Negra". Desde la confluencia de los cauces (barranco de Basibé y rio Baliera), en la parte inferior central de la foto, se puede recorrer, por el margen derecho del rio, la serie de las formaciones Aneto y Gelada; afloramientos anteriormente atribuidos al Ordoviciano.

Fotografía 2:

El circo de Castanesa desde las proximidades del collado de Basibé. En la línea del horizonte y desde el Oeste hacia el Este: Pico Castanesa, granito de La Maladeta a lo lejos, pico de Vallibierna, y cresta divisoria de aguas entre los circos de Castanesa y Llausét.

Fotografía 3:

Al fondo granito de las cumbres del macizo de La Maladeta. En segundo plano, las ampelitas del Siluriano de la Sierra Negra y pico de Vallibierna en calizas del Devoniano Inferior.

Fotografía 4:

Parte Oriental del circo de Castanesa desde su entrada meridional.

Fotografía 5:

Prolongación, hacia el Norte, de la panoramica anterior.

Fotografía 6:

El circo de Llausét desde las cercanias del collado de Salinas, divisorio con el circo de Castanesa.
En frente, el Siluriano y Devoniano de la serie "Sierra Negra" entre el barranco de Llausét a la izquierda y el valle del Noguera Ribagorzana a la derecha. Al fondo norte los granitos de los macizos de La Maladeta, a la izquierda, y de Bohí, a la derecha.

Fotografía 7:

Margen oeste del valle del Noguera Ribagorzana.
Los afloramientos de color amarillo están constituidos por las facies brechoides con escapolitas sobre las que viene el cabalgamiento alpino de la unidad "Sierra Negra".

Fotografía 8:

Flanco sur del pico Muñidó. En color amarillo sendos sinclinales de la formación D_2 entre materiales del D_1.

Fotografía 9:

Continuación de los pliegues de la fotografía nº8 hacia el Este, margen Oeste del valle del Noguera de Tort.

Fotografía 10:

La línea del horizonte es la divisoria de aguas entre el rio Noguera Ribagorzana y el rio Noguera de Tort. De Sur a Norte: Pico Gelada (2.452 m.) en serie del Devoniano tipo "Baliera", collado Gelada (2.075 m.) por donde pasa el cabalgamiento alpino de la Unidad tipo "Sierra Negra", cresta hasta el macizo del pico Muñidó (2.650 m.) en pliegues del Devoniano, granito del pico Bizberri (2.951 m.) del macizo de Bohi. En el fondo valle del rio Noguera de Tort; en su margen Oeste, masa granodiorítica de Barruera (2.053 m.), y en su margen Este, el pueblo de Castell. (FUERA DE ZONA)

Fotografía 11:

Pico de Basibé (con nieve), visto desde el NNW al subir al pico Castanesa. Pliegues de interferencia sobre el conjunto de un flanco inverso de estructura principal.

Fotografía 12:

El pico de Basibé visto desde el Oeste. Serie invertida de la formación Basibé.

Fotografía 13:

La margen derecha del valle del Noguera Ribagorzana donde el barranco de Estet, desde el lado opuesto del valle. A la derecha de la foto se ve el cabalgamiento del Devoniano sobre el conjunto de Bono.

Fotografía 14:

Vista sobre la margen izquierda del Noguera Ribagorzana donde las explotaciones de la mina de El Cierco (Bono).

Fotografía 15:

Deslizamiento de ladera en la margen izquierda del rio Noguera Ribagorzana enfrente de Forcat.

Fotografía 16:

Tomada en dirección Oeste. Cortejo de diques de pórfido en el rincón suroriental de la Hoja. *(FUERA DE ZONA)*

Fotografía 17:

Prolongación de la vista anterior, hacia el Este. El pico Gelada en la parte derecha de la foto. *(FUERA DE ZONA)*

Fotografía 18:

Mirando en dirección Oeste. El pueblo de Erill Aval y, encima, la roca ignea (pórfido granodiorítico) del monticulo con vegetación. Rasa de material morrenico, a la derecha. Al fondo, el pico Gelada. *(FUERA DE ZONA)*

Fotografía 19:

Parte alta del valle del Noguera Ribagorzana, al Oeste de la entrada del tunel de Viella. Rasa de morrena reciente en la ladera de enfrente. *(NO SITUADA)*

FIN.



Fotografía 1:

El circo de Castanesa desde su desembocadura por el rio Baliera. Al fondo el pico de Castanesa constituido por pliegues en las formaciones de la serie "Sierra Negra". Desde la confluencia de los cauces (barranco de Basibé y rio Baliera), en la parte inferior central de la foto, se puede recorrer, por el margen derecho del rio, la serie de las formaciones Aneto y Gelada; afloramientos anteriormente atribuidos al Ordoviciano.



Fotografía 10:

La línea del horizonte es la divisoria de aguas entre el rio Noguera Ribagorzana y el rio Noguera de Tort. De Sur a Norte: Pico Gelada (2.452 m.) en serie del Devoniano tipo "Baliera", collado Gelada (2.075 m.) por donde pasa el cabalgamiento alpino de la Unidad tipo "Sierra Negra", cresta hasta el macizo del pico Muñidó (2.650 m.) en pliegues del Devoniano, granito del pico Bizberri (2.951 m.) del macizo de Bohí. En el fondo valle del rio Noguera de Tort; en su margen Oeste, masa granodiorítica de Barruera (2.053 m.), y en su margen Este, el pueblo de Castell. (FUERA DE ZONA)



Fotografía 11:

Pico de Basibé (con nieve), visto desde el NNW al subir al pico Castanesa. Pliegues de interferencia sobre el conjunto de un flanco inverso de estructura principal.



Fotografía 12:
El pico de Basibé visto desde el Oeste. Serie invertida de la formación Basibé.



Fotografía 13:

La margen derecha del valle del Noguera Ribagorzana donde el barranco de Estet, desde el lado opuesto del valle. A la derecha de la foto se ve el cabalgamiento del Devoniano sobre el conjunto de Bono.



Fotografía 14:

Vista sobre la margen izquierda del Noguera Ribagorzana donde las explotaciones de la mina de El Cierco (Bono).



Fotografía 15:

Deslizamiento de ladera en la margen izquierda del rio Noguera Ribagorzana enfrente de Forcat.



Fotografía 16:

Tomada en dirección Oeste. Cortejo de diques de pórfido en el rincón suroriental de la Hoja. (FUERA DE ZONA)



Fotografía 17:

Prolongación de la vista anterior, hacia el Este. El pico Gelada en la parte derecha de la foto. (FUERA DE ZONA)



Fotografía 18:

Mirando en dirección Oeste. El pueblo de Erill Aval y, encima, la roca ignea (pórfido granodiorítico) del monticulo con vegetación. Rasa de material morrenico, a la derecha. Al fondo, el pico Gelada. FUERA DE ZONA



Fotografía 19:

Parte alta del valle del Noguera Ribagorzana, al Oeste de la entrada del tunel de Viella. Rasa de morrena reciente en la ladera de enfrente. NO SITUADA




Fotografía 2:

El circo de Castanesa desde las proximidades del collado de Basibé. En la línea del horizonte y desde el Oeste hacia el Este: Pico Castanesa, granito de La Maladeta a lo lejos, pico de Vallibierna, y cresta divisoria de aguas entre los circos de Castanesa y Llausét.



Fotografía 3:

Al fondo granito de las cumbres del macizo de La Maladeta. En segundo plano, las ampelitas del Siluriano de la Sierra Negra y pico de Vallibierna en calizas del Devoniano Inferior.



Fotografía 4:

Parte Oriental del circo de Castanesa desde su entrada meridional.



Fotografía 5:

Prolongación, hacia el Norte, de la panoramica anterior.



Fotografía 6:

El circo de Llausét desde las cercanias del collado de Salinas, divisorio con el circo de Castanesa. En frente, el Siluriano y Devoniano de la serie "Sierra Negra" entre el barranco de Llausét a la izquierda y el valle del Noguera Ribagorzana a la derecha. Al fondo norte los granitos de los macizos de La Maladeta, a la izquierda, y de Bohí, a la derecha.



Fotografía 7:

Margen oeste del valle del Noguera Ribagorzana.
Los afloramientos de color amarillo están constituidos por las facies brechoides con escapolitas sobre las que viene el cabalgamiento alpino de la unidad "Sierra Negra".



Fotografía 8:

Flanco sur del pico Muñidó. En color amarillo sendos sinclinales de la formación D_2 entre materiales del D_1.



Fotografia 9:

Continuación de los pliegues de la fotografía nº8 hacia el Este, margen Oeste del valle del Noguera de Tort.