



INFORMACION COMPLEMENTARIA

PALEONTOLOGIA (VERTEBRADOS)

HOJA Nº 166-VILLADIEGO
HOJA Nº 198-OSORNO
HOJA Nº 199-SASAMON
HOJA Nº 200-BURGOS

Informe en la
hoja 166



199

Esta asociación es característica del final del Aragonien se superior (final del Mioceno medio), zona G de Daams & Freudenthal (1988), unidad MN 7/8 de Mein (1975)

- Muestra MA-9301 La Vaca, Sasamón, hoja 199

Yacimiento de macro y micromamíferos. Se lavaron aproximadamente 30 kg. de sedimento de los que se obtuvieron algunos restos de micromamíferos, entre otros, dos dientes identificables. Se encontró también un M_3 incompleto de macromamífero.

La fauna determinada es la siguiente:

Insectívora

Erinaceidae

cf. Galerix sp.

Rodentia

Cricetidae







Megacricetodon cf. grupo crusafonti - ibericus

Carnívora

Suidae

Listriodon splendens



Las especies de la línea evolutiva Megacricetodon crusafonti - M. ibericus tienen una distribución bioestratigráfica que cubre el Aragoniense superior y el Vallesiense inferior. El súido lofodonto Listriodon splendens es una especie muy común en el Aragoniense superior, zona G; en la cuenca del Duero no se encuentra en los yacimientos Vallesienses, pero en la cuenca del



4

5

6



1 mm.

Leyenda de las figuras:

- Roedores de Cuesta del Rey 1: Megacricetodon cf. minor:
1: M_1 izq.; Megacricetodon ibericus: 2 M_1 izq.; 3: M^1 izq.;
4: M^2 izq.; Cricetodon sp.: 5: M_1 der.; Armantomys cf. ara-
gonensis: 6: M_2 izq.; Micromamíferos de Arroyal superior:
Microtus (s.l.) sp.: 7: M^2 izq.; Soricidae indet.: 8: M^2
izq.