

GALCO
PARCHEMIN

ALBUM FOTOGRAFICO
DE LA HOJA E: 1:50.000 DE
SARIÑENA Nº 30-14

JULIO 1990



FOTO 1. (GS-AH-8001).- Aspecto de los tramos de calizas y margas de la Unidad Galocha en la zona de Casa de Tisaire.



FOTO 2. (GS-AH-8002).- Canales de la Unidad Zuera-Lanaja en la zona de Las Planas (al SO. de Sena).




FOTO 3. (GS-AH-8003).- Canales de la Unidad Zuera-Lanaja en la zona de Las Planas (al SO. de Sena).




FOTO 4. (GS-SL-7001).- Vista general de la Laguna de Sariñena.



FOTO 5. (GS-SL-7002).-- Aspecto de los depósitos fluviales de las terrazas (T + 50 m.) del río Alcanadre.



FOTO 6. (GS-SL-7003).- Vista general de Casterflorite y Saso Santa Cruz. Relieves de areniscas en canales y li-
mos de la unidad de Zuera, protegidos de la
erosión por potentes depósitos aluviales del
piedemonte pirenaico encostrados por caliches.




FOTO 7. (GS-SL-7004).- Depósito de glacis formado por cantos heredados de origen aluvial y generado a partir de relieves coronados por depósitos aluviales - del piedemonte pirenaico.



FOTO 8. (GS-SL-7005).- Vista del perfil longitudinal de un glacis -
labrado sobre areniscas y limos de la unidad
de la Galocha. Sierra de Alcubierre.




FOTO 9. (GS-SL-7006).- Depósito arcilloso-limoso de origen aluvial-coluvial de edad probablemente Holocena afectado por procesos erosivos de "pipping" que produce socavones y hundimientos.



FOTO 10. (GS-SL-7007).- Barranco de la Clamor vieja. En primer término depósitos de fondo de valle. En segundo plano superficie de terraza colgada del propio barranco sobre areniscas y limos de la Unidad de la Galocha; observese el intenso acarcavamiento que afecta a estos materiales. En último término mesa de San Pedro en la que los caliches y depósitos aluviales cementados protegen el terciario de la erosión.



















