

27.15-GS-JE-9018

Detalle del muro de un banco de conglomerado cuarzo-calclítico del tramo 3 de la U.T.S. N-1 en el Cabezo de las Cuevas.



27.15-GS-JE-9019

Vista del Cabezo de las Cuevas con alternancia pardo-rojiza de conglomerados y areniscas con intercalaciones de lutitas. Muro de la U. Srra. de Pallaruelo-Monte de la Sora (tramo 3 de la U.T.S. N-1).



27.15-GS-JE-9020

Vista del escarpe meridional de la Plana con la alternancia de arcillas rojas y yesos nofulares del tramo 5 en la mitad inferior y los tramos carbonatados (7 y 8) de las U.T.S. N-2 y N-3 a techo.



27.15-GS-JE-9021

Aspecto de las facies carbonatadas del tramo 7 (U.T.S. N-2) sobre las evaporíticas del 1 (U.T.S. N-1) en la vertiente oriental de la Plana.



27.15-GS-JE-9022

Mudstone laminadas grises base del tramo carbonatado 7 (U. Montes de Castejón) en la vertiente oriental de La Palma.



27.15-GS-JE-9023

Aspecto de las facies evaporíticas del tramo 1 correspondiente a la U. Srra de Pallaruelo-Monte de la Sora U.T.S. (N-1) con desarrollo de las características "vales" en el fondo de los valles.



27.15-GS-JE-9024

Alternancia de yesos masivos fibroso-aturronados con bolas de alabastro y secuencias decimétricas de yeso y lutitas verdes. Tramo 1 en las proximidades de Torrecilla.



27.15-GS-JE-9025

Vista general del Valle del Ebro encajado en la serie evaporítica del tramo 1 (U.T.S. N-1) desde La Plana.



27.15-GS-JE-9026 y 9027

Vista del escarpe occidental de La Plana sobre el valle del río Huerva en el que se puede apreciar la relación temporal y espacial entre los tramos cartográficos 2, 4 y 1 terrígeno-evaporíticos pertene-- cientes a la N-1, en la parte inferior y los 7 y 8 carbonatados de la N-2 y N-3 a techo.



27.15-GS-JE-9028

Facies de lutitas y arenas con canales de la U. Remolinos--Lanaja (tramo 2) en las proximidades Botorrita.



27.15-GS-JE-9030

Perfil de la superficie erosivo-estructural de la Meseta de La Muela con escarpe antrópico sobre la auovía N-II y los glacis circundantes.



27.15-GS-JE-9032

Lutitas y margas de rosadas a verde-amarillentas con intercalaciones de yesos nodulares pardo-verdosos y algunas láminas de dolomicrita blanca del tramo 5 en la vertiente occidental de La Muela.



27.15-GS-JE-9033

Calizas arenosas en paso a calizas, coninterestratos de margas gris verdosa, hacia la base de la U. de San Caprasio (N-3), en el escarpe oriental de La Muela.



27.15-GS-JE-9036

Detalle de ciclo tempestítico en grainstone oolíticas con H.C.S. a wackestone bioturbada. U. MOntes de Castejón (U.T.S. N-2).



27.15-GS-JE-9038

Contacto entre las U.T.S. N-1, evaporítica, y N-2 (carbonatada) en el escarpe oriental de la Meseta de la Muela.



27.15-GS-GC-9051

Aspecto del tramo 4 de terrígenos con carbonatos (colores rosado-asalmonados) y el 6 de yesos con lutitas y láminas de dolomicrita (colores grisáceos).Facies de "Sheet flood" a "playa-lake" de la U.T.S. N-1.



27.15-GS-CG-9052

Deformaciones en deslizamientos de las zonas escarpadas marginales de las "Muelas", implicando los tramos carbonatados de las U.T.S. N-2 y N-3.



27.15-GS-CG-9053

Vista del valle del río Huerva desde los altos de Cadrete. Al fondo perfil de la Meseta de La Muela.



27.15-GS-CG-9054

Valle del río Huerva hacia su confluencia con el Ebro. A la derecha área acarcavada en los yesos de la facies evaporítica (tramo 1) de la U.T.S. N-1.



27.15-GS-CG-9055 y 9056

En la superficie de escarpe de la Meseta de La Muela sobre las calizas de la U. de San Caprasio (U.T.S. N-3).



27.15-GS-CG-9057

Deformaciones locales visibles en los escarpes de las U.T.S. N-2 y N-3 generadas por disolución-colapso-deslizamiento.