

F-1.- Conglomerados con cantos calcáreos Jurásicos del Paleógeno, en las proximidades de Serón de Nágima.



F-10.- Contacto entre la unidad carbonatada del Mioceno medio-superior y las arcillas de la unidad detrítica intermedia entre los dos páramos.



F-11.- Conglomerados en la base y areniscas hacía el techo, contacto entre las unidades cartográficas 6 y 8. Soliedra.



F-12.- Areniscas con estratificación cruzada en surco. Soliedra.



F-13.- Detalle de la fotografía anterior.



F-14.- Panorámica en la que se observa la superficie del Páramo superior del monte Moedo y el resto está caracterizado por relieves suaves, alomados del Mioceno.



F-15.- Panorámica, desde el monte Moedo, de la Hoja de Morón de Almazán.



F-16.- Calizas del Páramo superior, en el Monte de Moedo.



F-17.- Carbonatos del Páramo superior de la Sierra de Hontalvilla.



F-2.- Canal conglomerático entre arcillas del Mioceno inferior.



F-3.- Areniscas del Mioceno inferior-medio.



F-4.- Areniscas y arcillas del Mioceno inferior-medio (a) y al fondo se ve la unidad superior (b).



F-5.- Vista de los carbonatos del Mioceno inferior-medio.



F-6.- Vista de los carbonatos del Mioceno medio-superior y al fondo se observan intercalaciones de la unidad detrítica inferior.



F-7.- Detalle de los carbonatos del Mioceno medio-superior que tienen un alto contenido en arcillas.



F-8.- Carbonatos nodulares del Mioceno medio-superior.



F-9.- Carbonatos del Mioceno medio-superior y hacia el techo se observan arcillas marrones de la unidad detríticas intermedia entre los dos páramos.