

20444

INFORME MICROPALAEONTOLOGICO DE LAS MUESTRAS 32-17-FI-CG
769, 771, 805, 806, 807 y 808 REALIZADO POR EL B.F.G.M.

Section 32 -17 - FI - CG

a) n° 769 - Lame 10.601 :

Matière organique rare composée de Kérogène très évolué, pas de traces de microflore

b) n° 771 - Lame 10.603 :

idem, pas de microflore

c) n° 805 - Lame 10.603 :

Débris ligneux très abondants, mais très carbonisés.

Microflore non déterminable.

Traitement de laboratoire en cours par oxydation ménagée pour tenter d'éclaircir le matériel palynologique

d) n° 806 - Lame 10.604 :

idem

e) n° 807 - Lame 10.605 :

Matériel sporo-pollinique très carbonisé en fragments

Retusotriletes sp.

Tasmanaceae

Multiplicisphaeridium sp.

Débris de Chitinozoaire

Age : PALEOZOIQUE (DEVONIEN ?)

Remarque : certainement très proche (en plus carbonisé) de l'échantillon 808 (ci-dessous)

f) Tarragone 32-17-F I C.G. 808 - Lame 10.942

Navifusa bacillum

Leiotriletes sp.

Multiplicisphaeridium cf. *alloiteaui*

Calamospora sp.

Baltisphaeridium sp.

Retusotriletes biarealis

Cymatiosphaera cf. *multisepta*

Emphanisporites rotatus

Multiplicisphaeridium sp.

Tasmanacées (abondantes)

Navifusa multistriata

Retusotriletes cf. ocellatus

Veryachium trisulcum

Veryachium laevatum

Veryachium lairdi

Emphanisporites spinaeformis

Unellium ampullium (wicander)

Retusotriletes witneyanus

Polyedrixium cf. decorum

Age : EIFELIEN à FAMENNIEN

Environnement : marin

Conservation de la microflore : médiocre (carbonisation très importante des spores, du microplancton et des Algues)