

Nº HOJA	EMP.	REG.	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD (m)
1319166A0604T					
1	5	7	9	13 14	15 16

TAMAÑO ALOQUIMICO

RUDITA

1. 1 - 2 mm
2. 2 - 4 mm
3. > 4 mm

TRAZAS

SOMBRA

RECRISTALIZACION (R)

DOLOMITIZACION (D)

SILICIFICACION (S)

ACCESORIOS (A)

- 4g GLAUCONITA 1
7a OXIDOS Fe 2
7c YESO 3
7d SULFUROS 4
8a MAT. ORGANICAS 5
3i MICA 6
3j CLORITA 7
... GRANATE ... 8
... 9

A	A	A
2	6	8
58		60

BIOLITITA

--

DISH.

--

LACUSTRE

--

1. 1 - 10 %
2. 10 - 50 %
3. 50 - 90 %
4. 90 - 100 %

R AI TEX

49		52

TEX

D AI TEX

3		34
53		56

TEX

57

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

TAMAÑO DE GRANO (PHI)

MEDIO	MAXI
2	1
61	64

REDOND

MODA
9
65

FRACCIONES

GRAVA	ARENA	LIMO	CO ₂ Ca	CO ₂ CaMs
0	9	0	1	85
67	69	71	73	75 76

1
80

EDAD

CODIGO EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2		
10								20	29								38		

AMBIENTE B-3

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A FOSILES — F
FOSILES Y MICROFACIES — B ESTRATIGRAFICA — E
FOSILES Y LITOLOGIA — C MICROFACIES — M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D LITOLOGIA — L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

- BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

OBSERVACIONES EL TOTAL DE TERRIGENOS ES DEL 10% Y EL CONTENIDO EN OXIDOS UN 5%. MOSAICO CRISTALINO DOLOESPARITICO DONDE SE DISTINGUEN GRUPOS PELETOIDALES MICRITICOS. POROSIDAD DE TIPO FILIFORME.

INFORMACION ADICIONAL

41

2
80

Nº HOJA	EMP.	REG.	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD (m)
131916	GA	3002			
1	6	7	9	13 14	15 16

TAMAÑO ALOQUIMICO

RUDITA

1. 1 - 2 mm
2. 2 - 4 mm
3. > 4 mm

TRAZAS

SOMBRA

RECRISTALIZACIÓN (R)
CARBONATIZACIÓN (C)

DOLOMITIZACIÓN (D)

SILICIFICACIÓN (S)

ACCESORIOS (A)

- 4g GLAUCONITA 1
- 7a OXIDOS Fe 2
- 7c YESO 3
- 7d SULFUROS 4
- 8a MAT. ORGANICAS 5
- 3i MICA 6
- 3i CLORITA 7
- ... TURALINA 8
- ... GRANATE 9

A	A	A
6	8	9
58	60	

BIOLITITA

46

DISM.

48

LACUSTRE

47

	%
1. CUARZO 19	35
2. FELDSPAT 21	03
3. F. ROCAS 23	
4a. INTRACLAS. 25	
4b. OOLITOS 27	
4c. FOSILES 29	
4d. PELETS 31	
5a. MICRITA 33	
5b. DOLOMICRITA 35	
6a. ESPARITA 37	
8. ARCILLAS 43	60

1. 1 - 10 %	
2. 10 - 50 %	
3. 50 - 90 %	
4. 90 - 100 %	

R AI TEX

3	46
49	52

TEX

D AI TEX

53	56

TEX

57

2. MUY FINA
3. FINA
4. MEDIA
5. GRUESA
6. MUY GRUESA

TAMAÑO DE
GRANO (PHI)

REDOND

FRACCIONES

MEDIO MAXI

10 MODA

GRAVA ARENA LIMO CO₂ CO₂ CO₂ CO₂

2	0
61	64

8
65

0	7	1	3	8	0	0
67	69	71	73	75	76	

1
80

EDAD

CODIGO	EDAD	INFORME
5 55 5R 5SR P 5P 5SP 1 2	5 55 5R 5SR P 5P 5SP 1 2	
10 25 30	29 33 38	

AMBIENTE A-3

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

OBSERVACIONES EN EL MOSAICO CARBONATADO SE DISTINGUEN DOS PARTES UNA DE ASPECTO MAS SUCIO Y OTRA DE ASPECTO MAS LIMPIO. LA PRIMERA PROBABLEMENTE CORRESPONDA A UN PROCESO DE REMPLAZAMIENTO Y LA SEGUNDA A UN PROCESO DE RELLENO

INFORMACION
ADICIONAL

41

2
80