

INSTITUTO GEOLOGICO y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO
(MICROMAMIFEROS CAMPAÑA)
1982-1983
por: N. Lopez Martinez

Compañia General de Sondeos, S.A.
Noviembre, 1983

Con posterioridad al informe bibliográfico sobre la Paleontología y Bioestratigrafía del sector Nororiental de la Cuenca del Tajo, se han realizado varias prospecciones y muestreos preliminares en las facies más favorables para la preservación de los Micromamíferos fósiles. Los resultados de estas campañas de muestreo son los siguientes:

1) PALEOGENO. Hojas de Valdepeñas (485) y Jadraque (486)

<u>Beleña 1.</u> 2019 NL 06-01-01.	25 Kg. muestreados.	Estéril
<u>Beleña 2.</u> 2019 NL 06-02-01.	10 Kg.	Estéril
<u>Beleña 3.</u> 2019 NL 06-02-02.	5 Kg.	Estéril
<u>Torrebeleña 1.</u>	25 Kg. 2 restos.	Gasterópodos, Peces, Mamífero indet.
<u>Torrebeleña 2.</u>	25 Kg. 1 resto	Plantas, Gasterópodos, Vertebrado indet.
<u>Torrebeleña 3.</u>	125 Kg. 14 restos.	Plantas, Gasterópodos (3 especies), Peces Holosteos (2 especies), Cocodrilos, gen. <u>Bernissartis</u> y <u>Goniopholis</u> . Micromamíferos: Roedores, - <u>Gliravus cf. priscus</u> .

La edad de esta asociación puede inferirse de la presencia del lirón Gliravus cf. priscus. Es un P^4 sup. de morfología muy compleja, semejante a la población de Escamps, de las fosforitas de Quercy. También se encuentra en Sosis y en Montmartre que es la fauna tipo del Ludiente. Este término se ha atribuido al Eoceno sup/Oligoceno inf., y su término continental inglés es el Headoniense. Estos dos pisos son cronoequivalentes, pero su relación con el marino mediterráneo (Priaboniense) es poco clara. Los autores ingleses incluyen ambos pisos en el Oligoceno inferior, y los franceses en el Eoceno superior (ver RUSSEL y col. 1982).

<u>Torrebeleña 4.</u>	25 Kg.	Estéril
<u>Torrebeleña 5.</u>	75 Kg. 6 restos.	Peces Holosteos, Reptil indet., Cocodrilo: gen. <u>Goniopholis</u> ; Mamífero indet (gran talla)

Estas asociaciones de peces Holosteos (tipo *Gyrodus*, *Microdon*, *Coslodus*) con Cocodrilos arcaicos (*Bernissartia*, *Goniopholis*) es dulceacuícola e idéntica a la del Cretácico inferior (Weald). Se puede inferir la existencia de un clima tropical, con temperaturas altas y poco contrastadas, pero la falta o escasez de fauna terrestre nos impide inferir la humedad y la vegetación existente.

Otras 12 muestras se recogieron en la hoja de Hiendelaencina con el fin de conectar la serie de Torrebeleña con el yacimiento de Huérmece del Cerro.

Pinilla 1 a 6. con un total de 150 Kg. 10 restos. Reptiles indet. *Lacertidae* indet., *Anguidae* indet
Mamíferos: Insectívoro indet.

Rio Salado 1 a 4. con un total de 120 Kg. 25 restos. Peces Holosteos (3 especies). Reptiles indet.
Quelonio indet., Cocodrilos: gen. *Bernissartia* y *Goniopholis*

<u>Baides.</u>	30 Kg.	Estéril
<u>Huérmece</u>	30 Kg. 10 restos.	. Peces Holosteos

La muestra de Torrebeleña 3 contiene una asociación semejante a la de Rio Salado 0 (Viana de Jadraque), que a su vez se relaciona con un nivel detrítico intercalado en la serie carbonática que contiene Macromamíferos semejantes, en tafocenosis y composición, a los de Huérmece. Esta relación no es estricta desde el punto de vista cronoestratigráfico, pues tanto los peces como los reptiles presentan una gran distribución vertical como hemos visto. No se han encontrado Micromamíferos en el área de Baides, por lo que su datación reposa en los Macromamíferos, tanto los de Huérmece como los de Torremocha de Jadraque recientemente descubiertos.

2) NEOGENO. Hojas de Villaviciosa, Gaudalajara, Alcalá y Jadraque

Henares 2.

120 Kg. 87 restos.

Peces Ciprínidos, Anfibios indet., Mamíferos: Mastodonte indet., Caenotherium sp., Armantomys sp., Megacricetodon collongensis, Heteroxerus sp. Soricidae indet., Galerix sp. Lagopsis cf. peñai + Prolagus sp.

La edad de esta asociación corresponde al Mioceno medio, como lo demuestra la asociación Mastodonte-Armantomys que es solo posible en el Aragoniense medio-superior. El hamster M. collongensis se encuentra sobre todo en la parte alta del Aragoniense medio (zona MN 4 o MN 5).

Henares 1.

70 Kg. 20 restos.

Reptiles: Testudo (Geocheleone) bolivari; Mamíferos: Soricidae indet., Lagopsis sp., Megacricetodon sp.

Es una fauna atípica formada sobre todo por una gran acumulación de tortugas. El gran Megacricetodon sugiere una edad Astaraciense, pero es un material muy escaso y podría tratarse de un ejemplar grande en una población de M. collongensis, propia del Orleaniense.

Arganda

35 Kg. 11 restos

Peces: Rutilus, Chondrostoma, Anfibios, Reptiles: Anguidae; Mamíferos: Erinaceidae indet. Lagomorpha indet., Muridae indet.

Por la presencia del mûrido se puede inferir una edad comprendida entre el Vallesiense superior y el Plioceno, sin poder precisar más hasta que no se posea algún diente completo.

Arbancón

50 Kg. 5 restos. Gasterópodos, Mamíferos: -
Soricidae, Cricetidae, Mu-
ridae, Prolagus sp.

Corresponde al Mioceno superior o al Plioceno, como la muestra anterior. Por la pequeña talla del Prolagus y la presencia de un hamster es más probable que sea Vallesiense superior o Turoliense, pero no se puede precisar con seguridad dada la escasa muestra disponible.

Cendejas de la Torre 1. 25 Kg. 35 restos. Reptiles: Lacertidae indet
Mamíferos: Soricidae, Pro-
lagus sp., Megacricetodon
ibericus

Por el grado de evolución del hamster, este corresponde al Aragoniense superior o Vallesiense inferior, biozona H de Daams o C de Agustí (límite Aragoniense/Vallesiense).

Guadarrama

15 Kg. 7 restos. Mamíferos: Bunolistriodon
lockarti, Caenotherium sp.
Rodentia indet.

La edad de esta muestra la dan los Macromamíferos Artiodáctilos. Bunolistriodon es típico del Aragoniense medio (zonas MN 4 y MN 5 de Mein) al igual que Caenotherium, que se extingue después.

Guadalajara

30 Kg. 6 restos. Reptiles: Quelonio indet.,
Mamíferos: Gomphotherium -
angustidens, Ochotonidae -
indet., Erinaceidae indet.

El Mastodonte es típico del Mioceno medio (zonas MN 4 a MN 7/8). No obstante hay indicios de que en España puede encontrarse antes. No existen otros criterios de datación dada la escasez de la muestra.

Otros muestreos realizados (Torremocha de Jadraque, Majadahonda) no han proporcionado todavía Micromamíferos, sino solo Macro. Estos están sujetos a un estudio detallado en el Instituto de Geología del CSIC.

RESUMEN

Nombre	Kg. muestreados	Nº restos	Edad
Beleña 1	25	--	
Beleña 2	10	--	
Beleña 3	5	--	
Torrebeleña 1	25	2	--
Torrebeleña 2	25	1	--
Torrebeleña 3	125	14	Headoniense sup. (Eoc./Olig.)
Torrebeleña 4	25	--	
Torrebeleña 5	75	6	--
Pinilla 1 a 6	150	10	--
Rio Salado 1 a 4	120	25	
Boides	30	--	
Huérmece	30	10	--
Henares 2	120	87	Orleaniense (Aragoniente medio)
Henares 1	70	20	Orlean./Astarac.
Arganda	35	11	Valles. sup.-Plioceno
Arbancón	50	5	Vall. sup.- Truol.- Plioceno
Cendejas 1	25	35	Aragon. term.- Valles. basal
Guadarrama	15	7	Orleaniense (Aragon.medio)
Guadalajara	30	6	Aragoniente (Mioceno inf.?)

27 muestras

990 Kg.

239 restos de Vertebrados