

Este material
(11 a 107)
nivel "L"

-20545

30-21-AD-MA-11.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, algo de cuarzo y frecuentes restos de placas y radiolas de Equinodermos, Gasteropoditos piritizados, Lamelibranquios, Ostrácodos, Lenticulina gaultina, Lenticulina sp., Sabaudia minuta, Textularia foeda, Epistomina spinulosa, Lamarckina sp., Radiolarios, Braquiopoditos piritizados, Globigerinelloides af. gottisi, pequeñas Hedbergellas, Gyroidina, Pullenia, Vaginulina aptiensis, Dentalina distincta, Ammo baculites sp.

Aptiense inferior

30-21-AD-MA-89.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de marga sin deshacer, fragmentos calizos, frecuente pirita y restos de Equinodermos, Gasterópodos, Lenticulina, Frondicularia, tubos piritizados, Textularia foeda, Sabaudia, Ostrácodos.

Aptiense

30-21-AD-MA-12.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos calizos, de marga sin deshacer, yeso, óxidos de hierro, tubos calcáreos, en su mayoría piritizados, y escasos restos de Ostrácodos, Sabaudia minuta, Hedbergellas (H. af. delrioensis), Planularia, Lenticulina, Marginulina.

Albiense30-21-AD-MA-20.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos calizos, llenos de Orbitolinidos (Palorbitolina lenticularis, Orbitolina (Mesorbitolina) texana parva), junto con Choffatella decipiens, fragmento de Equinodermos, Patellina subcretácea, Lenticulina, Textularia, Bolivinopsis, Trifarina, Saracenaria, Ostrácodos, Rotalia, Sabaudia, y fragmento de un Gironito de Charácea.

Barremiense-Aptiense inferior30-21-AD-MA-23.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de arcilla rojiza, de aspecto micáceo, sin deshacer. No se observan restos fósiles.

Indeterminada. Por criterios geológicos es -
Bedouliense basal

30-21-AD-MA-24.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de arenisca sin deshacer, granos de cuarzo y de mica blanca, algo de óxido de hierro. No se observan restos fósiles.

Indeterminada. Por criterios geológicos es Bedouliense basal.

30-21-AD-MA-25.-

LEV. Resíduo formado por granos de cuarzo, fragmentos de arenisca sin deshacer, placas de mica blanca y algo de óxido de hierro. No se observan restos fósiles.

Indeterminada. Id. a la 24

30-21-AD-MA-93.-

LEV. Resíduo con Orbitolinopsis kiliani, Palorbitolina lenticularis, Choffatella decipiens, Ostrácodos.

Barremiense-Aptiense inferior

30-21-AD-MA-102.-

LEV. Resíduo formado por fragmentos de arcilla sin deshacer, de aspecto rojizo, algo de cuarzo y mica. No se observan restos fósiles.

Indeterminada. Semejante a la 23.

30-21-AD-MA-107.-

LEV. Resíduo formado por granos de cuarzo, calizas de rocas, y restos rodados de Globotruncana; Choffatella y Orbitolina, tubos calizos.

Indeterminada. Posible Terciario continental