Instituto Geológico
y Minero de España

Álbum Diapositivas

Documentación complementaria MAGNA
hoja E. 1:50.000

San Martín de Valdeiglesias
557 (17-22)

Foto 8001 — Metasedimentos corneanizados y venulados afectados por un sistema de fracturas tardias.
Foto 34-(9) Arroyo de la Pizarra

Foto 8002 — Banda de cizalla Post F_3 con desarrollo de milonitas en metasedimentos próximos al contacto con las adamellitas biotíticas porfídicas "Tipo Hoyo de Pinares". Foto 39-(9)

Foto 8003 — Afloramiento de tonalitas-cuarzodioritas foliadas al norte de Guisando. Formas erosivas en bolos de pqueñas dimensiones. Foto 29-(8)

Foto 8004 — Aspecto de afloramiento de adamellita biotítica porfídica orientada. Zona de Guisando. Foto 9-(8)

Foto 8005 — ASpecto morfológico de la adamellita biotítica porfídica orientada en la zona de Guisando. Formas erosivas en grandes bolos. Foto 10-(8)

Foto 8006 — Granodiorita biotítica equigranulares foliada. Facies local de variación de las adamellitas biotíticas porfídicas foliadas. Zona de el Tiemblo. Foto 20-(8)

Foto 8007 — Adamellita-Granodiorita biotítica foliada desmonte porfídico. Facies local de variación de las adamellitas biotíticas porfídicas tipo Hoyo de Pinares. Foto 35-(8)

Foto 8008 — Facies de las adamellitas biotíticas-porfídicas foliadas tipo Hoyo de Pinares con abundantes megacristales de pequeño tamaño. Foto 21-(8)

Foto 8009 — Aspecto textural de variedad de las adamellitas biotíticas porfídicas foliadas "Tipo Hoyo de Pinares", con gruesos cristales subredondeados de Cuarzo. Foto 26-(8)

Foto 8010 — Adamellita foliada con grumos biotíticos de El Tiemblo. Aspecto textural. Foto 15-(8)

Foto 8011 — Enclave cuarzodiorítico-tonalítico estirado en las adamellitas foliadas con grumos biotíticos de El Tiemblo. Foto 18-(8)

Foto 8012 — Enclave granudo rodeado por la equistosidad en las adamellitas granodioritas biotíticas foliadas con grumos biotíticos de El Tiemblo. Foto 16-(8)

Foto 8013 — Aspecto textural adamellita-biotitica porfídica orientada tipo hoyo de Pinares. Zona sur de Cebreros. Foto 31-(11)

Foto 8014 — Síntomas de fracturación con desarrollo de cataclastitas y pseudotaquilitas en adamellitas biotíticas porfídicas tipo hoyo de Pinares. Foto 18-(11)

Foto 8015 — Granitos biotíticos porfídicos orientados de El Tiemblo. Aspecto textural. Foto 13-(9)

Foto 8016 — "Marmitas" en adamellitas biotíticas porfídicas foliadas. Cauce del río Alberche. Zona de El Tiemblo. Foto 17-(9)

Foto 8017 — Morfología de lanchares en las adamellitas biotíticas porfídicas "Tipo Hoyo de Pinares" al norte de Cebreros. Foto 16-(19). (Situar, fotos aereas de Pepe)

Foto 8018 — Brecha intrusiva de fragmentos angulosos de adamellita-granodiorítica porfídica foliada en leucogranitos orientados, junto a la zona de contacto con las adamellitas porfídicas "Tipo Navas de El Marqués". Zona de cola del embalse de San Juan. Foto 37.8

Foto 8019 — Cantera en variedad pobre en megacristales de las adamellitas biotíticas porfídicas "Tipo Navas de El Marqués" junto a la cerrada del embalse de San Juan. Foto 31-(9)

Foto 8020 Aspecto textural de adamellita biotítica porfídica. Tipo Navas de El Marqués. Zona de Pelayos de la Presa. Foto 19-(9)

Foto 8021 Enclave microgranudo en adamellita biotítica porfídica "Tipo Navas del Marqués". Foto 18-(19)

Foto 8022 Morfolog'ia de las adamellitas biotíticas porfídicas Tipo "Navas de El Marqués". Cerro del Yelmo, en las proximidades de la desembocadura del río Cofio en el embalse de San Juan. Foto 10-(10)

Foto 8023 Cuerpo tabular de leucogranitos biotíticos heterogeneos con bandas pegmatiticas, sobre adamellitas biotíticas porfídicas "Tipo Navas de El Marqués". Zona próxima a la orilla sur del Embalse de San Juan. Foto 12-(9)

Foto 8024 Afloramiento con desarrollo de amplios lanchares en leucogranitos microporfídicos. Cerro de San Esteban, al norte de Pelayos de la Presa. Foto 30-(9)

Foto 8025 Dique leucogranitico en adamellitas biotíticas porfídicas foliadas "Tipo Hoyo de Pinares" desplazado por fractura. Inmediaciones de El Tiemblo. Foto 32-(8)

Foto 8026 Relaciones de brechificación-hibridación entre leucogranitos biotíticos heterogeneos y granitos microporfídicos. Zona del Embalse de San Juan. Foto 10-(9)

Foto 8027 Dique de pórfido milonitizado con fuerte lineación de estiramiento. Zona al sur de Cebreros. Foto 6-(9)

Foto 8028 Zona cataclástizada de las adamellitas biotíticas porfídicas foliadas, con roca porfídica empastando los fragmentos. Zona al oeste de Cebreros. Foto 8-(9)

Foto 8029 Zona cataclástica con desarrollo de brechas y pseudotaquilitas en las adamellitas litológicas porfídicas foliadas "Tipo Hoyo de Pinares" al oeste de Cebreros. Foto 21-(9)

Foto 8030 Venas leucograniticos desplazadas sinistralmente por fracturas en adamellitas biotíticas porfídicas foliadas "Tipo Hoyo de Pinares" en Cebreros. Foto 15-(9)

Foto 8031 Erosión alveolar con desarrollo de Taffonis en adamellitas biotíticas porfídicas orientadas. Zona al sur de Cebreros. Foto 23-(9)

Foto 8032 Filones leucogranitos asociados al granitoides microporfídico orientado de El Tiemblo cortando a las adamellitas biotiticas porfídicas. Zona de El Tiemblo. Foto 16-(9)



8001

8002





8003



8004

8005






8006



8007

8008





8009



8010



8011



8012



8013

8014





8015



8016



8017



8018



8019

8020





8021



8022

8023





8024



8025

8026





8027



8028



8029



8030



8031

8032

