

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9088			SA	gata de Miguera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de gata. Sierra de gata Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR ALOTRIMORFICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, QUARZO, PLAGIOCLASAS, MOSCOVITA, BIO

TITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, SERICITA, ANDALUCITA, MINERALES DE HIERRO, RUTILO,

CIRCON, MINERALES DE ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → Clorita,
Feldes minerales arcillosos, sericita

OBSERVACIONES

Las medidas en las plagioclasas son de $A_n \approx 8\%$ y seguramente todas se pueden considerar como Albita.

6- CLASIFICACION

APLITA

GRANITO APLITICO MOSCOVITICO

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 5T 6B 9071 13PROFUNDIDAD
15PROVINCIA
CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Galana. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres
proxima al metamorfo.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano medio a grueso debilmente porfídico

4- EDAD

HERCINICA
21 43PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA
46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVI
154 207TA
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, SERICITA, TOPACIO, CIRCON, APATITO, RUTILO, MINERAL
262 315LES-DE-HERRO MINERALES ARCILLOSOS, ALBITA
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA. Biotita → clorita y tambien pasa a feldes K
Baja. feldespatos → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

la clorita se considera en gran parte como pluvina.
las plagioclasas no son zonadas y $Al_2 \approx 16\%$ aunque hay ademas algo de
Albita ligada al feldes K

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO Biotitico-Moscovitico
370 423

granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO
424ANALISIS MODAL
425PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V
P 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 JTLB 9074

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide del apuntamiento del Puerto de Perales - plutones del N de la Provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano fino a medio, leucocrático y alterado

4- EDAD

HERCINICA

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C- BUENA... B
VALORACION - PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRICOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PINTA, MINERALES - DE - HIERRO, CIRCON, TOPACIO, ALBITA, RUTIL

LO, APATITO, MINERAL ARCILLOSO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteraciones secundarias: mineral arcilloso, óxido de Fe
DEUTERICA DEBIL - Feldspatos a minerales arcillosos teñidos de óxidos de Fe

OBSERVACIONES

En la textura se observa una débil tendencia al porfirismo por el feldespato K que a veces ~~se~~ de mayor tamaño.

El Rutilo solo aparece en agupas dentro del cuarzo. Algunos circones, y también parte de los apatitos, forman halos pleocroicos en la moscovita.

6- CLASIFICACION

LEUCONEIS

GRANITO DE GRANO FINO Y MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITL 09068

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

CC

García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jalama - Sierra de Jata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, de tono amarillento de grano fino a medio. Débil orientación de los filossilicatos

4- EDAD

HERCINICA

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C- BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALLINA HETEROGRAANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO FELDESPATO - POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MINERALES DE HIERRO BIOTITA TOPACIO CIRCON MINERAL

ARCILLOSOS SERICITA APATITO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteraciones secundarias: Sericit, mineral arcilloso
DEUTERICA - Feldespatos → sericit y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La textura hipidiomorfa se debe a las plagioclasas. Hay alguna tendencia al porfirismo por la biotización tardía del feldes. K. que incluye a los demás componentes. La oligoclasa es muy ácida y la proporción de ella al feldes K es relativamente alta.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023ITLB9059

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueas

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Sant Bader - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTADIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO OLIGOCLASA BIOTITA MOSCOVI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNA MINERALES - DE - HIERRO SERICITA CIRCON RUTILO

TOPACIO APATITO MINERALES ARCILLOSOS ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA IRREGULAR

Biota → penina y opaco

Feldspato → sericita y minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El hipidimorfismo lo imponen las plagioclasas de tendencia algo euhedral

La cloritización de la biotita está muy mal repartida en la lámina

Hay pequeñas formaciones peritéticas en los cristales mayores de felds K. También se encuentran algunas microequitas.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO y MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO

Granito de las Micas de grano grueso

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 J T 6 B 9 0 6 0 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Garza de Figueas

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañez - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso, algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAVULAR SERIADA HIPIDIOMORFA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERAL ~~DE~~ DE-HIERRO, CIRCON, TOPACIO, APATITO, 262 315

RUTILO, EPIDOTA, SERICITA, MINERAL ~~DE~~ ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteraciones secundarias: clorita, opacos, sericita, minerales arcillosos, epidota
 DETERIORA DEBIL - Biotita → clorita + opacos
 Feldspatos K → sericita + minerales arcillosos
 Plagioclasas → minerales arcillosos + epidota ± sericita.

OBSERVACIONES

Aunque se considera la textura seriada hay una debil tendencia al porfirismo por el mayor desarrollo de algunos cristales de feldespato potasico
 Las plagioclasas medidas son de An ≈ 18
 Hay algunas mirasquitas

6- CLASIFICACION

Granito de los micas GRANITO BIOTITICO y MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO 370 423

Granito de los micas y grano grueso

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 I T L B 9 0 6 1
1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueirola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Santibañer - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Caceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano medio a grueso algo porfirico.

4- EDAD

HERCINICA
21 43- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
PROCEDIMIENTO - DATAION ABSOLUTA... B
- DATAION PALEONTOLOGICA... C- BUENA... B
VALORACION - PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA
46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO OLIGOCLASA BIOTITA MOSCOVI
154 207TA
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITIN MINERALES DE HIERRO CIRCON RUTILO TOPACIO APA
262 315TITO SERICITA MINERALES ARCILLOSOS
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DENTERICA INTENSA: Biotita → clorita (plumina en su mayor parte) + opaco
feldespa → minerales arcillosos + sericita

OBSERVACIONES

Hay algunas micromequitas y un cierto desarrollo del porfirismo por el crecimiento de algunos cristales de feldes. K que engloba otros componentes. Feldes K ≠ que oligoclasa

6- CLASIFICACION

GRANITO DE LOS MIZAS

GRANITO BIOTITICO Y MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO
370 423

granito de los mizas de grano grueso

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9035			CC	García de Figuearola
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoides de índice de color elevado grano medio algo porfídico y con microenclaves perteneciente a la Unidad de Santibañez (Cuenca de Gata).

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoides de índice de color elevado; finos, medios algo porfídicos y con microenclaves

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, ZONADAS, Biotita

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, TURMALINA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON

APATITO, TOPACIO, SERICITA, CAOLINITA, ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { DEBIL: - Biotita → clorita
Media: - Feldespatos → sericita y/o caolinita,
Muy Fuerte: - Cordierita → ~~Plagioclasas~~ Pinnite

OBSERVACIONES

La Turmalina aparece en pocos cristales, grandes, porfídica con el cuarzo y englobando la cordierita alterada.
Algunas laminae de moscovita se han desarrollado a expensas del feldespatos y este mineral aparece, a veces, dentro de cristales de cuarzo en forma porfírica.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

Granodiorita biotítica con cordierita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 IT 409036

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figuearola

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santi-
ago (Serra de Gata). Área con abundante fracturación
antidiercinica.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático de grano fino alterado

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO OLIGOCLASA FELDESPATO-POTASICO MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA TOPACIO MINERALES-DE-HERRO BIOTITA CIRCON

APATITO SERICITA CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dealterica feldespato → ~~feldes~~ caolinita
debil

OBSERVACIONES

Algunos cristales mayores son de oligoclasa y están "recubiertos" por feldespato potásico
La Turmalina aparece dentro del feldes k

6.- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

granito aplitico moscovítico

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 J T 4 B 9 0 3 8 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Spacia de Figueasla

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santibañe
 (Cerro de Jola).

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de índice de color alto grano medio y microclavos

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, ZONADAS, FELDSPATO, POTASICO, BIOTI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, CLORITA, CIRCON, APATITO, MINERALES DE HIERRO

ALBITA, TOPACIO, CAOLINITA, SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Debil: Biotite → clorita,
 Media: Feldspatos → minerales arcillosos, No sericita,
 Fuerte: Cordierita → pinita

OBSERVACIONES

Hay una parte de la lamina con grano mas fino y constituida por cuarzo, biotite en laminas pequeñas y pinita.

Independientemente tambien aparece pinita en cristales mayores en otras partes de la preparacion.

Hay asociacion de feldes K - Q en la que el 1.º queda gotiforme en el segundo.

Algo de mixtura quitas

En una plagioclasa medida sale $An \approx 28$

6.- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

Granodiorita biotitica con Cordierita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

N.º HOJA EMP REC N.º MUESTRA TA
1 5 7 9 13
102357689039

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

C.O.

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueras

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santibañe
(Cuenca de Gata). Área con abundante fracturación - brechamiento

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de índice de color alto grano medio y porfídico en parte

4.- EDAD

HISTÓRICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO PLAGIOCLASAS ZONADAS FELDSPATO - POTASICO BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MUSCOVITA MINERALES DE HIERRO APATITO CIRCON CLORITA

TURMALINA SERICITA CAOLINITA TOPACIO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DENTERICA / DEBIL { Biotita → clorita,
feldespatos → sericita, clorita, clorita
FUERTE - Cordierita → plagioclasa.

OBSERVACIONES

Solo se ha localizado un cristal de Turmalina rodeado de laminas cortas de
biotita.
El feldespato K está sustituido o englobado como gránulos en cuarzo

6.- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

Granodiorita biotítica con cordierita.

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 1023 JTL 09040

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica de la Unidad de Santibañez
 (Cuenca de Geta).

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano medio porfídico. Índice de color alto

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

- BUENA... B

VALORACIÓN - PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular porfídica hipidiomorfa
 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASAS ZONADAS FELDSPATO-POTASICO, BIOTI
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MUSCOVITA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO, CIRCON
 262 315

SERICITA, CAOLINITA, TOPACIO
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerals secundarios: clorita, sericita, caolinita, pirrita
 DETERICA { Muy debil: Biotita → clorita
 Debil: Feldes → sericita y caolinita
 Fuerte: Cordierita → pirrita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas no son fadas zonadas de forma clara. $Am \approx 27$
 se desarrollan microesquitas en el contacto Plagio-feldes K.
 El caracter porfídico lo condiciona fenoblastos de feldes K que engloba los demás componentes.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA
 370 423

Granodiorita biotítica con cordierita

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 7 9 0 4 2
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Soria de Figueira

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santibañe
 (Sierra de Gata). Roca con abundante fracturación tardocristalina.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide alterado de grano medio.

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO - CALICA ZONADA Bioti
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MUSCOVITA, CLORITA, MINERALAS - DE - HIERRO, APATITO, CIRCON
 262 315

TOPACIO, SERICITA, CAOLINITA, TURMALINA
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA { DEBIL { Biotita → clorita,
 feldspatos → caolinita y/o sericita
 FUERTE - Cordierita → pinnita

OBSERVACIONES

Hay mic megacristas
 Los apatitos adquieren buen tamaño
 solo se ha localizado un cristal de turmalina ligado a la biotita.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA
 370 423

Granodiorita biotítica con cordierita

ANALISIS QUIMICO
 424

ANALISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023ITLB9043 15 CC 19 *Sociedad de Fomento*

2- DATOS DE CAMPO

*Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santibañez
(Sierra de Gata) Área S - donde se fracturaron - tardíamente.*

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide alterado de grano medio algo porfídico y con microclaves

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO PLAGIOCLASAS ZONADAS FELDSPATO-POTASICO BIOTI

154

207

TA - CALCICO,

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA CLORITA MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, APATITO,

262

315

ALBITA, SERICITA, CADLINITA

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEVTERICA { *DEBIL* { *Biota → clorita*
FUERTE - *CORDIERITA → PINITA*

OBSERVACIONES

*Hay una tendencia al porfirismo debido a las plagioclasas
Algunas pinitas estan dentro del Feldspato
Hay microclaves*

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370

423

Granodiorita biotítica con cordierita

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 489044 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de F. J. Mesa

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica de la Unidad de Imbabura (Cuenca de Jumbay).

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide alterado de grano medio a grueso con microclavos

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIONOMORFA

46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, PLAGIOCLASAS ZONADAS, FELDSPATO-POTASICO, BIOTI
 - CALCICA

TA 154 207
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO, CIRCON

CAOLINITA, SERICITA, ALBITA 262 315
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA / DERIVADA FUERTE
 Biotita → clorita,
 feldspato → sericita y caolinita

OBSERVACIONES

Hay mixturitas
 Una parte de la preparación está constituida por biotita en laminas pequeñas + cuarzo +
 + Pirita: Se considera como un micro-xenolito del encapante. Independientemente
 hay también pirita en el resto de la preparación.
 Los valores de Au ≈ 24 %

6- CLASIFICACION

GRANODIORITO BIOTITICA 370 423

Granodiorita biotítica con cordierita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA
1023	17	639	045	
1	5	7	9	13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueroa

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañez, Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grão fino e isotrópico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA..... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA..... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA..... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOC	RISTALINO	HETEROG	GRANULAR	GRIADA	ALOTRIOMORFO
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

154 CUARZO, FELDSPATO-POTÁSICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTI 207

208

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, TOPACIO, MINERALES-DE- Hierro, CIRCON, APATITO, RU

TILO, SERICITA, MINERAL ES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA
y
Meteorítica

Baño → clorita,
Feldespato → sericita, y minerales arcillosos
mineral arcilloso

OBSERVACIONES

Las plagioclases son de $An \approx 10-12$ en los cristales incluidos

6 - CLASIFICACION GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO-BIOTITICO DE GRANO FINO

Gravito de los micas y de grano fino

ANALISIS QUIMICO ☐

ANALISIS MODAL ☐ 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10235T6B9046

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figueiró

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañer. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACIÓN - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO CUARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO CIRCON TOPACIO RUTILO MINERALES DE HIERRO

SERICITA CLORITA MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL

METEORITICA DEBIL

Biotita → clorita,
 Feldespato → Caalbita y sericita

OBSERVACIONES

el porfirismo se debe a cristales de microclina que engloba a los demás componentes. No está peritizada.

La plagioclasa es de An ≈ 14-16 % en 6 cristales medidos
 la sericita se desarrolla muy abundantemente en los contactos de las micras con los fenocristales de microclina

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO

Granito de dos micras porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 1 T L B 9 0 4 7

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figueal

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Santibañez, Sierra de Gata, Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio, porfídico y con orientación de los fenocristales

4.- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
- DATACION ABSOLUTA B
- DATACION PALEONTOLOGICA CVALORACION - BUENA B
- PROBABLE P
- DUDOSA D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIONOMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, APATITO, CIRCON, MINERALES DE HIERRO, RUTILO, SERP

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA DEBIL: Biotita → clorita
Feldspatos → minerales arcillosos, sericita

OBSERVACIONES

Los fenocristales son de microclina poco perfitizada y se originan en el contacto con las micas abundante sericita.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

370

423

granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 1 7 6 B 9 0 4 8 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Santibañes. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIMORFA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO CUARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTI 154 207

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO CLORITA CIRCON MINERALES DE HIERRO SERICITA 262 315

TOPACIO RUTILO MINERALES ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica débil: Biotita → clorita,
 Feldspatos → minerales arcillosos y sericita

OBSERVACIONES

La oligoclasa es muy ácida: Au ≈ 11% en 5 medidas

El porfirismo se debe al feldes x poco partitizado y con sericita en los contactos con las micas

Cuando menor parte de la clorita es perminera

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO 370 423

Granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 4 B 9049 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Soria de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Sanibañer, Sierra de Gata, Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA 21 43

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

- BUENA... B

VALORACIÓN - PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA 154 207

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, APATITO, CIRCON, RUTILO, MINERALES - DE - HIERRO, 262 315

TOPACIO, CLORITA, MINERALIZACIONES, ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL { Biotita → clorita,
 feldespato → sericita y minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Los plagioclasas medidas dan un contenido de An $\approx$ 10-12 por lo que se considera oligoclaseo ácido, aunque puede haber otra generación de plagioclasas con una acididad de An $\approx$ 8-10. El porfírico es debido a los feldespato potásico que engloba los otros componentes, está poco o nada perlitizado ni forma albita lobulada hacia el borde aunque sí mucha sericita en contacto con cuarcas.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO PORFIDICO 370 423

granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10231 TLB9052

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

CC

García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañer, Sierra de Gata, Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grano de fino a medio algo orientado y sin porfirismo

4- EDAD

HERCINICA

21

43

- POSICION ESTIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACION - PROBABLE... P

- DUDOSA... D

B

P

D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERALES-DE-HERRO, CIRCON, TOPACIO, APATITO, SE

RICITA, RUTILO, MINERAL ARCILOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

mineral secundario: clorita, sericit, mineral arcilloso
DENTERICA INTENSA: Biotita → clorita y feldspatos a sericit y mineral arcilloso

OBSERVACIONES

Las laminas de moscovita estan flexionadas
las plagioclasas medidas dan An ≈ 14-16.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO DE GRANO FINO

Granito de las micas de grano fino

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P

HIPOBISAL - H

VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 409053

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

Soria de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañe. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino a medio. No porfídico. Débil orientación mineralógica.

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

154

207

TA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO SERICITA MINERALES DE HIERRO RUTILO

262

315

CIRCON MINERALES ARCILLOSOS APATITO

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica intensa { Biotita → pennina + rutilo
 Feldspatos → sericita y/o minerales arcillosos

minerals secundarios: pennina, rutilo, sericita, minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas medidas dan $An \approx 12-14$ y tienen la malla de NG muy fina. La proporción de plagi a feldes K es relativamente igual a 1 por lo que tiene una tendencia intermedia.

La clorita es pennina

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO

370

423

granito de dos micas de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10 23 IT 4B 9054

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Spide de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañer. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACIÓN - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA RIOTIL

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO MINERALES-DE-HIERRO CIRCON RUTILO

APATITO MINERALES ARCILLOSOS SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA INTENSA
 Biotita → sericita + rutile + opacos
 Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las cantidades de sericita son muy pequeñas y a si mismo hay poco apatito en compa-
 ração con otras rocas de la zona
 La moscovita está en laminas grandes y paiguitica con el cuarzo

6- CLASIFICACION

APLITA

GRANITO APLITICO MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10231 TLB90655
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Correa de Figueroa

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Santibañez. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grano fino algo orientado

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTI
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO RUTILO MINERALES-DE-HIERRO APATITO
 262 315

CIRCON SERICITA MINERALES-DE-ARCILLOSO
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica Fuerte: Biotita → clorita

" Débil Feldespatos → minerales arcillosos y/o sericita

OBSERVACIONES

La oligoclase es muy acida ($Am \approx 10\%$)

Al feldes K aparece como intersticial

La moscovita está en grandes laminae por qué litica con el cuarzo

6- CLASIFICACION

Granito moscovítico y biotítico de grano fino
 370 423

Granito de dos micas de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - M
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 1 2 3 I T L B 9 5 1 4 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

Cc

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Carriero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Gata. Sierra de Gata. En la vertiente sur. Al Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micras de grano medio a grueso - porfídico

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO MICROCLINA PLAGIOCLASA BIOTITA MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO TOPACIO CIRCON OPAPOS LEUCOXENO ESFENITA ZOLISITA

262 315

CLORITA SERICITA CADLINITA CLINOZOLISITA

316

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica

m-s: *micrita, mineral arcilloso, clorita, leucoceno, rutilo, felds³⁶⁹*
 Intense: Plagioclasa → Sericita + min. arcillosos
 Débil: Biotita → clorita ± leucoceno ± rutilo ± felds³⁶⁹
 Débil: felds³⁶⁹ K → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Destacan los cristales de microcline maclado y peritizado de mayor tamaño que varía progresivamente hasta grano medio.
 La roca está tectonizada débilmente, pero tiene fracturillas con minerales de Fe. Estos además tienen los núcleos de algunas plagioclasas

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micras de grano medio a grueso

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

11231T 4A 9582 13 15 CC CC J. M. Uchida

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del area Bajar-Pbrenia

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Model granítico, muy elástico, con irregularidades ferruginas, muy microscópica, de grano medio

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION-PROBABLE... P - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HIPIDIOMORFICA HETEROGANULAR

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO PLAGIOCLASTA MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

OPACOS MINERALES-DE-HIERRO ANATASA TURMALINA RUTILO

MUCITA CLORITA FELDSPATO-POTASICO TOPACIO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Plagioclasa → sericita. Muy poco alterada

OBSERVACIONES

Ligero cataclasis
Cataclasis ácida de la plagioclasa Au = 3-5%

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 T 4 6 9 0 3 0
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de F. general

2- DATOS DE CAMPO

Granito perteneciente a la Unidad de Santibañez (Cuenca de Gata). Área con abundante fracturación - bihercinia

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide con índice de color alto, grano medio

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR PANIDIMORFICA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO PLAGIOCLASAS ZONADAS BIOTITA FELDES PATO-POTASIO

154

207

CO

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA MOSCOVITA MINERALES DE HIERRO CIRCON APATITO

262

315

TOPACIO SERICITA CAOLINITA ALBITA

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Debil: Biotita → clorita
 media: Feldes → sericita, y/o caolinita,
 Muy fuerte: Cordierita → pinita

OBSERVACIONES

Hay ^{microquartz} puntos a cristales de feldes K

Algunas asociaciones de sericita con clorita tienen un límite preciso y se supone proceden de cristales de cordierita.

Las plagioclases zonadas, bastante euhedrales, imponen el carácter panidiomorfico. La cantidad de An varia algo pero en general es oligoclasa media o alta en An.

La Ab solo aparece en contactos plagi-feldes K

Hay plagioclase que contiene cuarzo muy fino original o una asociación peritética.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370

423

GRANODIORITA BIOTITICA

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 0 2 3 J T 6 A 9 0 3 1 15 CC Savia de Figueira

2.- DATOS DE CAMPO

Fragmento de la Unidad de Santibany (Sierra de Gata).

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide de índice de color alto, grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A - BUENA... B - BUENA... B - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACIÓN - PROBABLE... P - VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, ZONAS, FELDSPATO - POTASICO, BIOTI

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOWITA, CLORITA, TOPACIO, MINERALES DE HIERRO, APATITO

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica debie - Biotita - clorita,
media Feldspatos → sericita, y caolinita,
muy fuerte. Cordierita → pinita

OBSERVACIONES

Hay tambien la asociacion de q con feldes k restando este dentro del cuarzo en forma gotiforme.

La asociacion de moscovita - clorita es claramente una pinita por lo que el mineral era cordierita.

6.- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370 423
granodiorita biotitica porfídica

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 ITLB9033 15 CC GARCÍA DE FIGUEROA

2- DATOS DE CAMPO

Granito perteneciente al aula de Sanlúcar (Sierra de Gata). Zona su abundante fracturación bidireccional.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito de de índice de color alto, alterado en parte y porfírico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTADIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAHULAR SERIADA HIPIDIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASAS ZONADAS, FELDSPATO - POTASICO, BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, CLORITA, MINERALES DE HIERRO, TOPACIO, APATITO

CIRCON, SERICITA, ALBITA, CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Debil; Biotita → clorita
Debil; Feldespatos → sericita y caolinita
Muy Fuerte; Cordierita → moscovita + clorita

OBSERVACIONES

El feldespato potasico queda geliforme dentro de laminas de cuarzo
Toda la cordierita pasa a pinita
Las plagioclases son zonadas y las medidas dan An ≈ 23 %

6- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO

granito biotítico con cordierita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1022	IT	LB	9011			SA	J. C. González Corral
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica de grano fino perteneciente a la prolempsa por el Norte de las unidades de la Sierra de Jate.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

- Granito de dos micas de grano fino, orientado

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGRANULAR ALOTRIOMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO - POTASICO, MOSCOVITA, BIOTI

154 207

TA 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, APATITO, CIRCON, TOPACIO, RUTILO, LEUCOXENO, SERICI

262 315

TA MINERALES ARCILLOSO, TURMALINA, PINNITA

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

m-s:
Dioritica media; Biotita -> clorita, agujas rutilo, leucoceno,
Plagioclasa -> sericitita, y/o minerales arcillosos
Cordierita? -> pinnitizada (pinnita)

OBSERVACIONES

- La plagioclasa es de dos tipos; - zonada, probablemente oligoclasa
- no zonada, albita con 4-8% An
- las biotitas son muy raras en inclusiones de circon, con halos pleocroicos, y apatitas.

6- CLASIFICACION

MONZONITICO, CUARZO MONZONITICO

GRANITO MONZONITICO MOSCOVITICO BIOTITICO

370 423

Granito monzonítico de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1819 DP JF 9288 T 15 19 m-José Huertas

2- DATOS DE CAMPO

granito de grano grueso con floculitas centimétricas dispersas. Se observan pequeños oligos de aplitas orientados según 155° N. La muestra está tomada en uno de estos oligos. Se

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

trabaja de un granito de grano fino con cuarzo idiomorfo y láminas de biotita.

4- EDAD

CARBONIFERO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☐ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA PORFIDICA HIPIDIOMORFA GRANO MEDIO FI MO

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO POTASICO, PLAGIOCLASA BIOTITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MUSCOVITA, APATITO, CIRCON, RUTILO, OPACOS, ILMENITA, ALLANITA

262 315

TA, SERICITA, SAUSSURITA, EPIDOTA, CLORITA

316 369

Minerales secundarios: Sericita, saussurita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

La alteración es de grado bajo-medio y se manifiesta especialmente en los núcleos de las plagioclasas que están sericitizados - saussurizados. La biotita está relativamente fresca. Se observan abundantes fracturas inter e intra-cristalinas que afectan a todo el conjunto mineralógico de la roca.

OBSERVACIONES

El cuarzo se presenta en cristales de muy variado tamaño. Es en general subidiomorfo, con tendencia a presentar bordes rectos y extinción en mosaico. Cristalizó con posterioridad a la biotita y con anterioridad a la plagioclasa, aunque se observa en cuarzo más tardío que forma junto con el feldspato potásico texturas pseudogránicas. La plagioclasa es el mineral más idiomorfo de la secuencia aunque sus tamaños son bastante variados. Es una oligoclase poco rozada que forma agregados en simbiosis. Está rodeada polisintéticamente y ocasionalmente presenta microguitas en contacto con el feldspato potásico. El feldspato potásico es albitomorfo e intersticial. Tiene pequeños perfils en venas e incipiente inicio de microclina. Incluye plagioclasa cuarzo y biotita y sirve de núcleo a la zona mosaicada tardía y secundaria que hay en la roca. La biotita es subidiomorfa y es coloreada. Forma láminas aisladas de tamaños relativamente homogéneos que en áreas se concentran en agregados en simbiosis.

6- CLASIFICACION

APLITA PORFIDICA BIOTITICA

370 423

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA
1819	DP	JF	9282	T
1	5	7	9	13

PROFUNDIDAD

--	--	--	--

15

PROVINCIA
59
19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
M. Jose Huertas

2-DATOS DE CAMPO

grainito de grano grueso porfídico con fenocristals de hste 5 cm de $\pm$ feld spa-
to y biotite que se dispone en agregados. no se observan inclusiones ni
orientación alguna.

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

graino de grano medio con feldspatos y SiO₂ relativa-
mente idiomorfo. El cuarzo es residuo.

4.- EDAD

CARBONIFERO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA..... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA..... B ☒ **P**
VALORACIÓN - PROBABLE... P
VALORACIÓN - DUDOSA..... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA PORFIDICA HIPIDOMORFA GRANO GRUESO

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTÁSICO, PLAGIOCLASA, BIODITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

262	CIRCON	APATITE	MONACITE	EPIDOTE	CLINOZOISITE	ESFENA	3
-----	--------	---------	----------	---------	--------------	--------	---

PREHUITA CLORITA BERICITA SAUSSURITA OPACOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)
La alteración es de grado medio y se manifiesta en los verbos de plapodase que están muy simplificados, simplificados. La sílaba se altera con donit - que - epídot y opacos, indudablemente por los sordos y a preliterados en menor grado se le plapodase.

OBSERVACIONES

El cuarzo forma cristales subidiomorfos de tamaños variados y con predominio de bordes rectos sobre los redondeados. Tiene extinción ondulante y en mosaico, fracturas inter e intra cristalinas y enclusiones de sodio. Cristaliza con posterioridad a la plagioclasa y a los perocristales de feldspato potásico. El feldspato potásico forma perocristales centimétricos idiomorfos y cristales milimétricos ^{medios} tardíos, albitomorfos e intersticiales. Tiene modo bicaracter y abundantes peritos en parches y en corda dispuestos oblicuamente a dicho plano de modo. En sus bordes hay albita tardía. La plagioclasa ^{micro} oligoclásica surge con pedruzcos polisintéticos que a veces ^{ocasionalmente en parches} presentan suturas de deformación mecánica. Tiene ligero zonado normal irregular en los que se deposita albita tardía o se desarrollan microquartz. Ocasionalmente se hacen observados evidentes de Andring en algún cristal. La sodio forma lentes idiomorfas kinkadas y con bordes mixtolectivos de muscovita.

6 - CLASIFICACION

370 GRANITID PORFIDICO BILITITID

ANALISIS QUIMICO ☐ 424ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 5 7 9 13
1282 ITVA 9654

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA
19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

J. C. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Placencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico de grano medio, con algunos prismas aislados de cordierita

4- EDAD

HERCINICA
21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HOMOGRAVULAR HIPIDIOMORFA
46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO PLAGIOCLASA FELDES PATO - POTASICO BIOTITA
154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA TURMALINA APATITO CIRCON CLORITA
262 315ANATASA RUTILO SERICITA
316 369

m.s. clorita, rutilo, anatasa, mica, mineral arilloso, pinnita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica débil; Biotita a clorita + rutilo + anatasa
Plagioclata a sericita y/o minerales arcillosos
Cordierita a agregados de pinnita

OBSERVACIONES

- Cuarzo en cristales anhedral con extinción ondulante, a veces formando agregados globulosos.
- Plagioclata en pequeños cristales subhedral, a veces en traucentos. Es una oligoclata formada con nucleos que llegan a andesina (28 a 32% An) y bordes de 40 a 48% An. que en contacto con feldes K tienen microgemitas, aun que esto no es frecuente. Incluyen biotita y cuarzo opticular, y en las más alcorita. Formas llegan a desarrollar pequeñas cristales de mos.
- Feldes K, en cristales anhedral intersticiales. Solo a veces es ligeramente peritítico. Incluye plag. y biot. y es corroído por cuarzo tardío en venas irregulares.
- Biotita subhedral con inclusiones de cuarzo, apatito y opacos.
- Moscovita, se desarrolla en grandes placas más o menos grandes, de bordes irregulares sobre o en los bordes, del feldes K, y de la biotita. Es secundario.
- Cordierita, transformada en un agregado de pinnita (+ biotita) que incluye en el centro un cristal de turmalina.

6- CLASIFICACION MONZONITICO, CUARZODIONZONITICO

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO
370 423

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 4223 ITVA 9671

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 J. L. González Corral

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar-Plasencia.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico porfídico, grano medio a grueso

4.- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST.: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO BIOTITA
 154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA CLORITA APATITO OPACOS RUTILO ANATASA SERICITA
 262 315

TA MINERALES-DE-HIERRO MOSCOVITA
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

m.s. clorita, anatasa, rutilo, feld-k, sericita, minerales arcillosos

- Deuterica moderada (fuerte en algunas zonas de la lámina);
- Biotita a clorita ± anatasa ± agujas rutilo ± feldspato potásico.
 - Plagioclasa a sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

- Cuarzo en agregados de varios cristales anhedralis de tamaño variable, con extensión ondulante.
- Plagioclasa en cristales subhedralis, creciendo en fragmentos. Es una oligoclita formada con núcleos de 27 a 32% An y bordes de 13 a 17%. Con pocas inclusiones, solo algunos pequeños cristales de biotita.
- Felds K, en cristales anhedralis, ligeramente peritéticos (peritéticos finos muy finos) incluyendo plag. biot y cuarzo. Etn. corral.
- Biotita en cristales subhedralis, generalmente en agregados de varios cristales, con inclusiones de apatito y uranio.
- La turmalina es intersticial y corroe tanto a biot. como plag. quedando englobados en ella fragmentos de estos.

6.- CLASIFICACION

MONZOGRAFITO, CUARZODIONITO

GRANITO MONZOMITICO BIOTITICO PORFIDICO
 370 423

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1222	IT	VA	9685			SA	J. C. Gortalo Corral
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar-Plasencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico de grano fino - aplitico, con cordierita. Parece algo orientado.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA A A VALORACIÓN - BUENA B B
- DATACION ABSOLUTA B B VALORACIÓN - PROBABLE P P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACIÓN - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HOMOGRAVULAR ALOTRIOMORFA GRANO FINO

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA CUARZO FELDSPATO - POTASICO BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA CLORITA APATITO ANATASA CIRCON SE

ALCITA MINERALES DE HIERRO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

m.s. clorita, anatasa, sericita, púrpura arilloso, pinnita

Deterioro intenso; Biotita a clorita ± anatasa

Plagioclasa a sericita y/o minerales arillosos
Cordierita a pinnita

OBSERVACIONES

- Plagioclasa, se presenta en cristales subhedrales a anhedralis muy alterados. No se puede medir con claridad. Se trata probablemente de una oligoclasa zonada.
- Cuarzo en pequeños cristales anhedralis con extinción ondulante. Arcos en cristales más grandes, globosos, de tendencia microperfidica, visibles en muestra de mano.
- Feldspato K, en cristales anhedralis intersticiales, y en ocasiones en cristales mayores, peritéticos, subhedrales de tendencia microperfidica que engloban plag. y biotita.
- Biotita en cristales subhedrales fuertemente totalmente cloritizados.
- Cordierita y moscovita son accesorios mayoritarios, estando la primera totalmente transformada a agregados de pinnita.

6- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO CORDIERITICO

Granito de grano fino (aplitico)

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1222 IT VA 9687 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

J. L. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Plasencia

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino de dos micas (esencialmente biotítico) y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HOMOGRAVULAR ALOTRIOMORFA GRANO FINO

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA FELDSPATO - POTASICO CUARZO BIOTITA MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA APATITO OPACOS CIRCON ANATASA RUTILO SERICITA

MINERALES DE HIERRO TURMALINA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

m.s.: clorita, rutilo, anatasa, sericita, minerales arcillosos
 Continúa débil a moderada; biotita a clorita + agujas de rutilo + anatasa
 Plagioclasa a sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

- Plagioclasa, en cristales subhedral a anhedral. Formada con núcleos de oligoclasa-andesina (26 a 52 % An) y bordes de albít - oligoclasa (9 a 11 % An). A veces los bordes albiticos presentan mirimequitas en contacto con felds K.
- Felds K, en cristales anhedral, intersticiales. Parece que el felds K corre a la plagioclasa.
- Cuarzo, en cristales anhedral con extrusión ondulante, a veces formando agregados globales de varios cristales.
- Biotita en cristales subhedral con inclusiones de cuarzo y apatito.
- Moscovita en cristales de formas y bordes irregulares, usualmente asociada al felds K. Esta en proporción ligeramente inferior a la biotita y es probablemente de origen secundario.

6- CLASIFICACION MONZONITO, CUARZO MONZONITA

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO MOSCOVITICO

Granito de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1223 IT VA 96 88

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

J.C. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bayar - Plasencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico porfídico de grano medio a grueso, con pinzas de cordierita (alternado)

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN

- BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAVULAR HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO CUARZO BIOTITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA CLORITA MOSCOVITA OPACOS APATITO CIRCONANA

262 315

YASA RUTILO SERICITA MINERALES-DE-HIERRO

316 369

m.s: clorita, anatasa, rutilo, sericita, mineral amarillo, pinnita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterita intensa; Biotita a clorita ± anatasa ± rutilo
 Plagioclata a sericita y/o minerales amarillos
 Cordierita a pinnita

OBSERVACIONES

- la intensa alteración y la mala calidad de la muestra no permiten observar con claridad las características de los minerales y las relaciones entre ellos.
- la plagioclata en cristales subhedrales a anhedral, a veces creciendo en crecimiento y formada una oligoclata formada con núcleos de 26 a 28% An y bordes de 11 a 14% An.
- El feldspato potásico aparece bien como grandes cristales de tendencia subhedral, machados, Carlsbad, a veces partiticos, que engloban biot. plag. moscovita y cuarzo, o bien en pequeños cristales anhedral intersticiales.
- la cordierita está totalmente transformada en pinnita
- la biotita subhedral, incluye apatito y urcon. clorita muy frecuente
- la moscovita en cantidades apreciables (pero muchos menores que la biotita) como pinnita prendiendo sobre la cordierita o asociada al feldspato y biot.

6- CLASIFICACION

MONZONITICO, CUARZO MONZONITICO

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO PORFIDICO

370 423

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1323 ITVA 9706 15 5A V. L. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Placencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito bríctico con cordierita, grano medio, algo porfídico

4- EDAD

HERCIMICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO FELDSPATO POTASICO PLAGIOCLASA BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA CLORITA TURMALINA OPACOS RUTILO

APATITO CIRCON AMATASA SERICITA

m.s: clorita, anatasa, rutilo, pinnita, sericita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteración débil; Biotita a clorita ± anatasa
clorita ± rutilo
Cordierita a pinnita
Plagioclasa a sericita

OBSERVACIONES

- Cuarzo agregados de varios cristales anhedralis con extinción ondulante.
- Feldespato potásico, en cristales subhedralis a anhedralis. Porfídico con matriz de labrador, e incluyendo plag. brt.
- Plagioclasa, en cristales subhedralis a anhedralis, zonada, con núcleos de 26-28% An y bordes de 9 a 25%. Es frecuente la existencia de bordes albiticos(?) de albita intergranular en los contactos feldes K/feld K.
- la cordierita está totalmente transformada a agregados de pinnita
- la moscovita en placas de formas irregulares asociada al feldes K, parece originada por alteración de éste

6- CLASIFICACION MONZOGANITO, CUARZOMONZONITO

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1222 IT VA 9712 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

J. L. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Páez de Soria.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico porfídico ^{granofino} orientado

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAVULAR HIPIDIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA FELDSPATO - POTASICO CUARZO BIOTITA

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA APATITO CIRCON CLORITA ANATASA SE

262

315

RICITA MINERALES DE HIERRO OPACOS

316

369

m. s. clorita, anatasa, sericita, (mucho azufre, pinnita)

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Centrica muy debil; Biotita a clorita + anatasa
 Plagioclasa a sericita y/o minerales azules
 Cordierita a pinnita (se transforma en
 un agregado de cristales entrecruzados
 de pinnita).

OBSERVACIONES

- Plagioclasa. En cristales subhedrales, zonada, con zonado normal (directo) con nucleos de oligoclasa-andesina (28-33% An) y bordes de oligoclasa (28-33% An). A veces presentan bordes de oligoclasa acida, en ocasiones con inclusiones de cuarzo. Es frecuente que presenten la huella de la periclasa además de la de la albita, muchos de los cuales acaban en pinnita (muchos de forma cónica).
- El feldes K en grandes cristales subhedrales incluyendo plag. biot. cuarzo y mosc. otros se encuentran en cristales más pequeños subhedrales intersticiales. Son parte de los (tipo patch) y normalmente presentan la huella de la microclina y los más grandes la de Carlsbad.
- Cuarzo, en agregados globulares de varios cristales subhedrales con extinción ondulante.
- Biotita en cristales subhedrales con abundantes inclusiones de apatitos idiomorfos y circon y opacos azules.
- Moscovita. Asociada a la biotita (que parece que pasa a moscov. + oxido, Fe) o al feldes K. donde presenta formas irregulares. El secundario

6- CLASIFICACION

MONZONITICO, CUARZO MONZONITICO

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO PORFIDICO

370

423

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1222	IT	VA	9714			SA	J.C. Gontalo Corral
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Páxera

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico porfídico de grano medio, con prismas de cordierita, orientado.

4.- EDAD

HERCIMICA

21

43

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
	- DATACION ABSOLUTA... B	- VALORACIÓN - PROBABLE... P
	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- DUDOSA... D
	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA FELDSPATO - POTASICO CUARZO BIOTITA

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA APATITO CLORITA CIRCON OPACOS ANA

262

315

TASA SERICITA MINERALES - DE - HIERRO

316

369

m.s: clorita, anastasa, sericita, mica amarillento, pinnita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteración débil; Biotita a clorita ± anastasa
Plagioclasa a sericita y/o minerales amarillos,
Cordierita a pinnita.

OBSERVACIONES

- Plagioclasa, en cristales subhedral a anhedral, con numerosas inclusiones de biotita y, a veces, de cuarzo. Es zonada, con núcleos de oligoclasa-andesina (28-35% An) y bordes de oligoclasa (20-23%). Algunas tienen un borde de oligoclasa ácida.
- Feldespatos potásicos en cristales anhedral, peritéticos. Los más grandes con la maca de carlsbad y numerosas inclusiones de plag. biot. cuarzo moscovita y algunos agregados de pinnita que probablemente pseudo-morfos de antiguos cristales de cordierita.
- Cuarzo en agregados globosos de varios cristales anhedral con extinción ondulante, o en cristales más pequeños intersticiales, o como venas irregulares corriendo el feldspato.
- Biotita, placas subhedral, con inclusiones numerosas de apatito y circon.
- Moscovita, parece toda secundaria, asociada al feldspato en placas de formas irregulares; asociada a la biotita (con opacos y/o ex. Fe de exolución); en la variedad pinnita pseudomorfando cordierita.

6.- CLASIFICACION

MONZONITO, CUARZOMONZONITO

GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO PORFIDICO

370

423

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
12345678910111213141516171819			ITVA9716			SA	J. C. González Torral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Plasencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico de grano medio - grueso, porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A ☒ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
 - DATAION ABSOLUTA... B ☐ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☐
 - DATAION PALEONTOLOGICA... C ☐ VALORACIÓN - DUDOSA... D ☐

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGRAVULAR ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA CLORITA TURMALINA APATITO OPACOS

CIRCON ANATASA RUTILO SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

m.s.: clorita, anatasa, rutilo, sericita, mica/arillo, pinnite
 Dentérica débil a moderada; Biotita a clorita + anatasa + agujas rutilo
 Plagioclasa a sericita y/o minerales acilinos
 Cordierita a agregados de pinnite

OBSERVACIONES

- Plagioclasa, en cristales subhedral a anhedral, creciendo en fragmentos. Es una oligoclasa zonada con núcleos de 27 a 29% An y bordes de 12 a 14% An.
- Cuarzo en cristales anhedral con extinción ondulante formando agregados globulares.
- Feldspato potásico, en cristales anhedral, peritéticos, intersticiales. A veces incluyen pequeños cristales de plagioclasa.
- Biotita en cristales subhedral a anhedral, generalmente en agregados, con inclusiones de cuarzo y apatito y opacos.
- Moscovita en cristales anhedral a subhedral asociados al feldspato y/o a la biotita.
- Cordierita en cristales prismáticos transformados a pinnite.
- Turmalina en cristales anhedral intersticiales corroiendo tanto al feldspato como a la plagioclasa.

6- CLASIFICACION

MONZONITICO, CUARZOMONZONITICO
 GRANITO MONZONITICO BIOTITICO CORDIERITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1228 IT VA 9781 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

J. C. González Torral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Bejar - Plasencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito histítico con cordierita y tenorio de grano medio.

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HOMOGRAVULAR HIPIDIOMORFA GRANO FINO-ME
 46 99

DIDO
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA CUARZO BIOTITA
 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA MOSCOVITA CLORITA PACOS APATITO CIRCON SER
 262 315

ICITA MINERALES DEL HIERRO
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Denteña muy débil; Biotita a clorita,
 Plagioclasa a tenorio, y/o minerales arcillosos,
 Cordierita a una agregada de moscovita y clorita

OBSERVACIONES

Texturalmente hay que destacar el carácter orientado marcado sobre todo por las biotitas que se disponen paralelamente. Mineralógicamente destaca la ausencia prácticamente total de plagioclasa potásica.

- Plagioclasa, en cristales subhedrales a anhedral. Es una oligoclasa a veces ligeramente zonada; que incluye pequeños cristales de biotita.

- Cuarzo en cristales anhedral, generalmente alargados según la foliación y con extinción ondulante.

- Biotita en cristales subhedrales, dispuestos paralelamente marcando la foliación de la roca, con inclusiones de cuarzo y apatito. Es muy frecuente el gran biotita bordeado a moscovita con óxidos de Fe en los planos de exfoliación.

- Moscovita, además de la asociada a biotita, aparece también en placas anhedral de bordes irregulares. Toda probablemente secundaria.

Se trata probablemente de un enclave microgranuloso dentro del granito.

6- CLASIFICACION

CUARZO - TONALITA
 370 423

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROFUNDIDAD
 14 15 16 17 18 19

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

V. C. González Corral

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del área Beja - Plasencia.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito biotítico con tamaño de grano medio y cordieritas aisladas.

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR HIPIDIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA CUARZO BIOTITA FELDSPATO - POTASICO MOSCOVITA

154

207

TA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO OPACOS CLORITA CIRCON ANATASA RUTILO SERICITA

262

315

MINERALES DE HIERRO XENOTIMA

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteración muy débil; Biotita a clorita, + anatasa, + agujeros rutiles,
 Plagioclasa a sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

- Plagioclasa, en cristales subhedral a anhedral con inclusiones de biotita. Es una oligoclasa formada con núcleos de 26 a 30% An y bordes de 20 a 46% An.
- ~~Feldspato potásico~~
 Cuarzo, en cristales anhedral con extinción ondulante, y veces formando agregados globales de varios cristales.
- Biotita en cristales subhedral a anhedral con numerosos inclusiones de circon y apatito. Además de la clorificación para hacia los bordes frecuentemente a moscovita que dando óxidos de Fe como sobrante de la transformación biot → mosc.
- Feldspato potásico en cristales anhedral, intersticiales. Esta es mucha menor proporción que plagioclasa.
- Moscovita en pequeños cristales subhedral asociada a la biotita con óxidos de Fe en los planos de exfoliación o en grandes placas anhedral de bordes irregulares. Toda parece ser secundaria (biot → mosc). Toda parece secundaria.
- En la pequeña proporción de feldsp. a plag. y cuarzo se puede considerar la roca como una verdadera granodiorita.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370

423

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9002 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 C.C. 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueirola

2.- DATOS DE CAMPO

Roca perteneciente al plutón de Tolama (Sierra de Gata).
 C - abundante fracturas - induración.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito leucocrático de grano fino con algún fenocristal pequeño. Tectonizado

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVI

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, RUTILO, CIRCON, APATITO, TOPACIO, SERICITA, MINERA

262 315

316 369

Alteraciones secundarias: clorita, rutilo, sericita, caolinita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL { Biotita → clorita + rutilo
 Feldespatos → sericita y/o caolinita

OBSERVACIONES

La oligoclasa es muy acida. An ≈ 12%

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

370 423

Granito de grano medio y de dos micas, algo tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 102357689003

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Cortés de Fiqueral

2- DATOS DE CAMPO

Roca perteneciente al plutón de Tolosa (Sierra de Guadalupe)
 con abundante fríasmao taliberrina

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático de grano fino alterado y teñido

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada hipidiomorfa

46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo feldespato-potásico plagioclasa moscovita biotita

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

clorita rutilo minerales de hierro topacio apatito

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA INTENSA { Biotita → clorita + rutilo
 feldespato → sericita y caolinita

OBSERVACIONES

El feldes es tan abundante como el Q y este aparece, a veces, como gotas
 dentro de aquel.
 Las plagioclasas muy alteradas no permiten sus mediciones en Au con garantía
 La sillimanita está siempre dentro de la moscovita

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

370 423

granito de dos micas cloritizado y teñido

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 IT 689007 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Rocas graníticas del Plut. de Jalama (Sierra de Gata).
6 - feldespato - biotita abundante.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático grano fino y porfídico con turmalina

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO CUARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

154 207 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA CLORITA RUTILO TOPACIO CASITERITA CIRCON

262 315 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

minerales secundarios: clorita, sericita, minerales arcillosos.

DEUTERICA { DEBIL: Biotita → clorita
MEDIA: Feldes. → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La turmalina es bastante abundante en parte de la preparación.
Hay ~~veces~~ finas fisuras paralelas entre sí que atravesaban los fenocristales y la turmalina pero tienden a bordear las micas. Tienen en su interior óxidos de Fe y no parecen ligadas a ningún accesorio.

6- CLASIFICACION

GRANITO TURMALINIFERO DE DOS MICAS

370 423

Granito de dos micas turmalinífero y porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023 JT 409019 13 15 CC 19 García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente al plutón de Jabana
Sierra de Gata - abundante fracturación - bidireccional

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HOMOGANULAR ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO MOSCOVITA ALBITA FELDSPATO - POTASICO

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, APATITO, CIRCON, MINERALES DE HIERRO, SERICITA

MASITERITA CAOLINITA BIOTITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Muy débil

OBSERVACIONES

solo se han localizado uno o dos cristales de Biotita dentro de un cristal de cuarzo.
La roca está muy fracturada lo que se nota fundamentalmente en los folios.
La Plagioclasa, bastante fresca aunque fracturada, tiene An - 9 - 12 % por lo que
se considera Albita ya que el valor de 9 es el más frecuente

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
102317409020 15 CC Spina de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

Gran granito perteneciente a la Unidad de Santibañe
Serena de Figueras. En abundante fracturas tardihercinicas

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático porfídico con alguna orientación de los fenoblastos

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CIRCON, TOPACIO, CLORITA, SILLIMANITA, SERICITA, MINERALES

DE-HIERRO, CAOLINITA, APATITO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL
Biotita → clorita
Feldes → sericita y/o

OBSERVACIONES

El porfirismo se debe a el feldes.k que engloba el resto de los componentes.
La sillimanita esta en aguijas dentro de la biotita moscovita y pasa a los cristales
de cuarzo

6- CLASIFICACION

GRANITO PORFIDICO DE DOS MICAS

Granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CE

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Spacia de Fiqueloa

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica de la Unidad de Santibañez (Sierra de Gata). Zona con abundante fracturación tardíhercínica.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito leucocrático porfídico con orientación de los fenocristales

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIDOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, OLIGOCCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, CLORITA, CLARCON, APATITO, MINERALES-DE-HIERRO

TOPACIO, RUTILO, SILICIMANITA

Minerales secundarios: Clorita, opaco, sericita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { BIOTITA → clorita + topacos
 FELDSPATOS → sericita

OBSERVACIONES

Solo se ha visto un cristal de moscovita con agujas de sillimanita.
 La roca tiene algo de textura "flaser" y algo de orientación en los fenocristales de Feldes. K.

6- CLASIFICACION

GRANITO PORFIDICO DE DOS MICAS

granito de dos micas porfídico y orientado

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 10231TLB9133

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueira

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata. En el Rebollar. Sur de la provincia de Salamanca.
 Hacia el centro de la unidad.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de color gris claro medio y porfídico en algunas partes de la muestra.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAHULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, FELDESPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, PINITA, SERICITA, CIRCON, APATITO, MINERALES DE

HIERRRO, RUTILO, MINERALES ARCILLOSO, CLORITA, ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Debilitada débil: Biotita → corinto y opaco,
 " " feldespatos → minerales arcillosos,
 " fuerte: Andalusita → sericita,
 " Cordierita → pinita.

OBSERVACIONES

Las plagioclasas (Oligoclasa) esta zonada y los valores del borde son $An = 18$. Hay tambien en albita puro al feldes K y forma algo de microclino.
 Las asociaciones piníticas son de contorno tipico de Cordierita.
 La proporción de oligoclasas frente a feldes K es alta por lo que hay un cierto caracter monzonítico.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE LAS MICAS
 GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA Y ANDALUCITA

Granito de las micas con andalusita y tendencia monzonítica

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 IT 6 B 9 138 15 SA García de Figueiró

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de gata Sierra de Gata. En la península charra
sur de la provincia de Salamanca

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo de grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A 44
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 HOLOCRISTALINA HETEROGRAFIKALAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, Biotita, MOSCOVI

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, TURMALINA, SERPICITA, CLORITA, TOPACIO, CIRCÓN,

APATITO, RUTILO, LEUCOXENO, MINERALES-DE-HIERRO, MINERALES

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

ILLOSOS *Minerías secundarias: Sericita, clorita, minerales arcillosos*
 NES (TIPO Y GRADO)
 Total - Cordillera → Sericita + clorita
 Media - Andalucía → Sericita
 Baja - Biotita → clorita
 Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El porfirismo se debe tanto al feldespato potásico como a las plagioclases. Estas
zonas tienen en el borde Ab micronequítica.
La cordierita ha pasado íntegramente a una asociación de clorita + sericita.

6 - CLASIFICACION

6- CLASIFICACION DE DOS MUJERES

granito de grano grueso porfídico y de las lencas con andalucita.

ANALISIS QUIMICO	☐	ANALISIS MODAL	☐	PLUTONICA - P	☐
424		425		HIPOBISAL - H	☒
				VOLCANICA - V	426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9118			SA	García de Figuearola
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de gata. Sierra de gata. En la penillanura charra
Suro de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo grisáceo y de grano grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRIPTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, THERMALINA, TOPACIO, MINERALES DE HIE

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuelle - Andaluca → sericita,
Debie. Biotita → clorita, Feldespatos → mica. Arcillosos

OBSERVACIONES

las plagioclasas estan en cristales grandes y redondeos y a veces con algo de twinning
quita hacia el borde.
solo se ha localizado sillimanita en un punto junto a la andaluca.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE LAS HICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito de las hicas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 1 T L B 9 1 0 2
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Gerardo de Figueiró

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata. En el Rebollar Sur de la provincia de Salamanca
 cerca del contacto

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano medio a grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

H O L O C R I S T A L I N A H E T E R O G R A N U L A R P O R F I D I C A H I P I D I O M O R F O
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

C H A R Z O F E L D E S P A T I O - P O T A S I C O P L A G I O C L A S A B I O T I T A M O S C O V I T A
 154 207

V I T A
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

A N D A L U C I T A P E N N I N A S E R I C I T A A P A T I T O T U R M A L I N A C I R C O N
 262 315

M I N E R A L E S - D E - H I E R R O T O P A C I O R U T I L O M I N E R A L E S A R C I L L O S
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → pennina y rutilo
 Feldespatos → minerales arcillosos y/o sericita.

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas, cerca del borde dan An ≈ 18
 La andalucita es bastante abundante pasa a sericita y a veces esta incluida en las
 plagioclasas.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO B I O T I T I C O C O N M O S C O V I T A
 370 423

granito de dos micas con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITAB 9103 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueas

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de launidad de Gabo. Sierra de Gabo. En la penillanura charra.
 Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono gris-amarillento, grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina hetero-granular seriada hipidiomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, PERNINA, PINNITA, TARMALINA, APATITO, RUTILO, CIR

CON MINERALES-DE-HIERRO, MINERALES ARCILLOSOS, TOPACIO

CORDIERITA, SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { INTENSA - Cordierita → Pinnita, Andaluca → sericita
 media → biotita → pernina, y feldes. minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Los cristales mayores que aparecen en la preparación (no en la muestra de mano)
 son de plagioclasa por lo que el granito tiene tendencia monzonítica. Las
 plagioclasas son zonadas.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico con MOSCOVITA

granito porfídico, de dos micas y monzonítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JT LB 9101 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Fyfe

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata en el Rebollar. Sur de la prov. de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACIÓN - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

B

P

D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, ANDALUCITA, APATITO, CIRCON, MINERALES-DE- Hierro,

262 315

TURMALINA, TOPACIO, SERICITA, MINERALES ARCILOSOS, RUTILO

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → Plúmina,
 Feldespatos → sericita, y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

algunos agregados de moscovita deben proceder de una cordierita.
 Las plagioclasas son zonadas y su mayor parte es de oligoclases
 Los grandes cristales son en realidad un "pach" de feldes. K y plagioclases acida
 e incluyen otros componentes incluso la andalucita o esos agregados de
 moscovita que proceden (probablemente) de la cordierita

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito de dos micas con andalucita y Turmalina

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 7 9 0 9 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de F. G. G.

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata en la región del Rebollos. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de color algo rosado. de grano medio a grueso y con porfirismo

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, PINITA, TOPASIO, CIRCON, ANDALUCITA, MINERALES-DE

262 315
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DENTRICA MEDIA - Biotita → clorita
 feldspatos → minerales arcillosos, sericitas.

OBSERVACIONES

Algunos apatitos son radiactivos.
 Las plagioclasas son zonadas con mayor alteración hacia el centro. No se observa epidoto y las medidas hacia el borde son $Al \approx 18\%$. El color rosado de la roca se debe a óxidos de Fe según los planos (010) y (001) fundamentalmente la pinita procede de cordierita en cristales pequeños.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423
 granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10231T4B9094 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Riquelme

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata - Sierra de Gata. Ladera Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grano fino y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, ALBITA, PENNINA, RUTILO, CIRCON, TOPA

CILC, APATITO, MINERALES DE HIERRO, MINERALES ARCILOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA INTENSA - Andaluíta → sericita
 MEDIA + Biotita → Pennina + Rutilo
 Feldespatos → sericita + minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El cuarzo es a veces gotiforme dentro de los feldespatos
 las plagioclasas son zonadas y a veces los fenocristales del porfirismo son de ella
 Independientemente hay albita en perfitas

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO DE GRANO FINO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de grano fino, de dos micas y andalucítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9095			SA	García de Piquero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. Ladera Norte. Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito leucocrático, de tono grisáceo y grano de fino a medio

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C ☐ 44 - DUDOSA... D ☐ 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAULAR SERIADA ALOTRIDOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CIRCÓN, APATITO, RUTILO, TOPACIO, MINERAL

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA Fuerte - Andaluca → Sericita

" Débil Biotita → clorita

Feldes. → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La Biotita aparece en grandes láminas

Las plagioclasas están debilmente zonadas. Los valores medios son de An 10%

Hay además Ab. perthita.

6- CLASIFICACION

Granito de dos micas
GRANITO DE GRANOFINO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

Granito de grano fino de dos micas y andalucítico

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
HIPOBÁSAL - H ☐
VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JTB 9091 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 García de Argüelles

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad granítica de Gata. Sierra de Gata. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino a medio

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☐ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO ALBITA BIOTITA MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, PENNINA, PINNITA, SILIMANITA SERICITA APATITE 262 315

CIRCON, MINERALES-DE-HIERRO, RUTILO, MINERALIZ, ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → Pennina y rutilo
 Feldespatos → minerales arcillosos
 Andaluca → sericita,
 Cordierita → pinnita.

OBSERVACIONES

No se observa la cordierita pero son típicos los agregados redondeados de sericita + clorita o pinnita.

La andaluca siempre tiene un halo de sericita y se encuentra a veces dentro de los feldespatos

La Albita An ≈ 8-9 puede ser algo mas básica hacia el centro porque hay una débil tendencia al zonado

6- CLASIFICACION

GRANITOIDE DE GRANO FINO BIOTITICO 370 423

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
 HIPOBÁSAL - H ☐
 VOLCÁNICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 1 T 6 8 9 0 9 2

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 Perce de Fralab

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad granítica de Gata. Ladera norte de la sierra de Gata. Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino y porfídico. Atravesado por un filoncillo cuarzo feldespático

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGRAHULAR SERIADA ALOTRIOMORFA
 46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA MOSCO
 154 207
 VITA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA CLORITA SERICITA RUTILO APATITO CIRCON MINERAL
 262 315
 RALES - DE - HIERRO, SILLIMANITA, MINERAL, ARCILLOSOS
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA INTENSA Biotita → clorita + rutilo y/o feldespato potásico
 ANDALUCITA → sericita
 DABIL - Feldspatos → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Se dan como plagioclasas sin determinar porque hay valores en torno al 10% de An; y hay muy débil tendencia al zonado

6- CLASIFICACION

GRANITO DE Dps MICAS

GRANITO DE GRANO FINO BIOTITICO Y MOSCOVITICO
 370 423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JTL 09093 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Corre de Figueira

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad granítica de Gata. Ladera norte de la sierra de Gata. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HETEROGRAFIAR PORFIDICA HOLOCRISTALINA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, RUTILO, APATITO, SILLIMANITA

MINERALES DE HIERRO, CIRCON, MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIO { Biotita → clorita + rutilo
 Andalucita → sericita
 Feldespatos → minerales arcillosos y sericita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas estan debilmente zonadas. Tienen valores de 8-12% de An.
 Hay algunas Albita por perthitización de los cristales grandes de feldes K
 la cantidad de Andalucita es apreciable y aparece, a veces, dentro de las
 plagioclasas.
 Algunas asociaciones de sericita-clorita tienen contornos redondeados o cuadráticos
 típicos de la cordierita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE LAS MICAS

GRANITO DE GRANO FINO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de grano fino, porfídico, de las micas con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9070			CC	García de Figuerola
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Galana - Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide de grano fino a medio y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☐
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☒
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO OLIGOCLASA BIOTITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA CLORITA MINERALES - DE - HIERRO CIRCON APATITO

262 315
316 369

ALBITA *Minerales secundarios: clorita, rutilo, minerales arcillosos, sericita*

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA - Biotita → clorita + rutilo

debil

feldspatos → minerales arcillosos y/o sericita.

OBSERVACIONES

La oligoclasa aparece zonada y las medidas dan una media de An ≈ 22%. Independientemente hay algo de Ab tardía en un proceso de albitización en los contactos plagioclasa - Feldes K. Este actinoma está peritizado y a veces incluye algo de plagioclases que a su vez contiene feldes K dentro.

La cantidad de sillimanita es muy pequeña. Quizás parte de la sericita y/o moscovita proceda de cristales de cordierita.

6- CLASIFICACION

MONZONITA

GRANITO MONZONITICO - BIOTITICO

370 423

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTONICA - P ☐
HIPOBISAL - M ☒
VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 JTL09069

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Salamanca. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano fino y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALLINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, APATITO, MINERALES-DE-HIERRO, CLORITA, TOPACIO

SILLIMANITA, ILMENITA, CIRCON, MINERAL ~~de~~ ARCILLOSOS, ALBITA, SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL } Biotita → clorita,
Feldspato → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son bastante euhedrales y casi siempre zonadas

Hay lunetas pulo a algunos cristales de feldes K.

La sillimanita se encuentra dentro de laminas y agregados de moscovita que pueden, quizas proceder de cordierita.

La clasificacion se realiza segun las recomendaciones del IUGS

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

Granito monzonitico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	1	5	7	9	13	15	19
						40	Spacia de Figueroa

2- DATOS DE CAMPO

En la unidad de Jálama - Sierra de Jala. Norte de la provincia de Caceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de leucocrático, algo teñido por oxidos y de grano medio

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTI

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, CIRCON, TOPACIO, RUTILO, ANATASA, APATITO, MINERAL

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DENTERICA DEBIL

Mineral secundarios: Clorita, Sericita, minerales arcillosos
Biotita → clorita
Feldespatos → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Hay principio de una blastesis feldespatica con tendencia debil al porfirismo. Engloba los de mas componentes, entre ellos a plagioclasas que tienen el centro constituido por feldespato potasico. El mismo fenomeno se origina con el cuarzo
La oligoclasa es muy acida - An ≈ 11%

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO B BIOTITICO

370 423

Granito de las Micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JT LB 9062 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueirala

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañer - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Caceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA BIOTITA MOSCOVITA

154 207

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA RUTILO APATITO CIRCON TOPACIO EPIDOTA MINERA

262 315

LES-DE-HIERRO SILLIMANITA SERICITA MINERALES ARCILOSOS

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Debilita debil - Biotita → clorita
 Feldespato K → minerales arcillosos + sericita
 Oligoclasa → " " " + epidota.

OBSERVACIONES

Hay una debil tendencia hacia el porfirismo por el mayor crecimiento de algunos cristales de microclina que engloban otros componentes. El Feldespato potasico domina mucho sobre las plagioclasas.

La Sillimanita se encuentra dentro de unas circulares laminas de moscovita, y de algunos cuarcos.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO Y MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO

370 423

granito de dos micas de grano grueso

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9058

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

CC

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Santibañer - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano grueso, algo porfídico. sin orientación visible

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, APATITO, CIRCON, SERICITA, MINERALES-DE-HIERRO

RUTILO, SILLIMANITA, EPIDOTA, MINERALES-DE-BAJOCALCOPROTECTOR, ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

OBSERVACIONES

Algunos fenocristales de feldespato potásico (microclina) están "recubiertos" por oligoclasa.
Y la oligoclasa es a veces de tendencia subhedral y debilmente zonados. Las medidas dan An. 16-18 %

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO Y MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO

Granito de dos micas y grano grueso

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - VP
426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 7 9 13
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 García de Figueirola

2.- DATOS DE CAMPO

Para granitos perteneciente a la Unidad de Sanfeliu de Noya (Cuenca de Galt). Área con abundante fracturación tardohérmica.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide de índice de color alto grano medio a grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada alotriomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo, Plagioclasa zonada, Feldespato potásico, Biotita

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Muscovita, Clorita, Circon, Apatito, Minerales de Hierro

Topacio, Rutilo, Sericita, Caolinita, Epidota, Albita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Debil: Biotita → clorita, rutilo,
 media: Feldespatos → sericita, y/o caolinita,
 muy fuerte: cordierita → sericita + muscovita + clorita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas zonadas pueden formar mixtequitas hacia el borde que es la zona menos alterada - las medidas obtenidas varían en torno a $An \approx 25\%$.
 La cordierita, a veces en cristales grandes, está totalmente convertida en sericita + clorita + muscovita = Pinita

6.- CLASIFICACION

Granodiorita biotítica

Granodiorita biotítica con cordierita

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 J T L B 9 0 3 2

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Granito de la Unidad de Santibañe (Cuenca de Gálvez)
Hacia el suroeste facturas tardíhercinicas

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de índice de color alto, grano grueso y algo porfidico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS ZONADAS, Biotita, ^{calcica}

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Moscovita, Clorita, MINERALES-DE-HIERRO, Apatito, Circon

Rutilo, Topacio, Zoisita, Albita, Sericita, Caolinita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERICA { Debil { Biotita → clorita + rutilo y zoisita,
Feldspatos → sericita y caolinita
Muy fuerte - Cordierita → sericita + clorita

OBSERVACIONES

El feldes k aparece a veces como restos patiforme dentro de cuarzo
No queda nada de Cordierita
La Albita aparece en el borde de plagioclasas mas calcicas

6- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO

Granito biotítico de tendencia monzonítica

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 J T L B 9 0 2 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2.- DATOS DE CAMPO

granito gris grano grueso con microenclaves de la Unidad de Santibañez
 (Cuenca de Gata)

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito gris grano grueso con microenclaves

4.- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR HIPIDIOMORFICA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASAS ZONADAS, BIOTITA
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, CLORITA, SERICITA, MINERAL DE HIERRO, CIRCON
 262 315

TOPACIO, APATITO, ANDALUCITA, SILIMANITA, CAOLINITA
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → clorita
 feldspato → caolinita y sericita
 fuerte { andalucita → sericita y moscovita
 cordierita → pinita

OBSERVACIONES

Hay dos partes. La de grano fino esta constituida por Cuarzo + biotita a los que se le une moscovita con andalucita + sill. en su interior y clorita asociada a sillimanita en nodulos que probablemente fueron de cordierita se interpreta como xenolitos

6.- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO
 370 423

granito biotitico con xenolitos

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9026

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente a la Unidad de Santibañ
 (Sierra de Gata). Se es abundante fisilaminas - también
 lina.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático grano medio porfídico y texturizado y alterado

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR PANIDIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASAS, ZONADAS, FELDSPATO-POTASICO, BIOTI

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MUSCOVITA, MINERALES DE HIERRO, SERICITA, CLORITA, CIRCON

262

315

RUTILO, APATITO, TOPACIO, GRAVATE, CORDIERITA, ALBITA, CA

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA / debil - Biotita y clorita
 Fuerte - Feldes $\rightarrow$ caolinita y sericita

OBSERVACIONES

Algunas plagioclasas que se han medido en su parte media dan $Aw \approx 18\%$

La cordierita, muy poca, esta pinnitizada

Solo se han visto los granates y muy pequeños

Hay abundantes microequitas en torno a los cristales grandes de feldes $\rightarrow$ junto con algo de Albita.

6- CLASIFICACION

GRANITO MONZONITA

370

423

GRANITO Monzonítico biotítico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 1023ITLB9028

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Granito leucocrático alterado de grano medio a grueso algo porfídico, def arena de
 Suroeste (Lima de faja)

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

algunos porfidos granito leucocrático alterado de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, ZONADAS, FELDSPATO-POTASICO, BIOTI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, MINERALES-DE-HIERRO, SILLIMANITA, CIRCON,

TOPACIO, APATITO, CLORITA, SILLIMANITA, SERICITA, CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Mineral secundario: Clorita, caolinita
 DETERICA { muy debil - Biotita → clorita
 media - feldspatos → sericita/caolinita

OBSERVACIONES

Esta lamina consta de dos partes: una de ellas es la descrita en la textura. La otra es de grano fino sin feldos K y en ella las laminas de moscovita contienen mucha sillimanita. Hay además sericita que debe proceder de otro mineral desconocido estabilizado integralmente. Se le considera como un xenolito.

6- CLASIFICACION

GRANITO Biotitico

Granito biotítico con micro inclusiones

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - M
 VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 10231T4B9004

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del plutón de Jalama. (Sierra de Guadalupe)
 a - deformación tardía

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito de dos micas, grano fino y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada hipidiomorfa
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRIETALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo feldespato-potásico oligoclasa biotita moscovita
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Sericita sillimanita circon rutilo casiterita topacio
 262 315

Clorita caolinita apatito minerales de hierro
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerías secundarias: clorita, rutilo, sericita, caolinita
 DEUTERICA, debil - Biotita $\rightarrow$ clorita + rutilo
 media: feldes $\rightarrow$ sericita y caolinita.

OBSERVACIONES

El feldes $K \gg$ que la plagioclasa ($An \approx 14$)
 La sillimanita se encuentra dentro de las lamíneas de moscovita y también del
 cuarzo

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS
 370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 5 7 9 13
1023JT 6B9005

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

forja de Figueras

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del plut. de Jalama (Cena de Gila)
6 - fracturas - andesinica

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano fino algo porfídico. Alterado en parte

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO CUARZO OLIGOCLASA BIOTITA MOSCOVI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA SERICITA SILIMANITA CASITERITA MINERALES DE

HIERRO TOPACIO APATITO CERCON CAOLINITA RUTILO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

minerals secundarios: clorita, rutilo, sericit, caolinita
DEUTERICA { DEBIL - Biotita → clorita + rutilo
Media - feldes → sericita + caolinita

OBSERVACIONES

El feldes K sufre a una blastesis por lo que incluye los de reos correspondientes

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

Granito de dos micas algo alterado

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	40	9001			CC	Correa de Figueroa
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica perteneciente al plutón de Jalama (Sierra de Gata)
 con abundante fracturación tardía

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano fino leucocrático. alterado sin orientación visible

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA PLAGIOCLASAS

BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO CIRCON RUTILO APATITO CASITERITA

SILLIMANITA CADLINITA MINERAL ES-DE-HIERRO SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerals secundarios: Clorita, rutile, mineral arcilloso, sericita

DEUTERICA - Fulsas: Biotita → Clorita + rutile

Feldes → minerales arcillosos y/o sericita

OBSERVACIONES

el Feldes x >> que las plagioclasas. dos miedidos en estas clau Am ≈ 11 %
 Algod de cuarzo es gotiforme en los feldes.
 La sill está dentro de la moscovita y este mineral está flexionado

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

Granito de dos micas cloritizado algo textonizado

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 I T 4 B 9 0 0 8 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Feria de Fregenal

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del Alto de Jabana (Sierra de Guadalupe)
 - abundante feldespato - tardihercinica

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito leucocrático de grano medio a grueso y porfídico. Tectonizado

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO CHARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA CLORITA CIRCON MINERALES DE HIERRO SERICITA

262 315

APATITO TOPACIO

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { media - Biotita → clorita mas opaca y/o feldespato potasico
 Feldespato → sericita y/o caolinita

OBSERVACIONES

La oligoclasa da un contenido en Au ≈ 14

6- CLASIFICACION

GRANITO TURMALINIFERO DE DOS MICAS

370 423

Granito de las micas turmalinífero

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 1023 JT 689009

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del plutón de Jabana (Sierra de Gata). S. de donde fracturación tardohercinica

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito gris grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

21

43

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACIÓN - PROBABLE... P

- DUDOSA... D

B

45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO CIRCON SERICITA MINERALES DE HIERRO

CAOLINITA TURMALINA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA INTENSA - Biotita → clorita
 Feldespatos → sericita y/o caolinita
 Turmalina → sericita
 Topacio → sericita

OBSERVACIONES

Es interesante la alteración de la Turmalina en sericita según planos de fractura
 localizados entre los

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

370 423

granito de dos micas.

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

D

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 CC *García de Figuearola*

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del plutón de Jabalón (Sierra de Gata)
abundante fracturación tardíhercínica

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático grano medio a grueso, algo porfídico

4.- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C VALORACIÓN - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA 46 99

CATACLASTICA 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASAS MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MINERALES DE HIERRO TURALINA TOPACIO RUTILO CLORITA 262 315

SERICITA CAOLINITA 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA FUERTE - Feldespatos → caolinita y sericita

OBSERVACIONES

La turalina aparece en granos discretos dentro de los feldespatos y a las micas
Hay muy poca biotita y en consecuencia clorita
Parte del feldes y tiende a formar fenocristales (perfitizados) en una blastesis tardía

6.- CLASIFICACION

GRANITO CATACLASTICO, GRANITO MOSCOVITICO 370 423

Granito cataclástico moscovítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 JTLB9011 15 CC GARCIA DE FIGUEROA

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica del plutón de Jabana (Sierra de Gata) con abundante fracturación hercínica

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito leucocrático grano grueso porfídico y tectonizado

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B A VALORACION - PROBABLE... P B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

CATACLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA MINERALES DE HIERRO CIRCON TOPACIO APATITO

SERICITA RUTILO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: clorita, vermiculita, opacos

DEUTERICA INTENSA - toda la biotita ha pasado a clorita (en parte vermiculita) + minerales opacos.

OBSERVACIONES

La oligoclase es casi albita pues $An \approx 10-11\%$
La proporción de feldes a Plagio es casi 1
La roca está algo triturada y las laminas de ~~biotita~~ moscovita flexionadas.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

granito cloritizado

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 02 3 5 7 9 0 2 1 13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

CC

Soria de Figueira

2- DATOS DE CAMPO

Roca granítica peralutal a la abundancia de
Santibañe (Gran de Gela), Abundante fracturas - bñher-
cinica.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito gris, de grano fino y porfidico

4- EDAD

HERCINICA

21

43

- POSICION EST:ATIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION - PROBABLE... P

- BUENA... B

- DUDOSA... D

B

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46

99

100

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO CHARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTI

154

207

TA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA SERICITA CIRCON APATITO MINERALES - DE - HIERRO

262

315

TOPACIO CAOLINITA RUTILO

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERICA FUERTE / Biotita → clorita y minerales de hierro
Feldespato → sericita y/o caolinita

OBSERVACIONES

La sericita forma bandas sinuosas que recorren la preparación o bien a modo de nodulos
que indican proceden de la total transformación de un mineral
La moscovita en laminaas grandes esta parcialmente frías
El caracter porfidico se debe a la blackesis del feldes K que engloba los
otros componentes

6- CLASIFICACION

GRANITO PORFIDICO MOSCOVITICO

370

423

Granito moscovítico porfidico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P

HIPOBISAL - H

VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 5 T 6 9 0 2 3

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Soria de Fiqueras

2- DATOS DE CAMPO

Rancho granítico perteneciente a la Unidad de Santa Cruz (Sierra de Guadalupe). Rocas abundante fracturas - tardías
 cénicas

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático, porfídico con los fenoblastos orientados

4- EDAD

HERCINIANA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, CLORITA, TOPACIO, CIRCON, MINERALES-DE-HIERRO,

APATITO, CAOLINITA, ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { *mineral secundarios: clorita, opacos, sericit, caolinita*
 Biotita → clorita + opacos
 Feldes K → sericit y caolinita

OBSERVACIONES

Junto a los fenoblastos (tardíos) de feldes K, a parece algo de albita

6- CLASIFICACION

GRANITO PORFIDICO DE DOS MICAS

granito porfídico de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 ITLB 9024 13 15 CC 19 Grava de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

Granito de la Unidad de Santibany (Sierra de Gata)
 con abundante fracturas tardías

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito gris grano fino a medio algo porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada panidiomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO OLIGOCLASA MOSCOVITA Bioti

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, GILLIMANITA, MINERALES-DE-HIERRO, CLORITA, CIRCON

SERICITA CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL

OBSERVACIONES

La sillimanita, dentro de la moscovita, dibuja arcos poligonales.
 Los cristales mayores son de Feldes. K que engloban los otros componentes.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

granito de dos micas con sillimanita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 I T L B 9 0 2 5

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Gracia de Figueroa

2.- DATOS DE CAMPO

granito leucocrático, alterado grano medio porfídico perteneciente a la Unidad de Santibonay (Sierra de Fajal).
de Santibonay (Sierra de Fajal).

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático alterado; grano medio porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS - ZONADAS, BIOTI

TAMOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, SERICITA, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO, CIRCON,

RUTILO, TOPACIO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA MUY FUERTE

Mineral secundarios: Clorita, opacos, feldspato-potásico, sericita, caolinita.
Biotita → Clorita + opacos y/o Feldspato potásico
Feldes → Sericita y/o caolinita

OBSERVACIONES

Las proporciones de feldes a plagioclasa son muy próximas al 1:1. es poco monzonítico
En buena parte de la preparación hay textura equigranular

6.- CLASIFICACION

GRANITO MONZONITA

granito monzonítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 CC García de Figuearola

2.- DATOS DE CAMPO

Grutas perteneciente a la Unidad de Santibañez (Sierra de Gata). Roca con abundante feldespato y biotita.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de grano medio a grueso, algo porfídico tectonizado y alterado

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina Equigranular Panidiomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo, Plagioclasa (20-25%), Feldespato - Potásico, Biotita

Tamoscovita

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Minerales de Hierro, Circones, Apatito, Sericita, Caolinita

Ta, Topacio, Albita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Muy debil Biotita → clorita
media - Feldespato → caolinita y sericita

OBSERVACIONES

son frecuentes las microcristalitas - Hay algo de Ab. junto al feldespato potásico

6.- CLASIFICACION

Granito Monzonita

granito monzonítico biotítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 JTL 409037 13 15 CC 19 Corta de Figueira

2.- DATOS DE CAMPO

Roca granítica de la Unidad de Santibañe (Sierra de Gata). Área con abundante fracturación tardía.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide alterado con microclastos texturizados

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B A VALORACION - PROBABLE... P G
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA - CALCICA, ZONADAS, BIOTI -

TA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERALES - DE - HIERRO, APATITO, CIRCON, SERICITA

CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL - Biotita → clorita
feldes patos → caolinita, no sericita

OBSERVACIONES

solo se ha observado una asociacion de sericita + clorita que puede ser de la cordierita.

6.- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO

Granito biotítico con moscovita

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P A
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	1	5	7	9	13	15	19
1	5	7	9	13	15	19	CLC
							Garía de Figueas

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Santibáñez - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST:ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR DE GRANO MEDIO HIPIDIOMORFO

FA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, ALBITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MINERALES ARCILLOSOS, SESICITA, TOPACIO, MINERALES-DE-HILE

RRD

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO) mineral secundario: mineral arcilloso, sesicita

DEUTERICA MEDIA - Feldspatos $\rightarrow$ minerales arcillosos y sesicita

OBSERVACIONES

La cantidad de plagioclasas a feldos potasico es proxiamamente 1 por lo que se trata de una roca monzonítica.

La plagioclasa ha valores de $An = 9\%$ a $An = 12\%$

La clasificación se hace siguiendo las indicaciones del IUGS basados en el trabajo de Streckeisen

6.- CLASIFICACION

MONZONITA

GRANITO MONZONITICO

granito moscovítico

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 IT 6 B 9140 13PROFUNDIDAD
15PROVINCIA
SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

gruta de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutonica de gata. Sierra de gata. En la penillanura charra
sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide muy leucocrático y de grano fino.

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

46

99

100

COMPOSICION MINERALOGICA

153

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, FELDSPATO - POTASICO, ALBITA, MOSCOVITA

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, TOPACIO, SERICITA, MINERAL ~~KL~~ ARCILLOSOS, MINERA

262

315

LES-DE-HIERRO

316

369

Minerales secundarios: Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL - feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El feldes K y las plagioclasas (Ab) estan en proporciones similares
solo hay algunos minerales de hierro en muy poca cantidad

6- CLASIFICACION

APLITA MOSCOVITICA

370

423

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9142			SA	García de Piquero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra sur de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B	- DUDOSA... D
	- DATACION ABSOLUTA... B	VALORACIÓN - PROBABLE... P	
	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina equigranular alotriomorfa

100

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo, feldespato - potásico, albita, moscovita, biotita

208

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

clorita, sericita, minerales de hierro, circon, mineral x

arcillosos, rutilo, topacio

Minerales secundarios: clorita, mineral arcilloso, sericita

Alteraciones (TIPO Y GRADO)

DETERICA INTENSA Biotita → clorita

Feldespato → minerales arcillosos y sericita

OBSERVACIONES

Hay agregados radiados de sericita o de sericita mas clorita que aparecen de forma intersticial. Asi mismo parte de la clorita es de tipo vermiculítico. La albita no es zonada y se encuentra muy alterada al igual que el feldes K

6- CLASIFICACION DE DAS MICAS

Granito moscovítico con biotita

grano de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO	ANÁLISIS MODAL	PLUTÓNICA - P	HIPOBÁSAL - H	VOLCANICA - V
424	425		P	426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	L	89143			SA	García de Figuear
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de launidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, de grano fino y porfídico.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR ALOTRIOMORFA 99

100 COMPOSICION MINERALOGICA 153

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

154 CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, CLORITA 207

208 TA 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

262 SERICITA, MINERALES-DE- Hierro, MINERALES ARCILLOSOS, ANDA 315

316 LUCITA 369

Minerales secundarios: clorita, Sericita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERIADO } muy intensa. Toda la biotita → clorita
Andalucita → sericita
intensa. Feldespatos → minerales arcillosos.

OBSERVACIONES

las plagioclasas meladas, muy pocas, son albita
hay agregados radiales de sericita o de sericita + clorita que aparecen de forma intersticial
solo se ha reconocido uno o dos cristaltos de Andalucita muy desestabilizado
de sericita

6- CLASIFICACION

370 GRANITO MOSCOVITICO CON CLORITA 423

granito de grano fino moscovítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9144			CC	García de Figuerola
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En la ladera sur.
Norte de la provincia de CACERES

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR ALOTRIMORFICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, SERICITA, MINERALES-DE-HERRO, BIOTITA, CLORITA,

262 315

CLIRCON

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Mineral arcilloso, clorita
DEUTERICA fuerte; Feldspato → minerales arcillosos
Biotita → clorita

OBSERVACIONES

las plagioclasas medidos dan AB.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

370 423

granito de grano fino moscovítico

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9147			CC	García de Figuearó
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jalisco, Ladera Sur de la Sierra. Provincia de Coahuila

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, MINERALES-DE-HIERRO, MINERALES ARCILLOSOS

SERICITA

Minerales secundarios: Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuteria leve - Feldspatos → Minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La textura se considera equigranular aunque algunas laminas de moscovita tienen tendencia porquiritica

6.- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO DE GRANO FINO

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10 23 ITLB 9150PROFUNDIDAD
15PROVINCIA
CCCLASIFICACION EFECTUADA POR:
Gruta de Fresco

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Jalama. Sierra de Gaba. En la ladera
Sur, Provincia de Caceres.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, PLAGIOCLASA AB, FELDSPATO-POTASICO, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, TOPACIO, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, MINERAL

ARCILLOSO

Minerales secundarios: Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA. DEBIL; Feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

la plagioclasa es Ab y es sustituida por el feldspato potasico que esta en
menor cantidad

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9174

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Carriero

2- DATOS DE CAMPO

granibale de la unidad plutónica de Jalama. Sierra de Jala. En la ladera sur.
 Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

4- EDAD

HEAUCINICD

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIO MORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PLAGIOCLASA, CUARZO, MICROCCLIMA, BIOTITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, ESFENA, OPACOS, CIRCON, ALLAMITA, MINERALES-DE-HIE

262 315

RIO, SERICITA, CAOLIMITA

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: sericita
 Deuterice + Intense Plagioclase → sericite

OBSERVACIONES

Podría considerarse a la roca como microporfídica, sin embargo la diferencia de tamaños entre los fenocristales (de plagioclase), la matriz no es tan grande como para definir una textura.

Se ha observado un microenclave tonalítico, redondeado, pero sin bordes netos.

Como accesorios se encuentran: Apatito en cristales estrechos y muy alargados. Esfene, no muy típica, asociada a biotita y opacos. Allanita, también asociada a la biotita, aparece en su variedad metamictica, isotropa.

La plagioclase está gizada de las medidas realizadas, nos dan entre 30 - 33 % An.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370 423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA		EMP	REC	Nº MUESTRA		TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
10	23	IT	LB	9205				SA	G. Parinero
1		5	7	9			15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Salamanca. Sierra de Gata
En la ladera Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

4.- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA_A
- DATACION ABSOLUTA_B
- DATACION PALEONTOLOGICA_C

44

VALORACION

- BUENA_B
- PROBABLE_P
- DUDOSA_D

45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MOLOKRI, STALINA, HETEROGRANULAR, HIPIDOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, CIRCÓN, OPACOS, MINERALES-DE-FE, CORDIERITA, RUTIL

LO, SERICITA, CAOLINITA

316 minerales secundarios: Feñcita, Mineral arcilloso, Clonita, n.ño, Feldespatos-potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica

- Intensa: Plagioclase $\rightarrow$ sericita + min. arcillosos
- Intensa: Biotita $\rightarrow$ clorita + rutilo + feldes K
- Debil: Feldes K $\rightarrow$ min. arcillosos

OBSERVACIONES

La roca está bastante tectonizada, los feldspatos están rotos, las micas dobladas y el cuarzo con extinción ondulante y en algunos sitios con textura en mortero. Debido también a la tectonización parte de los cristales son alotriomorfos.

6 - CLASIFICACION

GRAMITIO BIOTITICO MOSCOVITICO

Granito de dos unidades de pramo medio tectonizado

ANALISIS QUIMICO	☐	ANALISIS MODAL	☐	PLUTONICA - P	☐
424		425		HIPOBISAL - H	☒
				VOLCANICA - V	426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9218

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Carricero

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Jalisco. Dique del conjunto anular en torno a la unidad. Sierra de Gata. S. de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Leucogranito de grano fino

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTADISTICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR HIPIDIOMORFA MICROLITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, OPACOS, CIRCON, MINERALES-DE- Hierro, CLORITA, SERICITA

Minerales secundarios: Sericita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica - Débil o intensa por zonas: Plagioclasa → sericita

OBSERVACIONES

Se trata de un plagiogranito o granito de feldespato alcalino plagioclásico. La plagioclase es albitica, aunque no podemos decir un porcentaje exacto ya que las medidas realizadas han sido de tipo estadístico.

Hay zonas en que abunda mas el cuarzo, probablemente se debe a una silicificación tardía ya que engloba a los demás minerales y en parte disiere sus bordes.

En otras zonas hay una seritificación total de las plagioclases que queda como una masa microgranulada con pequeños opacos y apatitos, y en ella el cuarzo y la moscovita que hubiera.

Una pequeña fracturilla que corta toda la roca está rellena de minerales de hierro y clorita.

6.- CLASIFICACION

LEUCOGRANITO MOSCOVITICO PLAGIOCLASICO

Granito de feldespato alcalino plagioclásico, moscovítico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023ITLB9219

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Carriazo

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Talauce. Digue del conjunto aular en torno a la unidad. Sierra de Gate. S. de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Leucogranito de grano medio

4- EDAD

Herliwice

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular alotriomorfa de grano gr

Weso

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Cuarzo, Plagioclasa, Moscovita

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Apatito, Opaos, Topacio, Minerales de Hierro, Sericita

Minerales secundarios: Sericita

Alteraciones (TIPO Y GRADO)
 Dentérica - Muy débil - Plagioclase → sericite

OBSERVACIONES

Es, como la muestra -9218- un granito plagioclásico moscovítico, pero este tiene mayor tamaño de grano. Ha sufrido una fuerte tectonización con removilización del enarzo que queda intersticial entre grandes cristales de plagioclase y la moscovite.

Hay una serie de fracturillas subparalelas y delgadas que de forma fragmentada cortan toda la lámina, que están rellenas por apatito. En las micras, aparece los planos de exfoliación y forma figuras en forma de huso y escalonadas.

En los bordes y fracturas de las plagioclases hay gran cantidad de moscovite de pequeño tamaño y sericite.

Cristales de topacio se encuentran parcialmente alterados

6- CLASIFICACION

Leucogranito moscovítico plagioclásico

Granito de feldspato alcalino plagioclásico moscovítico, tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9222 TL
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Talaue. Sierra de Gata.
 En la vertiente Norte. S. de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

denso granito de grano fino a medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST. ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, PLAGIOCLASA, MICROCLINA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, APATITO, CAOLINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

minerales secundarios: Caolinita

Dutérice Débil: Feldes K → caolinita

OBSERVACIONES

Hay un proceso de albitización en detrimento del feldes K, del que queda poco relativamente, desarrollándose una plagioclase albitice con vetas de microcline en su interior.

Hemos encontrado los cristales de un mineral con alta refringencia, birrefringencia media, uniaxial negativo e incoloro. Tiene dos sistemas de exfoliación, poco manifestados, próximos a 90°. Por todos estos datos lo damos como probable Kornerupina.

Está fuertemente tectonizado.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO, LEUCOGRANITO

Granito moscovítico tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 I T L B 9 2 2 8
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

9. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Talame. Sierra de Gata. En la vertiente Norte. S. de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito moscovítico de grano medio

4- EDAD

HERCINICO
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR HIPIDIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, MICROCLINA, MOSCOVITA
 154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, TOPACIO, OPACOS, CIRCON, SERICITA, CAOLINITA, MILNER
 262 316

ALÉS-DE-HERRO
 316 369

Minerales secundarios: Sericita, Caolinita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dutórico Débil: Plagioclase → sericita
 Débil: feldes & → caolinita

OBSERVACIONES

Tiene varias fracturas, paralelas, rellenas de minerales de hierro. En esta muestra también hay la posible Kornevskine. Entre los minerales de hierro de carácter secundario destaca la Goetite fuertemente coloreada en tonos naranja y verdoso.

La roca está tectonizada con cuarzo con extinción ondulante y en mortero. Los feldspatos están arqueados, rotos y con los bordes redondeados rodeados con frecuencia de moscovite de pequeño tamaño. Los mica están doblados.

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO, LEUCOGRAANITO
 370 423

Granito moscovítico de grano medio, tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 I T L B 9 2 6 8

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

CC

Uº Piedad Franco

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de gata. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide porfídico de grano grueso, alterado

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

PORFIDICA HIPIDIO MORFICA HOLOC RISTALINA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, ORTOSA, OLIGOCASA, ALBITA, MOSCOVITA, CLORITA,

BIOTITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CIRCON, APATITO, SERICITA, PINNITA, PENNINA, MINERALES DE

HIERRO, OPACOS, LEUCOXENO

Minerales secundarios: Pinnita, Pennina, clorita, leucoxeno

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica.

Plag → sericita en el nucleo

cordierita → pinnita

Biotita → Pennina y clorita

OBSERVACIONES

Hay pseudomorfos de grandes cristales de cordierita, actualmente transformados en agregados cloritico-moscovíticos y pinnita. cordierita alterada.

- la Biotita se presenta con text. poiquilitica englobando circón, Apatito en halos pleocroicos.
- Plag zonados en el nucleo totalmente sericitizado y con un borde albitico y texturas porfíricas micromicíticas
- Parte de la moscovita existente está ligada a la alteración de la cordierita y parece de origen secundario
- Biotita → Pennina + leucoxeno o Rutilo.

6- CLASIFICACION

DE DOS FICAS

GRANITO BIOTITICO-MOSCOVITICO

Granito Pínicos porfídico y cordierítico

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023ITLB9277 15 cc Nº Piedra Frasco

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Santibañer. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grano medio, moscovítico, tectonizado

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B

- DATACION ABSOLUTA... B 4 VALORACIÓN - PROBABLE... P

- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACIÓN - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

CATACLASTICA HOLOCRISTALINA PORFIDICA HIPIDIOMORFICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

CUARZO, ORTOSA, MICROCLINA, ALBITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

APATITO, TOPACIO, CIRCÓN, BIOTITA, LEUCOXENO, OPACOS, MINERAL

LES-DE-KIFERRO

Minerales secundarios: Leucoxeno

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteración deutérica débil

La Biotita apenas existente se transforma a leucoxeno.

OBSERVACIONES

- Está muy deformada, lo constatan las moscovitas flexionadas, alto grado de trituración y desplazamiento de masas de las plagioclasas y recrist. de Cuarzo en estructura ondulante.
- El feldespato se presenta en fenocristales idiomórficos en peñitas en algunos casos o en el típico mosaico de la microclina.
- Hay bandas coincidentes con la deformación con gran abundancia de Óxidos de hierro y leucoxeno.
- Hay vestas mínimos de Biotita convertida a leucoxeno
- la plagioclase es acida con un % An $\geq$ 5%

6.- CLASIFICACION

LEUCOGRANITO DE FELDESPATO ALCALINO MOSCOVITICO

Granito leucocrático porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10 23 ITLB 9211

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
A. Carrasco

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Talamo. Sierra de Gata.
En la Cadena Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDOMORFA

100

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

208

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SILIMANITA, APATITO, TOPACIO, CIRCON, OPACOS

316

Minerales secundarios: Clorita, Rutilo, Feldespato-potasio, fensita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dextéxica : Intense Biotita → clorita + rutilo + feldes k
Intense Plagioclase → sericita + min. arcillosos
Intense Feldes k → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Hay una pequeña cavidad, en un lado de la lámina, tapizada por minerales de hierro, hacia donde los cristales de cuarzo han crecido, terminando en formas idiomorfas, a modo de pequeños pedos.

La roca está tectonizada, esto ha favorecido la movilización de minerales de hierro a partir de los espacios, y están ocupando zonas de fracturas Andalusita y Silimanita en muy poca cantidad.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico

370

Granito de dos micas alterado y tectonizado

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITLB	9206				SA	A. Carneiro
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jalisco. Sierra de Cate
En la Cadena Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos únicas de grano medio, ligeramente porfídico

4.- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A -BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, APATITO, TOPACIO, CIRCON, OPACOS, CLORITA, RUT

LO, MINERALES-DE-HIERRO, SERICITA, CHOLINITA, VERMICULITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérice

May intensa: Biotita $\rightarrow$ clorita + rutilo + felds K (totalmente)

Intensa: Plafodora $\rightarrow$ sericita + un arcilloso

Minerales secundarios: clonita, estilo, Feldespato-potásico, fencita, mineral arcilloso

OBSERVACIONES

da roca de la lúmina, está cortada por una fractura rellena fundamen-
talmente por felds π , clorita y vermiculita que ha crecido sobre el feldespato;
han quedado atrapados pequeños fragmentos de cuarzo y plagioclasa

Hay algunos agregados moscovítico-cloríticos que podrían corresponder a cordieritas alteradas, pero la morfología no es muy típica por lo que lo damos solamente como posibilidad.

La sillimanita (fibroblita) aparece abundantemente en varios cristales de moscovita que se encuentran, juntas formando como un nódulo pequeño redondeado al lado de la fractura antes descrita. En el resto de la lámina no la hemos determinado.

Los tamaños de grano varían de medio a fino. Destaca un felds K de mayor tamaño rodeado de plagioclase, con textura "Rapakivi"

El feldsk tiene dos tipos de partidas, "filen" y "kein"

da roca está tectanizada.

6 - CLASIFICACION

GRAMATO MALCOPIES

Granito de dos únicas alterado y tectonizado

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10 28 ITLB 9200 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Caruiezo

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Gata - Sierra de Gata. En la penillanura charra. S. de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micras de grano grueso, porfídico.

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA DE 46 99

GRANO GRUESO 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SILIMANITA, DAMOURITA, CORDIERITA, APATITO, TOP 262 315

ACIO, CIRCON, OPACOS, CLORITA, SERICITA, RUTILO, CAOLINITA 316 369

Minerales secundarios: sericita, mineral arcilloso, clorita, Rutilo, Feldespato-potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
Moderada: Biotita → clorita + rutilo + feldsp

OBSERVACIONES

Hay un proceso de moscovitización a partir de la andalucita, además este mineral se está alterando a damourita en muchos de los fragmentos que quedan en el interior de las láminas de moscovita.

La cordierita no aparece, sino en pseudomorfo, como un apretado de clorita + moscovita.

Se encuentran frecuentemente miravelitas en los bordes de los plagioclases en contacto con feldsp

Silimanita hay muy poca y está en relación con la andalucita

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO DE GRANO GRUESO 370 423

Granito de dos micras de grano grueso

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 0 2 3 I T L B 9 1 9 9 15 19 S A 9 - Carnicero

2.- DATOS DE CAMPO

DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Gato - Sierra de Gato. En la península de Ibero - S. de la Provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos encaix de prau medio, porfídico.

4.- EDAD

<u>HERCINIC</u> 21 43	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">PROCEDIMIENTO</td> <td style="vertical-align: top;">- POSICION ESTRATIGRAFICA.....A - DATACION ABSOLUTA.....B - DATACION PALEONTOLOGICA.....C</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> A 44 </td> <td style="vertical-align: top;">VALORACIÓN - PROBABLE.....P - DUDOSA.....D</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> B 45 </td> </tr> </table>	PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA.....A - DATACION ABSOLUTA.....B - DATACION PALEONTOLOGICA.....C	A 44	VALORACIÓN - PROBABLE.....P - DUDOSA.....D	B 45
PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA.....A - DATACION ABSOLUTA.....B - DATACION PALEONTOLOGICA.....C	A 44	VALORACIÓN - PROBABLE.....P - DUDOSA.....D	B 45		

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular porfídica hipidomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCANICAS)

154 EVARDO, MICROCCLINA, PLAGIOCCASA, BIBITTA, MOSCOVITA 20

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, CORDIERITA, SILIMANITA, APATITO, TOPACIO, CIRCONIO

ON, OPACOS, CLORITA, SERICITA, RUTILO, RAOL (N.TA)

316
Minerales secundarios: senecita, mineral arcilloso, clonita, Rutilo, Fe-epidoto-potasio
ALTERACIONES (TIPO Y GRADO) senecita + min. arcillosos

Dentérica { Intense : Plagioclase $\rightarrow$ sericita + min. arcillosos
Debil : Biotita $\rightarrow$ clorita + rutilo + feldes K
Debil : Feldes K $\rightarrow$ min. arcillosos

OBSERVACIONES

Hay abundancia de cristales de andalucita que se está transformando a moscovita por los bordes. En la mayoría de los casos están incluidas en plagioclasa claramente, en otros, la duda es por la oña moscovítica que se pone en contacto con otros minerales, como el cuarzo.

Destacan grandes cristales de microcline sobre el resto de los minerales. Este mineral, presenta bordes de reacción en los contactos con moscovita.

Durante el proceso de cloritización de la biotita, se forman finos haces de feldos K alargados en el sentido de los planos de exfoliación de la cuica.

6 - CLASIFICACION

[illegible]

Granito de dos series porfídico

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10 23 IT LB 9197
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Caruicero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Gata - Sierra de Gata. En la penillanura charra S. de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIOMORFA
 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA
 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, COADIERITA, CLORITA, RUTILO, OPACOS, APATITO
 262 315

316 369

Minerales secundarios: Sericita, mineral arcilloso, clorita, rutilo, Feldespatopotasico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dutérice. Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
 Moderada: Biotita → clorita + rutilo + feldes K
 Moderada: Feldes K → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Se encuentra sillimanita prismática bien desarrollada, también fibrolite de cordierita esta totalmente pseudomorfizada por clorita + moscovita.

Aunque la textura de la roca es heterogranular, no hay una diferencia fuerte entre los tamaños de grano de unos minerales y otros y siempre es el feldespatopotasico el que los presenta de mayor tamaño.

La plagioclase presenta una zonación difusa y débil.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico
 370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA
1023	I	L	B9196	
1	5	7	9	13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

9. Carnicero

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Cate. Sierra de Cate. En la penillanura charra. S. de la provincia de Salamanca

3.-DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos únicas de grano medio, porfídico. Muestra muy foliospática

4.- EDAD

HERCINIC ⊕

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA..... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA..... B
- PROBABLE..... P
- DUDOSA..... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 HOLOKRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDOMORFA 98

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SILICIMANITA, CORDIERITA, DAMOURITA, APTIT, TO, TO

PACIO, OPACOS, CIRCON, MINERALES-DE-HIERRO, CLORITA, SERICITA

316
Minerales secundarios: Ienita, Mineral arcilloso, clonita, Estilo, Feldspato potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica

Intense : *Plagioclase* → sericite + min. arilloso

debil : Biotita $\rightarrow$ clorita + rutilo + feldes K

Debit : $f(d, k) \rightarrow$ min. arillores

OBSERVACIONES

Pequeños cristales de andalucita se pueden ver en cristales de moscovita, lleva asociado fibrolite de pequeño tamaño. Esta moscovita procede de la andalucita. La cordierita está totalmente transformada a clorita + moscovita, de estos pseudomorfos se encuentran varios, de diferentes tamaños.

Algunas uricas están dobladas. Hay también fracturas con minerales de hierro
y otros con sericita

6 - CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

Granito de los micas

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITL	B9	187			CC	G. Carriero
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la unidad plutónica de Jalama. Sierra de Jala. En su ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio, porfídico.

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAMULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SILICIMANITA, APATITO, CIRCON, TOPACIO, CLORITA

262 315

RUTILO, SERICITA, CAOLINITA, OPACOS, MINERALES DE HIERRO

316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, moscovita, clorita, Rutilo, Feldespato-potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentórice

Intense: plagioclase: sericite y minerales arcillosos y moscovite
Intense: biotite: clorita + rutilo + feldsp

OBSERVACIONES

Destaca como accesorio la presencia de andalucita pleocroica incluye en moscovita, así como fibrolita (muy poca).

Presente un fuerte proceso de alteración y numerosas pequeñas fracturas rellenas con minerales de hierro

Bordes de reacción en torno a la moscovita en relación con plagioclase y también con feldsp.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRAMITO BIOTITICO MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

P 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITLB	9188				CC	A. Carriero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jabana, Sierra de Gata, en su ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAHULAR HIPIDIOMORFA

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, SILLIMANITA, APATITO, CIRCON, TOPACIO, OPACOS, MI

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica

Muy intensa : Biotita → clorita + rutilo + feldes k
Intensa : plagioclasa → sericita + min. arcillosos
Moderada : Feldes k → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Esta muestra está bastante alterada y se manifiesta en los minerales arriba descritos. Además tiene numerosas pequeñas fracturas por donde han circulado minerales de hierro.

La biotita está casi toda cloritizada

Sillimanita (fibrolita), hay en muy pequeña cantidad, incluida en cuarzo.

En algunos cristales de plagioclasa se observa un ligero zonado; un borde albitico muy delgado y difuso.

No se ha podido hacer una medida precisa de la plagioclasa, pero el contenido en An oscila entre 4 y 7 % An.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO BIOTITICO

370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9184 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 G. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

granito de la unidad plutónica de Jalama, Sierra de Gata. en su ladera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, de grano medio, heterogranular.

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, CIRCON, APATITO, TOPACIO, OPACOS, MINERALES-DE- 262 315

HIERRO, CLORITA, RUTILO, TURMALINA, SERICITA, CADLIMITA 316 369

Minerales secundarios: Sericita, mineral arcilloso, clorita, rutilo, Feldespato-potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Peritérica - Intensa - plagioclasa → sericita + min. arcillosos
 Moderada - Biotita → clorita + rutilo + felds K

OBSERVACIONES

Destacan los cristales de gran tamaño de felds K, pero que no constituyen textura porfídica ya que se encuentran también todos los tamaños hasta el más pequeño. Una pequeña parte del felds K. procede de la cloritización de la biotita.

Las medidas realizadas en los plagioclases nos dan 6% An.

La sillimanita que se encuentra es fibrolita de pequeño tamaño y poco abundante.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO 370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 I T L B 9 1 8 5 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
A. Carriero

2- DATOS DE CAMPO

granito de la Unidad plutónica de falanca. Sierra de Gata. En su ladera sur
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B 44 VALORACIÓN - PROBABLE... P 45
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACIÓN - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

EUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, CORDIERITA, TURMALINA, APATITO, TOPACIO, CIRCO 262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica
Muy intensa: Cordierita → clorita + anicas blancas
Intense: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
Debil: Biotita → clorita + rutilo

OBSERVACIONES

Se pueden distinguir dos cristales de cordierita pseudomorfos por un agregado de clorita y mica blanca. Uno de ellos se encuentra en contacto con turmalina, con la que presenta borde de reacción

Los núcleos de las plagioclases están sericitizados. En zonas en que se puede medir, hemos obtenido un 7% An. En contactos con felds K se observan texturas micronepticas.

La fibrolita como hemos descrito en otras láminas, se encuentra en pequeños agregados incluidos en diversos minerales.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO B I O T I T I C O M O S C O V I T I C O 370 423

Granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P HIPOBISAL - H VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITLB	9181				20	A. Carnicero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

fragmento de la Unidad plutónica de Jalama. Sierra de Gata. En la ladera
Sut. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio-Heterogranular

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, FIBROLITA, APATITO, CIRCON, CLORITA, RUTILO, OPAC

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterice Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
Moderada: Biotita → clorita + rutilo + feldes k

OBSERVACIONES

El feldes k, forma los cristales de mayor tamaño. Es microcline, macha
da según la ley de Karlsbad, con puntitos en "vein" y "patch"
La fibrolita es muy escasa; pequeños agregados incluidos en cuarzo, plagioclase
y moscovita

La biotita está cloritizada, apareciendo además pequeños husos de feldes k
como mineral secundario

La plagioclase presenta zonado difuso; con alteración mas acentuada en
el núcleo. A veces este núcleo se encuentra totalmente pseudomorfizado por un
agregado de cristales de moscovita, y rodeado de una zona de alteración
sericitica caolinitica y todo a su vez, de una otra mas ácida sin alterar

Algunos cristales de micas están doblados.

No ha sido posible una medida precisa de plagioclase, pero es de compo-
sición albitica.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico

370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - M
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9180			CC	A. Carriero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jalama. Sierra de Gata. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, de grano medio, porfídico.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA A	- BUENA B
- DATACION ABSOLUTA B	- VALORACION - PROBABLE P	
- DATACION PALEONTOLOGICA C	- DUDOSA D	

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERICADA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CORDIERITA, PINNITA, CLORITA, TURMALINA, APATITO, CIRCON, FIBROLITA, RUTILO, OPACOS, MINERALES-DE-HERRO

262 315

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica
 Debil - Biotita → clorita + rutilo + feldsp
 Intense - Plagioclase → sericita + minerales arcillosos
 - Cordierite → pinnita + clorita
 Minerales secundarios: clorita, rutilo, feldspato-potásico, sericita, mineral arcilloso, pinnita

OBSERVACIONES

La lámina delgada no presenta el carácter porfídico que se observa en la muestra de mano, sino que los tamaños de grano van variando del mas grueso al mas fino.

Se encuentra cordierita totalmente pseudomorfizada por clorita + pinnita. También hay sillimanita, en su variedad fibrolita, que forma pequeños agregados incluidos en plagioclase, cuarzo, moscovita.

Con frecuencia en los contactos moscovita-feldsp, se observa un borde de reacción.

6- CLASIFICACION DE LAS MICAS

GRANITO Biotitico MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO	ANALISIS MODAL	PLUTONICA - P	HIPOBISAL - H	VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Carla de Figueirala

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En la ladera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso y algo porfírico

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIONOMORFA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA 100 153

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTÁSICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

VITA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITO, SILLIMANITA, TOPAZIO, APATITO, CIRCON, CLORITA, MIL 262 315

MINERALES DE-ALIERRO, RUTILO, MINERAL ARCILOSO 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Clorita, mineral arcilloso

Dentérica/delir Biotita → clorita

muera Feldspato → min arcillosos

OBSERVACIONES

En los contactos entre la moscovita y el feldes. k hay crecimiento simplectítico.
 la sillimanita se encuentra solo en agujas entre la mosc. y el cuarzo
 las plagioclases estan algo zonadas y el borde es AB.

6- CLASIFICACION DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA 370 423

granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 IT 4 B 9 1 67 13 15 19 SA Gruta de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de launidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En su eje orográfico
Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granito leucocrático de tono grisáceo y de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, TURMALINA, BIOTITA, CLORITA, TOPACIO, CIRCON, MINERAL

MINERALES DE HIERRO, APATITO, LEUCOXENO, MINERAL ARZILLOSO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO) Minerales secundarios: Clorita, Mineral arcilloso

DEUTERICA media - Biotita → clorita y Feldespatos → Minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Plagioclasa = Oligoclasa acida

La moscovita esta algo flexionada e incluso hay alguna bandita serpenteante de sericita por lo que la lamina es algo "flaxer"

Hay circones dentro de la Turmalina que dan halos pleocroicos.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

granito de dos micas con turmalina

ANALISIS QUIMICO

ANALISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9168 13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

CC

García de Figuearal

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En su ladera sur, Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo amarillento, de grano medio a grueso y tendencia porfírica

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, SILLIMANITA, THERMALINA, CLORITA, TOPACIO, CIRCON,

262

315

LEUCOXENO, MINERALES-DE-ACERRO, APATITO, MINERALES ARGILL

316

369

0508

Minerales secundarios: Sericita, Clorita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA | Fuerte - sillimanita → sericita
 media Biotita → Clorita; y feldspatos → Min. arcilloso

OBSERVACIONES

Las plagioclasas tienen dentro muchas agujas y laminillas de sericita se augiere era antes sillimanita. Este ultimo mineral aparece dentro de la moscovita y el cuarzo.

La plagioclase es una alipoclase acida e incluso algunas medianas dan

Au ≈ 8-9 %

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370

423

granito de dos micas con sillimanita y thermalina.

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 4B 9159

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1

5

7

9

13

15

19

Sierra de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de falama. Sierra de gaba. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, grisáceo de grano medio a grueso y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, TOPACIO, MINERALES-DE-HIERRO, LEUCOXENO, CIRCON

262 315

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuerte - Sillimanita → sericita
 Débil - Feldespatos → minerales arcillosos
 Muy débil. Biotita → clorita

Minerales secundarios: sericita, Mineral arcilloso, clorita

OBSERVACIONES

Solo quedan restos de sillimanita dentro de la mica blanca.
 las plagioclasas no son zonadas y dan oligoclasa acida.

6- CLASIFICACION

DE LOS MICAS

GRANITO Biotitico con MOSCOVITA

370 423

Granito de los micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9160PROFUNDIDAD
15PROVINCIA
CCCLASIFICACION EFECTUADA POR:
García de Fiqueroles

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Falauna. Sierra de Gabz. En la ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, SERICITA, TURMALINA, SILLIMANITA, TOPACIO, CIRCON

RUTILO, APATITO, MINERALES ARCILLOSOS, MINERALES-DE-HIERRO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuerte: sillimanita → sericita
Media: Biotita → clorita + rutilo, y feldespato → minerales arcillosos
Minerales secundarios: sericita, clorita, rutilo, feldespato, mineral arcilloso

OBSERVACIONES

solo se observan dos o tres cristales de Turmalina.
la plagioclasa no es zonada y corresponde a una alfaclosa acida

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotitico con MOSCOVITA

granito de dos micas con sillimanita

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	AB	9162			CC	García de Figuear
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C ☐ 44 - DUDOSA... D ☐ 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada alotriomorfa

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Charzo, feldespato-potásico, plagioclasa, biotita, moscovita

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Sericita, clorita, turmalina, topacio, circon, rutilo, leuco

316 369
XENO, APATITO, MINERAL DE HIERRO, SILIMANITA, MINERAL ARCILLOSO

CILLOSOS. Minerales secundarios: Sericita, clorita, Feldespato, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERICA | Intensa - Silimanita → sericita
 Media Biotita → clorita y feldespatos → Minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Solo se ha identificado como silimanita algunas agujas dentro de la mica blanca.

La plagioclasa es casi Ab ($An \approx 10-11\%$)

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423
granito de dos micas con turmalina

ANALISIS QUIMICO ☐ 424

ANALISIS MODAL ☐ 425

PLUTONICA - P ☒
 HIPOBISAL - H ☐
 VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JT 689161

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

García de Figueas

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama - Sierra de Gata. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

46 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, SILIMANITA, CLORITA, RUTILO, TOPACIO, CIRCON, LEU

COXENO, MINERALES-DE-HIERRO, ALLANITA, MINERAL ARCILLOSO

Minerales secundarios: Sericita, mineral arcilloso, clonita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA Fuerte. Silimanita → sericita
 Media Feldespatos → minerales arcillosos
 Débil Biotita → clorita.

OBSERVACIONES

solo se han visto dos cristales de allanita.
 Hay crecimiento rimplectítico entre las mica y los feldespatos.
 la plagioclasa no es zonada y corresponde a una oligoclasa acida.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de dos micas con sillimanita

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 689164

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 Garcia de Vissera

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutonica de Jalama Sierra de Gata, en la ladera norte
 Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo porfírico y de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA TA

TACLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, BIOTITA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, TURMALINA, SILLIMANITA, MINERALES-DE-HIERRO, CIR

CON, CLORITA, LEUCOXENO, TOPACIO, APATITO, MINERALES-DE-ARCILLO

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERIZA Media; Sillimanita → sericita; Biotita clorita, y feldespates → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Hay bastante sillimanita en laminae de moscovita que pasan a los cristales inmediatos de cuarzo. La moscovita está fisionada.

Hay poca cantidad de plagioclasas y bastante alterada. Se considera como oligoclasa ácida que en algunos puntos tiene un borde claro de albita.

La cataclasis origina bandas sinuosas de sericita o bien de cristales pequeños de cuarzo

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GABRITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito cataclástico, de dos micas con sillimanita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9155			EC	garcia de Vizcaya
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Jabana. Sierra de Gabá. En la ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono grisáceo y grano grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	- POSICION EST: ATIGRAFICA... A	- BUENA... B
	- DATACION ABSOLUTA... B	- VALORACION - PROBABLE... P
	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- DUDOSA... D
	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, SILLIMANITA, PENNINA, TOPACIO, CIRCON, APATITO, MINERALES DE HIERRO, RUTILO, MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { INTENSA - Sillimanita → Sericita
BAJA - Biotita → Pennina e rutilo y Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas estan en cristales grandes debilmente zonados y corresponden a una oligoclasa acida.
Hay un cristal de circon de gran tamaño.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

Granito de dos micas con sillimanita

ANALISIS QUIMICO	ANALISIS MODAL	PLUTONICA - P
424	425	HIPOBISAL - H
		VOLCANICA - V
		426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITL	B91	52			CC	Opuntia de Figueroa
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Jálama, Sierra de Gata. En la ladera sur Norte de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono gris. y grano grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C VALORACION - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

THURMALINA, SILLIMANITA, SERICITA, CLORITA, TOPACIO, CIRCON

APATITO, MINERALES-DE-HIERRO, RUTILO, MINERAL ARCILLOSO

Minerales secundarios: clorita, Mineral arcilloso, sericita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DE BIL / Biotita → clorita
Feldspatos → minerales arcillosos
Fuerte - sillimanita → sericita.

OBSERVACIONES

Las medidas en las plagioclasas (que no aparecen zonados y con mucha sericita dentro) son una oligoclasa acida.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

granito de dos micas con sillimanita

ANALISIS QUIMICO ANALISIS MODAL PLUTONICA - P HIPOBISAL - H VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	5	7	9	13	15	CC	García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jálama. Sierra de Gata. En la ladera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de color amarillento y grano grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, CLORITA, TURMALINA, TOPACIO, SILLIMANITA, CIRCON, 315

APATITO, MINERALES DE HIERRO, MINERAL ARCILLOSO 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Sericita, clorita, ~~Feldspato~~, mineral arcilloso
DESTERICA Fuerte: Sillimanita → sericita
Debie Biotita → clorita, feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas no son zonadas y las incluídas dan una oligoclasa ácida
La sillimanita está en agujas dentro de moscovita o de plagioclasas

6- CLASIFICACION DE LAS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA 423

granito de grano grueso y de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITLB	9148				CC	García de Figuerola
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jalausa. Ladera sur de la Sierra de Jala, norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono rosado, grano medio a grueso y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B A VALORACIÓN - PROBABLE... P B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIO MORFO

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, TURMALINA, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, RUTILO,

CORINDON, SERICITA, MINERALES ARCILLOSOS, TOPACIO, APATITO

ILMENITA Minerales secundarios: Pennina, Feldespato-potásico, sericita, mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Denterica media Biotita → pennina y Feldes K

" Baja feldespato → sericita y/o minerales arcillosos.

OBSERVACIONES

La turmalina solo se encuentra como un cristal aunque este es grande.

6- CLASIFICACION DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9139			SA	García de Figueras
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad Plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo grisáceo, de grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☒
- DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACION - PROBABLE... P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA... C ☒ 44 - DUDOSA... D ☒ 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

FELDSPATO-POTÁSICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

TURMALINA, ANDALUCITA, EUDORITA, SERICITA, RUTILO, CIRCON, ZIRCON

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO) **50%** Minerales secundarios: Sericita, clorita, ~~Feldspato~~, mineral arcilloso

DETERICA | Fuerte - Andalucita → sericita
| Media Biotita → clorita y feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas, algunas alargadas dan oligoclase acida.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423
grano grano grueso, porfídico, de dos micas y con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO ☒ 424ANÁLISIS MODAL ☒ 425

PLUTÓNICA - P ☒
HIPOBISAL - H ☒
VOLCÁNICA - V ☒ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023JT LB9141
1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA
19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata. En el Rebollar. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de color gris, grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICO
21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIONOMORFA
46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA
154 207

TA
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, TURMALINA, PENNINA, MINERALES-DE-HERRO, SERICITA
262 315

CITA, ALBITA, CIRCON, APATITO, RUTILO, PINITA, MINERAL AR
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica media { Biotita → Pennina + rutilo y opacos
Feldes → minerales arcillosos
" Fuerte { Andalucita → sericita
" Intensa { Cordierita → pinita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y algunas que no lo son se han medido y dan $An \approx 18\%$
La andalucita es anterior a la moscovita, turmalina y plagioclasas

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA Y ANDALUCITA
370 423

granito de dos micas con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO
424

ANÁLISIS MODAL
425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCÁNICA - V
426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL 09086 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Pineda

2- DATOS DE CAMPO

granitoide del apuntamiento de la cruz de San Pedro. Ladera sur de la Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris claro de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA HIPIDIMORFICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, PERNINA, SERICITA, TOPACIO, APATITO, TURMALINA

CIRCON, PINITA, SERICITA, MINERALES-DE-HERRO, MINERALIZ

ARCILLOS, RUTILO, JEMENITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEBIL - Biotita → pernina,
 MEDIA - feldes → minerales arcillosos,
 " Andalusita → sericita

OBSERVACIONES

Los cristales de plagioclasas son zonados. algunas medidas hacia el borde dan valores de An ≈ 18%

La andalusita se encuentra a veces dentro de las plagioclasas.

Hay algo de Pinita que se interpreta como originada a partir de cordierita

La preparacion contiene un "spot" de laminas pequenas de biotita + moscovita + cuarzo + andalusita + pinita. se interpreta del metamorfico encajante

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICA CON MOSCOVITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 1 T L B 9 1 1 7
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 5 A
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Gab. en el Rebollar. Prov. de Salamanca
 Cerca del contacto

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris de grano grueso y algo porfídico

4- EDAD

HERCINICA

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

- BUENA... B
 VALORACIÓN - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASAS BIOTITA MOSCOVITA

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA SERICITA ALBITA CIRCON PENNINA TOPACIO MINA

RALES DE HIERRO APATITO TURMALINA MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL

Biotita → Pennina, opacos, y también feldspatos
 feldspatos → minerales arcillosos

" Fuerte - Andalucita → sericita.

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas las medidas en las menos zonadas dan $An = 20\%$

Hay algo de microquartzitas

La andalucita es abundante y siempre tiene una corona de sericita incluso en los cristales que se encuentran dentro de la plagioclasa.

solo se ha localizado un cristal pequeño de turmalina.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA Y ANDALUCITA

granito de dos micas con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V
 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	5	7	9121	13	15	SA	Gracia de Finales

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura de Gata de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono rosado, grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, CUARZO, PERMINA, MOSCOVI

TA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, PINITA, CORDIERITA, MINERALES DE HIERRO, TOPACIO

CIRCON, APATITO, MINERALES ARCILLOSOS

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Intensa: Cordierita → pinita, y/o sericita,
Biotita → clorita,
Baja - feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas no son zonadas; los valores medidos corres ponden a valores de An = 8 - 12 %.

6.- CLASIFICACION

GRANITO MOSQUITO, GRANITO EPISIENITIZADO

GRANITO CLORITICO

370 423

granito en proceso de episienitización

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10 23 ITL B 91 24

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
García de Figueras

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la península
nueva Charra. Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano muy grueso, porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A -BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, PENNINA, MINERALES DE HIERRO, RUTILO

CIRCON, APATITO, TOPACIO, MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERICA fuerte: andalucita → sericita,
media: Biotita pensiva; feldespato, minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son de un tamaño grande y no todas aparecen zonadas
An ≈ 16-18.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DÍAS HIELES

GRANITO Biotítico con Moscovita

granito porfídico de dos linéas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL 89123 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuerola

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. si enca de Gata. en la península ibérica
 Sur de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático y porfídico de grano grueso

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAHULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO POTASICO, CHARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, ANDALUCITA, SERICITA, CORDIERITA, PINITA, CIRCON

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuerte: andalucita → sericita, Cordierita → pinita y sericita,
 Media: Biotita → pennina y feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas incluyen frecuentemente a la andalucita y
 a veces son de gran tamaño
 se ha localizado un cristal de clinzoisita solamente

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito porfídico de los micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITAB	9122				SA	García de Figueiró
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gabar. Sierra de Gabar. En la penillanura charra. Sur de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45
VALORACIÓN - PROBABLE... P		
- DUDOSA... D		

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, PENNINA, MINERALES-DE-HIERRO, PINITA

TOPACIO, CIRCON, APATITO, RUTILO, MINERALES ARDILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Subeusa - Andalucita → Sericita y Cordierita → Pinita.
Debil; Biotita → Pennina y Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y se han medido valores de $Al_2 \approx 8$ $Al_2 = 14$. Tienen al idiomorfismo y con mucha frecuencia incluyen a la andalucita mas o menos transformada en sericita.

La pinita de forma gotiforme debe proceder de granos pequeños de Cordierita

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de dos micas porfídico

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9137 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
 sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo grisáceo, de grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular porfídica alotriomorfa

100

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Feldespato-potásico, Cuarzo, Plagioclasa, Biotita, Moscovita

Vita

208

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Andalucita, Sericita, Clorita, Minerales de Hierro, Circon, Apatito, Topacio, Silimanita, Rutilo, Mineralas arcillosas

316

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA leve. Andalucita y silimanita → sericita,
 Biotita → clorita y Feldespato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son de tamaño grande y zonadas.
 Es una de las pocas preparaciones de este tipo de roca que tiene algo
 de silimanita. La andalucita es abundante

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

Granito biotítico con moscovita

370

granito de grano grueso, porfídico, de dos micas y con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9136			SA	García de Aguilera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo grisáceo. De grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, MINERALES DE HIERRO, CLORITA, PINITA

CORDIERITA, CIRCON, TOPACIO, MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { muy intensa Cordierita → Pinita y/o sericita y clorita
 Intensa andalucita → sericita
 Debil Biotita → clorita y feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La cantidad de andalucita es apreciable y forma arregados de cristales en parte alterados.
 Las plagioclasas, no muy abundantes son de An ≈ 16 en las que se ha notado

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

Granito de grano grueso, porfídico, de dos micas y con andalucita

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Gerda de Figueira

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra, sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso y porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CHARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON

APATITO, TOPACIO, ALBITA, MINERAL, ARCILLAS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuerte. Andaluca → sericita
 Débil - Biotita → clorita, y Feldespato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Más de la mitad de la preparación está ocupada por un fenocristal de Feldes. K peritico con Ab incluye otros componentes (no la andalucita) y entre ellos cristales de tamaño medio de plagioclasas euhedrales y zonadas que son de oligoclasa. En el contacto de estas y el feldes K se suele desarrollar una lamina de Ab.

6- CLASIFICACION

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

ANÁLISIS QUÍMICO ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 T L B 9 1 3 4
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

garcía de Fiqueralá

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra.
 Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo amarillento, de grano grueso y porfídico

4- EDAD

A E R C I N I C A
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

H O L O C R I S T A L I N A H E T E R O G R A N U L A R P O R F I D I C A A L O T R I O M O R F A
 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

C H A R Z O , F E L D E S P A T O - P O T A S I C O , P L A G I O C L A S A S , B I O T I T A , M O S C O
 154 207

V I T A
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

A N D A L U C I T A , C H L O R I T A , S E R I C I T A , T U R M A L I N A , M I N E R A L E S - D E - H I E
 262 315

R R O , T O P A C I O , C I R C O N A P A T I T O , M I N E R A L E S , A R C I L L O S O S , A L B I T A
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Muy intensa - Cordierita → clorita y moscovita
 Media - Andalusita → sericita y Biotita → clorita
 Baja Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El porfirismo se debe tanto al feldes. K como a las plagioclasas y la proporción entre ambos componentes se acerca a la unidad por lo que es un granito monzonítico pero dado el tamaño del grano no es representativo. El feldes K está peritizado con AB bastante pura.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

G R A N I T O B I O T I T I C O C O N M O S C O V I T A
 370 423

granito de grano grueso, porfídico, de dos micas y tendencia monzonítica

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	JT	LB	9132			SA	García de Riquelme
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra.
Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo de grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, PENNINA, SERICITA, TOPACIO, MINERALES DE HIERRO

O, CIRCON, APATITO, MINERALES ARCILLOSOS, PINITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA / Fuerte - Andalusita → sericita
Media Feldespatos → minerales arcillosos, y Biotita → pinita
Feldespatos-Potasico.
Hay una o dos masas pequeñas de pinita que se superponen de la cordierita.

OBSERVACIONES

El porfirismo se debe al Feldes K pero hay cristales bastante grandes y
zonados de oligoclasa acida.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS TIPOS
GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de grano grueso porfídico y biotítico

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9131 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
 Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono gris, grano grueso y porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDIDOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, PENNINA, TOPACIO, MINERALES-DE-HER

RO, CIRCON, APATITO, RUTILO, MINERALES ARCILLOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEBIL TERICA / Fuerte; Andalucita → Sericita
 Debil Biotita → Pennina, y feldespato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son algo zonadas y en cristales grandes. Los medidos son de An⁷16. Pero puede haber otras mas ácidas. El FeldspK, en fenocristales, tiene dos vecinientos marcados por una banda de microclinos y el borde del primitivo cristal no está paralelo al nuevo. La andalucita es muy abundante como restos de cristales relativamente grandes incluidos en una masa de sericita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON-MOSCOVITA

granito porfídico, grano grueso, de dos micas con andalucita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	6	9130			SA	García de Figuearola
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad Plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la península cherrá
Sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocristico algo amarillento de grano fino a medio

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCO

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, LEUCOXENO, CIRCON

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA media - Andaluca → sericita
Biotita → clorita
Feldspato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El porfirismo es tanto del feldes K como de la plagioclasa. Claramente el primero
sustituye al segundo y queda dentro el contorno de la plagioclasa marcado por
resto de esta y cuarzo gotiforme. Cuando el fenocristal es de plagioclasa esta es algo
zonada y puede estar rodeada de feldes K y entre ambas se establece una fina
capa de AB. Los cristales grandes de plagioclasa son de oligoclasa acida $Xu \approx 14$

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS
GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423
granito de grano fino porfidico y de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 5 7 9 1 2 9
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Jose de Figueroa

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
 Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino y porfídico

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA
 154 207

TA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ALBITA, PENNINA, ANDALUCITA, SERICITA, RUTILO, TOPACIO, CIR
 262 315

CON LEUCOXENO, MINERALES DE HIERRO, APATITO, MINERALIS AR
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA Fuerte
 Andalusita → sericita, Biotita → pennina, rutilo y leucoceno
 no Feldspatos → minerales arcillosos,
 seguramente los agregados redondeados de moscovita y clorita
 Proceden de Cordierita

OBSERVACIONES

El porfirismo se debe a cristales de oligoclasa (muy alterados) y rodeados de un
 rutilo, no alterado de albita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA
 370 423

granito de grano fino, porfídico y biotítico

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9128			SA	Gasia de Figueira
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad Plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la península ibérica. Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano fino y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACIÓN - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA, HETEROGRAANULAR, PORFIDICA, ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNA, SERICITA, LEUCOXENO, ANDALUCITA, TOPACIO, RUTILO, SKI

HAUT, CIRCON, APATITO, MINERALES DE HIERRO, MINERALES ARCILOSOS

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DETERICA media: Andaluca → ~~silicatos~~; Biotita → ~~plumita~~ y ~~rutilo~~
Feldspato → ~~micras~~ azules.
Probablemente haber cambiado que ha pasado a ~~clonag~~ ~~macon~~.

OBSERVACIONES

La proporción de plagioclasa a feldes K es muy baja. Este último es intersticial o porfídico. En este caso encierra otros componentes incluyendo oligoclasa (Am=18). Por el contrario cristales independientes de plagioclasa son de AG (Am ≈ 6-8)

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS
GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de grano fino porfídico y biotítico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 4B9127 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueas

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra, sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo, de grano fino a medio y porfídico.

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAULAR PORFIDICO ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, RUTILO, LEUCOXENO, ANDALUCITA, SERICITA, CIRCONIO

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

OBSERVACIONES

Hay alguna disposición de tipo rapakivi con crecimiento de AB sobre otras plagioclasas o sobre el feldespato K.
 El carácter porfídico se debe a las plagioclasas mientras que el feldes K tiende a ser intersticial - las plagioclasas están bastante alteradas en la parte interna que suele ser bastante euhedral

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito de grano fino y de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10 23 IT 6 B 91 26 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 Garcia de Figuerola

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutonica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
 Sur de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo grisado, de grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA
 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO
 154 207

MITA
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CORDIERITA, PINITA, CLORITA, MINERA
 262 315

LES-DE-HIERRO, CIRCON, APATITO, TOPACIO, MINERALC, ARCILLOSO
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA / Intensa: cordierita $\rightarrow$ pinita y andalucita $\rightarrow$ sericita,
 Débil: Biotita $\rightarrow$ clorita y feldespatos $\rightarrow$ minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Hay bastante cantidad de andalucita. Practicamente toda la cordierita
 a pasado a pinita.
 Las plagioclasas son zonadas

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA
 370 423

granito porfídico de dos micas

ANALISIS QUIMICO
 424

ANALISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9125			SA	García de Hoces
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la península ibérica sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo de grano grueso.

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ -BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDLOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

154

207

VITA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, RUTILO, CIRCON, TOPACIO, APA

262

315

TITO, MINERALES-DE- Hierro, MINERALES ARCILLOSOS

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { Fuerte andalucita → sericita
 Débil biotita → clorita, feldespato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Es relativamente abundante la andalucita en relos cuadráticos dentro de sericita y de las plagioclasas.
 Las plagioclasas son zonadas y algunas andalucitas dan $An \approx 18$.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCO VITA

370

423

granito porfídico de dos micas.

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10235TLB9096. 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la unidad plutónica de Gata, Sierra de Gata, Ladera Norte.
 Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de grano fino a medio

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MINERALES DE - HIERRO TOPACIO SERICITA RUTILO APATITO 262 315

CIRCON MINERAL ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA; Feldspatos → sericita y/o, minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Hay una débil tendencia a la textura hipidiomorfa y a la
 formaciones gráficas

La plagioclasa responde a términos albitico

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO 370 423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 IT 6 9 0 9 0 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 54 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad granítica de Gata. Ladera norte de la Sierra de Gata. Sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático de tono gris y grano grueso

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular porfídica alotriomorfa

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Feldespatos - potásico, Cuarzo, oligoclasa, biotita, moscovita

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Albita, pennina, minerales de hierro, sericita, circon, apa

tito, rutilo, corindón, minerales arcillosos

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA DEBIL
 Biotita → pennina,
 Feldespatos → minerales arcillosos y/o sericita

OBSERVACIONES

La oligoclasa es zonada. El feldes k aparece en grandes cristales que engloban los demás componentes. Cuando incluye oligoclasa se forma un reborde de Ag. Así mismo hay perititas

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MIEGAS

Granito biotítico con moscovita

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 I T L B 9 0 8 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 S A 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuerola

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de gata. En la ladera Norte de la Sierra de gata
 sur de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso

4.- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALLINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154

207

TA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ALBITA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, APATITO, RUTIL

262

315

LO, SERICITA, MINERALES ARCILLOSOS, TOPACIO

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA DEBIL { Biotita → clorita
 feldspato → minerales arcillosos, topacio

OBSERVACIONES

La oligoclasa es debilmente zonada. Hay albita y a veces algo de microclita.

La clorita (con o sin moscovita) se agrupa a veces de forma cuadrática por lo que se supone es producto en parte y procedencia de cristales de cordierita. Hay por otra parte clorita de alteración de biotita.

Solo se han localizado 3 cristales de topacio

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE LAS MIZAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370

423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JT 689100 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueal

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de gaba. Sierra de gaba. En la penillanura charra-sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono grisáceo. grano grueso y porfídico.

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO CUARZO PLAGIOCLASAS BIOTITA MOSCO

154 207

VITA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA CLORITA SERICITA MINERALES - DE - HIERRO ANTILO

262 315

CIRCON APATITO MINERAL ARCILLOSOS 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { INTESA - Andaluca → sericita
 Media - Biotita → clorita gruesa y Feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagio clacas, en parte euhedrales son zonadas y los únicos valores medidos cerca del borde son de An = 7

Hay agregados de clorita + moscovita + biotita que por su contorno deben proceder de granos de cordierita

6.- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 IT 489116 15 19 SA Socia de Fomento

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Gata, Sierra de Gata, en la península ibérica
sur de la provincia de Salamanca.

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitaide gris claro de grano grueso y porfidico.

4.- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - PROBABLE... P
- DUDOSA... 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGARANULAR PORFIDICA ALOTRIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

FELDES PATO - POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, Biotita, Mosco

VITA

208 26

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

262 ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, CIRCÓN, MINERALES-DE-HIATRO 31

TOPACIO, APATITO, ALNITA, MINERAL ~~ES~~, ARCILLOS ~~OS~~

516

ALTERACIONES [TIPO Y GRADO]

Minerals secundarius: Sulfid, Fe-Spat-potenz, Mineral anallerg

Subens - Andalucita $\rightarrow$ sericita

Baja - Brakita → clarita; Brakita → feldesfr y feldespatos minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclitas son zonadas. El feldes K está pertitzado con AB.
En andalucita, alterada está muy frecuentemente dentro de las plagioclitas

6 - CLASIFICACION

6 - CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

gremio parafidico de los unicas

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9115			SA	García de Píñeros
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata - Sierra de Gata. En la península ibérica
Provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris claro de grano muy grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- VALORACION - PROBABLE... P
		- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina Heterogranular Porfídica Hialomorfica

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Feldespato - potásico, Cuarzo, Plagioclasas, Biotita, Moscovita

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

Pennina, Sericita, Andalucita, Circon, Albita, Minerales de

262 316

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA FUERTE / Biotita → Pennina
" INTENSA - Feldespato → sericita
Andalucita → sericita

OBSERVACIONES

El feldespato K está peritizado con Ab por eso se indica independientemente de las plagioclasas que son zonadas y pueden formar microtexturas. Solo se observan restos de los cristales de andalucita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

Granito Biotítico con Moscovita

370 423

granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	489	110			SA	Sorcia de Fiqueras
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono gris, grano fino y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDICOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVI

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, SERICITA, CIRCON, APATITO, RUTILO, MINERALES DE AL

ERR, MINERAL, ARCILLOS, ALBITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL { Biotita → clorita,
Feldspatos → minerales arcillosos, y/o sericita

OBSERVACIONES

La roca se considera un porfido aunque la megacrista tiene un tamaño de grano bien discernible, de tendencia equidimensional. Los fenocristales son de a) feldos K periticos con AB o de textura grafica con el cuarzo gaticular b) de plagioclasas zonodas c) cuarzo de contornos redondeados y d) de biotita.

6.- CLASIFICACION

PORFIDO GRANITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 10 23 5 7 9 13
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueiró

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata - Sierra de Gata. Ladera norte. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono gris y grano muy grueso

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA A
 - DATAION ABSOLUTA B
 - DATAION PALEONTOLOGICA C

A

VALORACIÓN - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

B

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALCOTRIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCO

154

207

VITA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO, CIRCON

262

315

TOPACIO, CLORITA, RUTILO, MINERALOS ARCILLOSOS

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA: Fuerte - Andaluca → sericita
 Débil - Biotita → clorita + rutilo y feldspates → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y a veces euhedrales por lo que hay tendencia a texturas hipidiomorfica. Aparecen microquintas. También reemplazan perfitas en los cristales grandes de feldes K

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370

423

granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

P

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9107			SA	García de Figuearola
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
Sur de la provincia de Salamanca

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono grisáceo, grano grueso y porfídico

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	A	B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIONOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MINERALES-DE- Hierro, TOPAZIO, APATITO, CIRCON, CLORITA

ANDALUCITA, SERICITA, MINERAL ARCILLOSO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteraciones secundarias: hueso arcilloso, sericit, feldspato-potásico, clorita
Deuterica debil
Feldspato → minerales arcillosos y/o sericit. También, Biotita → clorita
Biotita → clorita

OBSERVACIONES

El porfírico no solo es del feldspato, sino también de algunos cristales
de plagioclasas. gran parte de la preparación está ocupada por esos cristales
las plagioclasas son zonadas. las que se han hueido en su parte media dan
An ≈ 18

Se ha observado un cristalito de andalucita.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito porfídico de las micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - VP
426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9106			SA	Sanja de F. Morales
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad de gaba. Sierra de gaba. Penillanura charra.
En el Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris claro y de grano grueso algo porfidico

4- EDAD

HARCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, PLENIMA, MOSCO

VITA

46 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, MINERALES DE HIERRO, RUTILO, CIRCON

262 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { muy intensa Biotica → plenima
intensa - Andalusita → sericita y feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son euhedrales y probablemente zonadas pero la alteracion es muy intensa. Hay algunas microquiritas

6- CLASIFICACION

GRANITO CLORITICO CON MOSCOVITA

370 423

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - M
VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 ITL B9097 15 CC Garcia de Figueroa

2.- DATOS DE CAMPO

gravitade de la unidad plutónica de gata. Ladera Norte de la Sierra de gata
Sur de la provincia de Salamanca

3-DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio

4.- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B A
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P A
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 H D L O C R I S T A L I N A M E T E R O G R A F I A L L A R S E R I A D A A L O T R I M O R F A 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, FELDESPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, SERICITA, APATITO,

BERILO, MINERAL ~~DE~~ ARCILLOS ~~DE~~, QUILLO, SILLIMANITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA: Feldespatos $\rightarrow$ sericitas, minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Observaciones
Solo aparecen dos o tres cristales identificados como berilo. Hay algunas
agujas de sillimanita dentro de laminas basales de moscovita

6 - CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 10231TLB9169

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueas

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Jalama. Sudera sur de la Sierra de Fata. Norte de la prov. de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso

4- EDAD

HERCINICO
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA
 154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, SERICITA, BIOTITA, MINERALES-DE-HIERRO, TOPACIO,
 262 315

RUTILO, SILLIMANITA, MINERALX ARCILLOSOS
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Pennina, Rutilo, Feldespato-potásico, sericita, mineral arcilloso
 DEUTERICA intensa: Biotita → pennina + rutilo, o Feldes K.
 " media Feldespatos → sericita y/o minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Solo se ha localizado un cristal de biotita
 la sillimanita se encuentra dentro de algunas laminas de moscovita en agujas

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO
 370 423

ANALISIS QUIMICO
 424

ANALISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 I T L B 9 0 5 7
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad granítica de Santibañez - Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano fino, leucocrático y algo orientado

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA
 154 207
 TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERALES - DE - HIERRO, TOPACIO, RUTILO, APATITO
 262 315
 MINERALAS ARCILLOSAS, SERICITA 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA FUERTE: Biotita → clorita

" DEBIL Feldspatos → Minerales arcillosos y algo de sericita

OBSERVACIONES

El apatito y la sericita son muy poco frecuentes
 La moscovita aparece en grandes laminas paraguilitica
 Las plagioclasas son de An ≈ 10%

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO y BIOTITICO DE GRANO FINO
 370 423

granito de dos micas de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 IT 4 B 9 0 5 6
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CE

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad Agrawítica de Santi Baines - Sierra de Gabar - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de grano fino, leucocrático, orientado

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRIONOMORFA

46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO - POTASICO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

TA 207
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA TOPACIO CIRCON, APATITO, MINERALES DE HIERRO

RUTILO MINERALES ARCILLOSOS, SERICITA

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL: Biotita → clorita

Feldspatos → minerales arcillosos y/o sericita

OBSERVACIONES

La moscovita está en grandes laminas perfoliadas
 La plagioclasa no es muy abundante y muy acida (An ≈ 10)

6- CLASIFICACION

Granito de los milas
 GRANITO MOSCOVITICO y BIOTITICO DE GRANO FINO

370 423
 granito de los milas de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 J T L B 9 0 6 7
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Opria de Fiquera

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Galana. Sudeste sur de la Sierra de Gata - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a fino

4- EDAD

HERCINICA
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIDOMORFA
 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, MOSCOVITA, BIOTI
 154 207

TA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, CIRCON, APATITO
 262 315

RUTILO, MINERAL ~~de~~ ARCILLOSO, SERICITA, TOPACIO
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Alteraciones secundarias: Clorita, rutilo, minerales arcillosos, sericita
 Deuterica debil { Biotita → clorita + rutilo
 Feldespato → minerales arcillosos y/o sericita
 Metacritica debil

OBSERVACIONES

Hay tendencia al porfirismo por desarrollo de largos cristales de feldes
 La sillimanita se encuentra dentro de la moscovita formando agupas bien reconocibles

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS TIPOS

GRANITO MOSCOVITICO y BIOTITICO DE GRANO FINO
 370 423

granito de dos tipos de grano fino

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9175
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jalama. Ladera sur de la Sierra de Gabu, Norte de la prov. de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de color gris y grano fino

4- EDAD

HERCINICO
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA GLOMEROPORFIDICA ALOTRIOMORFA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, FELDSPATO-POTASICO
 154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERALES-DE- Hierro, APATITO, CIRCON, RUTILO, TOPAZIO
 262 315

CLIO, MINERALES ARCILLOSOS
 316 369

Minerales secundarios: Clorita, Rutilo, mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL - Biotita → Clorita + rutilo
 feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El feldspato potásico es poco abundante, es intersticial o constituye un fino fibrocillo y en su mayor parte es microclina.
 Las plagioclasas son zonadas cuando aparecen en cristales mayores. Solo se han efectuado 4 mediciones y se obtienen valores de An = 18-20.
 El carácter glomeroporfidico se debe a las agrupaciones de cristales zonados de las plagioclasas. No obstante hay tambien agrupaciones de biotitas.
 La preparación es sin duda de un enclave microgranuloso que ha sufrido una feldspatización tardía.

6- CLASIFICACION

TONALITA FELDSPATICA DE GRANO FINO
 370 423

ANÁLISIS QUÍMICO
 424

ANÁLISIS MODAL
 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V
 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9170			CC	García de Riquelme
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jalama. En la sierra de Gata. Ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, gneizado grano medio a grueso con débil orientación

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☒
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTÁSICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

VITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, APATITO, SERICITA, MINERALES DE HIERRO, CIRCON, RU

TILO, TOPACIO

Minerales secundarios: Clorita, Rutilo, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA media; Biotita → clorita + rutilo y feldspatos → minerales oxidados

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas. Medidas en el borde dan $Al \approx 8\%$. Pueden tener microcristales en el borde. Sobretodo en contacto con el feldes. K.
 El apatito aparece en cristales mayores de lo corriente

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V ☒ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 IT 689120 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra,
sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono gris, grano grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO-POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCO

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, PENNINA, PINITA, TURMALINA, RUTILO, CIRCON, MINERA

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA { muy intensa: cordierita → pinita y/o, sericita, y andalucita → sericita
media - Biotita → Pennina y rutilo.
Baja - Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y tienen Ab en el borde que suele ser más visible.
La cordierita ha pasado prácticamente toda a pinita y la abundancia
de andalucita es menor que en otras rocas próximas

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370 423

granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL 89119 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la península ibérica
 Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de tono gris, grano grueso y porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46

99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

FELDSPATO - POTASICO, CHARZO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA MOSCO

154

207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, SERICITA, CLORITA, RUTILO, MINERALES DE HIERRO

262

315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica { media: Andaluca → sericita,
 Baja - Biotita → clorita y rutilo, feldspatos → minerales arcillosos

la pinita puede proceder de cordierita.

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y el borde es de Albita con algo de Anorthita.
 La sillimanita esta bien representada a veces dentro de plagioclasas
 sin borde de sericita.

Es interesante un "spot" que aparece en la preparación y caracterizado
 por el menor tamaño de los componentes y la mayor abundancia de
 la biotita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON THERMALINA

370

423

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	JT	LA	9085			CC	Soria de Figueras
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

En el apuntamiento de la Cruz de San Pedro. Ladera sur de la Sierra de Gata
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide de grano grueso a muy grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A A VALORACIÓN - BUENA... B B
- DATACION ABSOLUTA... B 44 VALORACIÓN - PROBABLE... P P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACIÓN - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

FELDSPATO - POTÁSICO CUARZO PLAGIOCLASA BIOTITA MOSCO

154

207

MUSCOVITA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCÁNICAS O SUBVOLCÁNICAS)

PENNINA ANDALUCITA TOPACIO CIRCON RUTILO TURMALINA APA

262

315

TITO MINERALES DE HIERRO SERICITA MINERALES ARCILLOSOS

316

369

ALBITA SILLIMANITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEXTERICA media { Biotita → Pennina y rutilo,
Feldspato → minerales arcillosos,
Andalucita → sericita,

OBSERVACIONES

En la lámina hay un agregado de laminas pequeñas de biotita con cuarzo y opacos que debe representar un "spot" del efusante.

Las plagioclasas son zonadas, en cristales relativamente grandes que dan valores hacia el borde de oligoclasa. Por otro lado hay albita en el feldspato potásico a sí como en el borde de algunas plagioclasas. Hay también mirinequites. La cantidad de moscovita es muy pequeña, y a veces tiene en su interior restos de andalucita.

6- CLASIFICACION

DE DOS FICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

370

423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 JTLB 9087 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuerola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide del apuntamiento de la cruz de San Pedro. Ladera sur de la sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de tono grisáceo de grano medio a grueso

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALLINA HETEROGANULAR PORFIDICA HIPIDROMORFA

46 99
 100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASAS BIOTITA MOSCOVITA

154 207
 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, ALBITA, ANDALUCITA, APATITO, RUTILO, CIRCON, ILMENITA

262 315
 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA MEDIA { Biotita → pennina y rutilo,
 feldspatos → minerales arcillosos,
 andalucita → sericita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y de tendencia euhedral. Además hay Albita con el feldspato o en torno a algunas plagioclasas zonadas. Hay mirimequititas. La turmalina contiene en su interior agujas de sillimanita.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

GRANITO POTASICO CON MOSCOVITA

370 423

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023ITLB9267 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

M.ª Piedad Franco

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Gata. Sierra de Gata. Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide de grano grueso, porfídico, tono amarillento de alteración

4.- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTADIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HIPIDIOMORFICA HOLOCISTALINA PORFIDICA POLIQUILITICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, ORTOSA, MICROCLINA, OLIGOCLASA, ALBITA, BIOTITA, 154 207

MOSCOVITA, CORDIERITA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, CIRCON, RUTILO, SERICITA, PENNA, MINERALIZACION AREI 262 315

LIOSOM, OPACOS, EPIDOTA, LEUCOXENO, MINERALES DE HIERRO 316 369

Minerales secundarios: Sericita, Clorita, Rutilo, Leucoxeno

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTÉRICA

Núcleo de Plag → Sericita

Biotita → Leucita + Rutilo en text. raguitica, ó leucoxeno

Cordierita → Pseudomorfa de clorita + moseovita

OBSERVACIONES

- la preparación contiene un microenclave surmicaceo de 2 micas y cuarzo.
- Hay 2 generaciones de plagioclasas, la 1ª es oligoclasa, normalmente sericitizada e incluida en una 2ª de tipo Albita. A veces la Albita se desarrolla en continuidad optica en el primer cristal de Plag, y continúa la zonación.
- La cordierita conserva el idiomorfismo en algunos casos y está transformada en un agregado de clorita y moseovita que pseudomorfiza las prismas.
- Gran desarrollo de Feldespatho K⁺. Microclina en text. poliquilítica.
- Biotita con inclusiones de Apatito y Circon en desarrollo de halos pleocroicos.
- La moseovita es secundaria, a exp. de cordierita.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO-MOSCOVITICO 370 423

Granito de 2 micas porfídico cordierítico

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1023 IT 609145 15 CC Garcia de Figueroa

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Jalisco. Vertiente sur de la Sierra de Gata. Norte de la prov. de Calles

3.-DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide de color gris, grano fino y sin orientacion aparente

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUBIOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA ALOTRÍMORFA 95

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CHARZO, FELDESPATO-POTÁSICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, MOSCOVI
TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CLORITA, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO, TOPACIO, RUTILO,

MINERALOS ARCILLOSOS, SERICITA

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Clorita, Mineral arcilloso, sericita

dentérica - Paratífica → clorifica

Parabita → clorita
feldespatos → minerales arcillosos y/o sericitas

OBSERVACIONES

SERVACIONES

Las plagioclasas y la microscrita son los componentes de mayor tamaño. Los primeros son en parte zonados y las segundas porfiriticas son mucho menos abundantes que la biotita.

6 - CLASIFICACION DE DOS MICAS

GRANITO APLITICO BIOTITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9146			CS	Spate de Figueras
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jalama. Sierra de Gata. En la ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris de grano fino y con un xenolito

4- EDAD

HIERCINICIA

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☒
- DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina Heterogranular Porfídica Alotriomorfa

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, FELDSPATO - POTASICO

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

MOSCOVITA, SERICITA, CIRCON, SILIMANITA, CLORITA, MINERAL

262

315

LES-DE-HIERRO, APATITO, TOPACIO

316

369

Minerales secundarios: Sericita, Clorita, ~~Feldspato~~, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA FUERTE - Silimanita → sericita
Débil Biotita → clorita - y feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

El carácter porfídico se debe a cristales grandes de plagioclasa (en gran parte alipo-
clasa) el feldes K es intersticial y está muy desigualmente repartido
según la clasificación de Streckeisen debe considerarse como granodiorita ya que hay bastante
feldespato potásico
El xenolito está constituido por laminae de biotita alternando con bandas de
sericita. En estas se encuentra algo de silimanita que probablemente
formaba arcos poligonales.

6- CLASIFICACION

GRANODIORITA BIOTITICA

370

423

granodiorita de grano fino, biotítica

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
HIPOBISAL - H ☐
VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9151			CC	gracia de Figueroa
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jalama. Sierra de Gaba. En la ladera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTIGRAFICA... A	- BUENA... B
	- DATACION ABSOLUTA... B	VALORACIÓN - PROBABLE... P
	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- DUDOSA... D
	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, SERICITA, CIRCON, LEUCOXENO, MINERALES DE HIERRO

262 315

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL: Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

la plagioclasa es albina.
El rutilo solo aparece en agujas dentro del cuarzo. solo se han visto dos o tres cristalitas de apatito

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO

370 423

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	1	5	7	9	13	15	19
						CC	Gertra de Figuevala

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Salama. Sierra de Gaba. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, amarillento, de grano medio, porfídico.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA CATACLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, CLORITA, MOSCOVITA

TA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TOPACIO, BIOTITA, LEUCOXENO, CIRCON, RUTILO, APATITO, SERICITA

TA, MINERAL ~~ARCILLOSO~~, MINERALES-DE-HERRO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Clorita, mineral arcilloso
 DETERICA / muy intensa - Biotita → clorita
 intensa → Feldespatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La muestra tiene, en parte, textura catactasica sobre la que se han desarrollado laminas de clorita.

La plagioclasa, cuando menos en parte es una albíta de $Al \approx 8\%$.
 Se considera esta roca como un granito en vías de Episenitización

6- CLASIFICACION EPISENITIZADO

GRANITO CLORITICO CON MOSCOVITA

granito de grano medio porfídico algo episenitizado

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 489158

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueirola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Fátima. Sierra de Gata. En la ladera sur
 Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano grueso

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, MOSCOVITA, BIOTITA, PLAGIOCLASA

SLA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, TOPACIO, SILIMANITA, SERICITA, CLORITA, CILCON

LEUCOXENO, MINERALES-DE-HIERRO, APATITO

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Sericita, ~~Biotita~~, Clonita

DETERICA DEBIL - Silimanita → sericita. y Biotita → Clonita.

OBSERVACIONES

La cantidad de plagioclaso no es muy grande y está mal repartida en la preparación.
 Hay mucha turmalina que incluye a la sillimanita así como al feldespato-potásico.
 También es muy alta la cantidad de Topacio.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

granito de dos micas con sillimanita y Turmalina.

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 489165

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figueirola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En su ladera sur - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático, algo rosado, de grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA ALOTRIOMORFA CA

TACLAISTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, MOSCOVITA, BIO

TITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, CLORITA, TOPACIO, CIRCON, APATITO, SILLIMANITA,

MINERALES-DE-HIERRO, MINERALES ARCILLOSOS

Minerales secundarios: sericita, clonita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

ENTERICA intensa. sillimanita → sericita; biotita → clonita y Feldespatos →
 → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

A algunas plagioclases, que se consideran oligoclasa acida, tienen un fino reborde de Ab.

Hay muy poca sillimanita

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

granito de dos micas con sillimanita

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCÁNICA - V 426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 I T A B 9 1 6 6 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Riquelme

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Salamanca. Sierra de Gata. En el eje orográfico de la misma. Sur de la provincia de Salamanca.

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático de grano medio a grueso

4.- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

Holocristalina heterogranular seriada alotriomorfo

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO POTASICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

THAMALINA, BIOTITA, CLORITA, SERICITA, TOPACIO, MINERALES

DE- Hierro, CIRCON, APATITO, MINERAL ARZILLOSO

Minerales secundarios: Clorita, mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterica media: Biotita → clorita y feldspatos → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

La plagioclasa se identifica como albita acida.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO MOSCOVITICO CON BIOTITA

Granito de dos micas con thamalina

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 IT 6B9171

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

15

19

C.C. García de Figuearó

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En la ladera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granitoide leucocrático, algo grisáceo de grano medio a grueso y porfídico

4.- EDAD

HERMINICHO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTÁSICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA

MITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, SERICITA, MINERAL X ARCELLOSOS, CIRCON, RUTILO, MI

NEFELITAS-DE-HIERRO, CLORITA, TOPACIO

Minerales secundarios: Mineral arcilloso, clorita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA. Media - feldspatos → minerales arcillosos
 Débil Biotita → clorita.

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas.
 Hay abundantes, grandes cristales de apatito

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9172

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Carmona

2.- DATOS DE CAMPO

Granitoides de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Jálama. En la ladera sur.
 Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, APATITO, TOPACIO, OPACOS, CLORITA, RUTILO, SERICITA

TA, MINERALES DE HIERRO, CHOLINITA

Minerales secundarios: Clorita, Sericita, opacos, rutilo

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deterioro: Intensa - Plagioclase → Sericita
 Debil - Biotite → Clorita ± (opaco, rutilo)

OBSERVACIONES

El tamaño de los minerales varía gradualmente de los mayores a los mas chicos. Los de mayor tamaño son plagioclase y microcline porquiriticos.

La plagioclase presenta un zonado difuso, pero en composicion varia poco de borde a centro siendo siempre albitico. Su alteracion es mas intensa en los nucleos. En algunos bordes, en contacto con feldspars se observan mirmequitas.

La microcline presenta un sistema de pestitas tipo "vein perthite" y otros a modo de parches de albita "patch perthite".

Se observan algunas micas dobladas

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

GRANITO DE DOS MICAS

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
10235T L B 9173

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

19

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Jarama sur de la Sierra de Gata. N. de la prov. de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide gris de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIOMORFA

46

99

100

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154

207

VITA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

PENNINA, CIRCON, APATITO, RUTILO, MINERALES-DE-HIERRO, TURMALINA, TOPACIO, SERICITA, MINERAL ARCILLOSO

262

315

Minerales secundarios: Pennina, mineral arcilloso, sericita

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL: Biotita → pennina

Feldspato → minerales arcillosos y/o sericita

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonadas y con tendencia euhedral y en algunas el borde es albizo.

Algunos apatitas dan halos pleocroicos

solo se ha localizado dos o tres cristales pequeños de turmalina.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO Y MOSCOVITICO

370

425

Granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO

424

ANALISIS MODAL

425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuear

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad plutónica de Salamanca. Sierra de Gata. En su ladera sur
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo, de grano grueso, porfídico y con orientación

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

B

P

D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA ALOTRIOMORFA

46

99

100

153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCO

154

207

VITA

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, APATITO, LEUCOXENO, CLORITA, RUTILO, CIRCON, MINERAL

262

315

MINERAL-DE-HIERRO, TOPACIO, MINERAL-DE-ARCILOSOS

316

369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL

Biotita → clorita + rutilo

Feldspato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

Las plagioclasas son zonales

El felds. K en fenocristales engloba los de mas componentes

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MORGANITA

370

423

granito porfídico de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTONICA - P

HIPOBISAL - H

VOLCANICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1 0 2 3 J T L B 9 1 7 7 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

García de Figuearola

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En la badera sur. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

granitoide leucocrático algo grisáceo, grano grueso y porfídico

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA ALOTRIONOMORFA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA 100 353

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASAS, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

VITA 208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SERICITA, TURMALINA, APATITO, CIRCON, LEUCOXENO, TOPACIO, MICA 262 315

MINERALES DE HIERRO, CLORITA 316 369

Minerales secundarios: Clorita, mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

DEUTERICA DEBIL: Biotita → clorita y feldespato → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

las plagioclasas estan muy debilmente zonadas. Es en su mayor parte oligoclasa acida pero hay tambien AB

6- CLASIFICACION DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO CON MOSCOVITA 370 423

Granito de dos micas con turmalina.

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

426

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL B 9179
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 A. Carricero

2.- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de falanca. Sierra de Gata. En la ladera Sur
 Norte de la provincia de Cáceres

3.- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, grano medio

4.- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR ALOTRIO MORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, CLARCON, OPAIDOS, TOPACILO, CLORITA, SERICITA, CAOLINITA

TA, MINERALES DE HIERRO

Minerales secundarios: Clorita, Feldespato-Potásico, Sericita, Caolinita

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Denterice / Biotita → clorita + feldes K. - relativamente Intense
 Plagioclasa → sericita - Intense
 Feldes K → caolinita - Debil

OBSERVACIONES

Parte del feldes K, es secundario, procede de la cloritización de la biotita
 La moscovita ha crecido de forma blástica, tardía, englobando a los
 demás minerales. También ocupa pequeñas figuras de la roca.

6.- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSICA - H
 VOLCÁNICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9182			CC	Q. Carriazo
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Jata. En la ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas, de grano medio, porfídico.

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	VALORACION - PROBABLE... P
		- DUDOSA... D
	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, TURMALINA, APATITO, TOPACIO, OPACOS, CLORITA, RUTILO

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterice: Moderada: Plagioclasa → sericita + min. arcillosos
 Debil: Biotita → clorita + rutilo + feldsp

OBSERVACIONES

Las plagioclasas tienen un zonado debil y difuso, con los núcleos mas alterados. En las zonas en que la plagioclasa está mas fresca, hemos medido 6% An, es decir es albita, aunque es probable que en el núcleo llegare a oligoclasa ácida. En los bordes de contacto con feldsp se desarrollan pequeñas mirmequitas.

La sillimanita en su variedad Fibrolita, se encuentra formando finos apilados en cristales de moscovita, plagioclasa y cuarzo.

Una pequeña parte del feldsp, procede de la cloritización de la biotita

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotitico Moscovitico

370 423

Granito de dos micas

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9183			CC	A. Carriero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granibande de la Unidad plutónica de Jalama. Sierra de Gata. En su ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos unicas de grano medio, heteropranular.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADA HIPIDIDOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, TURMALINA, APATITO, TOPACIO, CIRCON, CLORITA, RUTILO

262 315

UTILLO, MINERALES-DE-HIERRO, OPACOS

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, clorita, Pennina, Rutilo, Feldespatos-Potásico
Dentérite { Intense: Plagioclasa → sericita y min. arcillosos
Intense: Biotita → clorita (pennina) + rutilo + feldes K

OBSERVACIONES

Al igual que las muestras anteriores la fibrolita está incluida en moscovita, cuarzo y plagioclasa.

Hay cristales grandes de turmalina con pleocroismo pardo-amarillento
La textura es seriada, los tamaños de los cristales varían gradualmente
los mayores corresponden a feldes K. periquilítico

6- CLASIFICACION

DE DOS UNICAS

GRANITO B I O T I T I C O M O S C O V I T I C O

370 423

Granito de dos unicas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9186 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

Q - Caruicero

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Jálama. Sierra de Gata. En su ladera sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos unicas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCALISTALINA HETEROGRANULAR HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, TURMALINA, CIRCON, XENOTIMA, APATITO, TOPAZIO, 262 315

OPACOS, CLORITA, RUTILO, SERICITA, CAOLINITA 316 369

Minerales secundarios: Sericita, mineral arcilloso, moscovita, Clorita, Rutilo, Feldespatos - potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica Intense: Plagioclase → Sericita + minerales arcillosos ± Moscovita
Moderada: Biotita → clorita + rutilo + feldes K

OBSERVACIONES

Los tamaños de grano son muy variables, los cristales mayores son de microcline poiquilitice

La sillimanita (fibrolita), como en muestras anteriores aparece en agregados incluida en otros minerales, fundamentalmente en moscovita.

En algunos sitios parece hay una moscovitización a partir del feldes K incluso se ven pequeños fragmentos de microcline aun sin digerir en la moscovita, próximos al borde de contacto con el feldes K.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico 370 423

Granito de dos unicas

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9189 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CC

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

9. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

frontera de la Unidad plutónica de Gálama. Sierra de Gata. En su ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micras de grano medio

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR HIPIDIMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, APATITO, TOPACIO, CIRCON, OPACOS, MINERALES DE 262 315

316 369

Minerales secundarios: Clorita, Rutilo, Feldespato-potásico, Sericita, Mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentífrica

Muy intensa: Biotita → clorita + rutilo + felds K

Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos

Moderada: Microclina → minerales arcillosos

OBSERVACIONES

No tiene carácter porfídico, sin embargo la diferencia de tamaños de grano es notable. Los cristales mayores son de microcline y algo menores de plagioclase y moscovita.

La biotita está cuantitativamente subordinada a la moscovita y casi totalmente cloritizada.

Hay numerosas pequeñas fracturas con minerales de hierro, otras por donde progresa la sericitización de los feldspatos.

Sillimanita fibrolítica, muy escasa.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GAAMITO MOSCOVITICO BIOTITICO 370 423

Granito de dos micras

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - M
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITLB	9190				CC	A. Carriero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Galana, Sierra de Galana, en su ladera sur.
Norte de la provincia de Cáceres.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio, porfídico

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
- DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACIÓN - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, TOPACIO, CIRCON, AMATASA, OPACOS, MINERALES DE HIERRO

262 315

316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clorita, Rutilo, Feldespatos - potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Intense: Plagioclasa → Sericita + min. arcillosos
Debil: Biotita → clorita + rutilo + feldes K
Debil: Microcline → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Durante el proceso de cloritización de la biotita, además de clorita y algo de Feldes K, se forma rutilo relictivo que se encuentra a veces fuera de la biotita, en los minerales próximos.

Hay numerosas pequeñas fracturas por donde se inicia el proceso de alteración de todos los minerales que atraviesa: feldes K, plagioclasa, biotita, incluso el topacio. Algunas están rellenas por minerales de hierro, otros por sericita.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micas.

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
HIPOBISAL - H ☐
VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9191			CC	A. Caruicero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jálama. Sierra de Jálama. En su ladera Sur Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR SERIADA HIPIDIMORFA

46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

TURMALINA, APATITO, TOPACIO, CIRCÓN, CLORITA, RUTILO, SERICITA

262 315

316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clonita, Rutilo, Feldespato - potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica { Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
Intensa: Biotita → clorita + rutilo + feldes k
Moderada: Microclina → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Se distinguen pequeñas fracturas con minerales de hierro y otras con sericita si están cristales de feldespato.

Hay una sección basal de feldespato que muestra una textura Rapakivi; con un núcleo de feldes k peritizado (patch peritite) y sericitizado, rodeado por una orla de feldes k sin sericitizar, todo rodeado por una estrecha zona de plagioclase alterado a sericita de pequeño tamaño y por último una zona albítica sin apenas alteración. En el resto de los cristales de feldespato no se observa esto.

Los cristales mas grandes son de microcline pero no de lugar = textura porfídica.

Medida la plagioclase, es de un 8% An.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micas

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9192 13

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
SA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
A. Caruicero

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la Unidad de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra.
sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio, porfídico

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA APATITO TOPACIO CIRCON OPACOS SERICITA CAOL

262 315

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica { Intense : Plagioclasa → sericita + min. arcillosos
Débil : Feldest → min. arcillosos
Débil : Biotita → clorita + rutilo + feldest.

OBSERVACIONES

La textura porfídica le forman grandes cristales de microcline con macle de Carlsbad con partitas "vein". En los dos mas grandes que aparecen en la lámina se observa un borde de reacción con formación de microclinitas en el feldest y posterior crecimiento de éste. En otro cristal algo mas pequeño en un extremo de la lámina puede verse textura Rapakivi aunque el cristal no está completo.

La biotita domina cuantitativamente sobre la moscovita

Solo hemos visto un pequeño cristal de andalucita en una moscovita.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO PORFIDICO

370 423

Granito de dos micas porfídico

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL B 9194 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A. Carrascero

2- DATOS DE CAMPO

granitoide de la unidad plutónica de Gata. Sierra de Gata. En la penillanura charra
 Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

ANDALUCITA, DAMOURITA, APATITO, TOPACIO, CIRCON, ESFENA, OPA 262 315

316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clorita, Rutilo, Feldespatos potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica Intensa: Plagioclase → sericita + min. arcillosos
 Débil: Biotita → clorita + rutilo + feldes K
 Débil: feldes K → min. arcillosos

OBSERVACIONES

En esta lámina, se observan numerosas cristales de andalucita en los que se distinguen dos procesos diferentes. Por una parte un proceso de moscovitización, es decir formación de moscovita a partir de andalucita y por otra parte damouritización de la propia andalucita, que queda así alterada dentro de la moscovita.

Los megacrismos de feldes K dan carácter porfídico y porfídico a la roca.

Entre los cristales de cuarzo hay un pequeño agregado redondeado de moscovita y clorita que probablemente proceda de una cordierita de pequeño tamaño.

6- CLASIFICACION DE DOS MICAS

GRAMITO BIOTITICO MOSCOVITICO PORFIDICO 370 423

Granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9195 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Carancero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la unidad de Gata Sierra de Gata. En la península
 Ibérica. S. de la Provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio leucocrático.

4- EDAD

HERCINICA 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR PORFIDICA HIPIDIOMORFA 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, APATITO, TOPACIO, CIRCÓN, OPAcos, CORDIERITA, 262 315

316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clinzoisita, Rutilo, Clonita, Feldespato potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dutérice

Intense: Plagioclase → (sericite + minerales arcillosos ± clinzoisita)

Moderada: Biotita → clorita + rutilo + feldes K

Débil: feldes K → minerales arcillosos.

OBSERVACIONES

Consideramos cordierita el pseudomorfo de este mineral por un agregado
 de clorita + moscovita. Se encuentran varios en esta lámina.

La sillimanita (fibrolita) es muy escasa.

Se observan finas virreyitas en las plagioclases en contacto con feldes K.

Aunque en la alteración de la plagioclase aparecen pequeños cristales
 de clinzoisita, es oligoclase ácida, no supera en ningún caso el
 20% de An.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico 370 423

Granito de dos micas porfídico

ANÁLISIS QUÍMICO 424

ANÁLISIS MODAL 425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITLB 9203 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Talaue. Sierra de Gato.
 En la ladera Norte. S. de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito aplítico

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA EQUIGRANULAR ALOTRIONOMORFA GRANO FINO 46 99

100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA 154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

BIOTITA, OPHCOS, APATITO, CIRCON, SERICITA, CAOLINITA, MINER 262 315

ALES-DE-HIERRO 316 369

Minerales secundarios: Sericita, mineral arcilloso

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Debil Feldspatos → Sericita + min. arcillosos

OBSERVACIONES

Es una roca aplítica, granular, moscovítica, en la que éste mineral y sericita aparecen como intersticiales, rodeando al cuarzo y los feldspatos. La roca está tectonizada, se ven cristales rotos y otros de única, doblados. En algunas zonas, el cuarzo tiene aspecto de "en mortero".

6- CLASIFICACION

GRANITO MOSCOVITICO DE GRANO FINO 370 423

Granito aplítico

ANALISIS QUIMICO 424

ANALISIS MODAL 425

PLUTONICA - P
 HIPOBISAL - H
 VOLCANICA - V 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	LB	9204			SA	A. Curricero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jálame. Sierra de Gato
En la ladera Norte - Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos unicas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTADISTICA	A	VALORACIÓN - BUENA	B
- DATACION ABSOLUTA	B	- PROBABLE	P
- DATACION PALEONTOLOGICA	C	- DUDOSA	D
	44		45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR ALOTRIMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, CIRCON, OPACOS, TOPACIO, MINERALES DE HIERRO, CLORITA

262 315
316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clorita, Rutilo, Feldespatos potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica

Intensa: Plagioclasa → sericita + min. arcillosos
Intensa: Biotita → clorita + rutilo + feldespatos

OBSERVACIONES

La roca está tectonizada, se observan minerales rotos, otros como los de unicas, doblados.

Algunos feldespatos presentan texture "Kapakivi" con núcleos de microclina rodeados de plagioclasa

6- CLASIFICACION

DE DOS UNICAS

GRANITO Biotítico Moscovítico

370 423
Granito de dos unicas tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITL	B	9207			SA	G. Caruicero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Tálame. Sierra de Gata.
En la ladera Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos unidades de grano medio

4- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☒
- DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACION - PROBABLE... P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR HIPIDIO MORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, TOPACIO, CIRCON, SILIMANITA, CORDIERITA, OPACOS

262 315
316 369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clorita, Rutilo, Feldespatopotáico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deutérica: Intense: Plagioclase → sericite + min. arcillosos
Intense: Biotite → clorita + rutilo + feldes K
Débil: Feldes K → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Como en la lámina anterior -9206- la sillimanita solo se encuentra en moscovitas que forman agregados, aunque en esta lámina la cantidad de sillimanita es mucho menor.

Formas prismáticas y redondeadas, seguramente corresponden a cordierite pseudomorfizada por clorita + moscovita.

En algunos cristales de feldespato se observa textura "Rapakivi", pero otros quedan como vetas de feldes K dentro de cristales bien formados de plagioclase, como un proceso generalizado de albitización.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO Biotitico Moscovitico

370 423

Granito de dos unidades tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424 ANALISIS MODAL ☐ 425
PLUTONICA - P ☒ HIPOBISAL - H ☒ VOLCANICA - V ☒ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	IT	2B	9208			SA	A. Caruicero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Estalve - Sierra de Gata
En la ladera Norte - Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micras de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACIÓN - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACIÓN - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C VALORACIÓN - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRANULAR SERIADO HIPIDIO MORFA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARTZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

154 207

208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, TOPACIO, CLACON, OPA COS, CLORITA, RUTILO, SERICITA

262 315

CAOLINITA, MINERALES DE HIERRO

316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

OBSERVACIONES

Medida la plagioclasa, nos da un 57% de An., pero puede variar algo ya que presenta una ligera y difusa zonación.

Algunos feldespatos, de los de mayor tamaño, presentan textura "Kapakivi".

Es probable que haya alguna cordierita, alterada, pero no está muy clara.

La roca está tectonizada; en las fracturillas hay minerales de hierro y en algunos casos sericita.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

370 423

Granito de dos micras tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
HIPOBISAL - H
VOLCANICA - V

P 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1023	ITL	B	9209			SA	A. Carricero
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Talame. Sierra de Gata
En la ladera Norte. Sur de la provincia de Salamanca.

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micras de grano medio

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ VALORACIÓN - BUENA... B ☒
- DATACION ABSOLUTA... B ☒ VALORACIÓN - PROBABLE... P ☐
- DATACION PALEONTOLOGICA... C ☐ VALORACIÓN - DUDOSA... D ☐

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR HIPIDIMORFA

46 99
100 153

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCCLINA, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTITA

154 207
208 261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

APATITO, TOPACIO, CIRCON, OPACOS, MINERALES DE HIERRO, CLOR

262 315
316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Deuterice y Intense: Biotita → clorita + rutilo + feldes K

Moderade: Plagioclase → min. arcillosos + sericita

Debil: Feldes K → min. arcillosos

Minerales secundarios: clorita, rutilo, feldes potasio-potásico, mineral arcilloso, sericita

OBSERVACIONES

El contenido en An de la plagioclase es de un 7%. No está muy alterada pero sí afectada por fracturas con abundantes minerales de hierro.

Hay grandes cristales de topacio fracturado y un principio de alteración que comienza a partir de esas fracturas.

6- CLASIFICACION

GRANITO DE DOS MICAS

370 423

Granito de dos micras alterado y tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 424

ANÁLISIS MODAL ☐ 425

PLUTÓNICA - P ☒
HIPOBISAL - H ☐
VOLCANICA - V ☐ 426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1023 ITL B9210 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 SA 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 Q. Carricero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jalame. Sierra de Gata
 En el lado Norte. Sur de la provincia de Salamanca

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano medio

4- EDAD

HERCINICO 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGRAANULAR HIPIDIO MORFA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA 154 207

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, APATITO, TOPACIO, OPACOS, CIRCON, CLORITA, RUTIL 262 315

LO, SERICITA, MINERALES DE HIERRO, CAOCINITA 316 369

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentrice Intense: Biotita → clorita + rutilo + feldsp
 Debil: Plagioclase → sericite + min. arcillosos
 Debil: Feldsp K → min. arcillosos

Minerales secundarios: Clorita, Rutilo, Feldspato-potásico, Sericita, Mineral arcilloso

OBSERVACIONES

La roca está tectonizada, con los feldspatos rotos, cuarzo con extinción ondulante, en algunos sitios textura "en mortero", las micas dobladas sillimanita (fibrolite) hay poca, se encuentra en moscovita, también en cuarzo. El accesorio topacio forma grandes cristales, rotos, algo alterados. En las fracturillas originadas por la tectonización hay minerales de hierro, también sericita en algunas de ellas.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO B1 OTITICO MOSCOVITICO 370 423

Granito de dos micas tectonizado

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P
 HIPOBÁSAL - H
 VOLCÁNICA - V

P

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 0 2 3 ITL B 9 2 1 3
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CC
 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

G. Carrilero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad plutónica de Jalame. Sierra de Gato. En el lado Norte - Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano fino

4- EDAD

HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN

- BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOMOGENEA, CRYSTALLINA, HETEROGRANULAR, HIPIDIOMORFA

46

99

100

COMPOSICION MINERALOGICA

153

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, Biotita, MOSCOVITA

154

207

208

261

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, ANDALUCITA, APATITO, CIRCON, OPACOS, TOPACIO,

262

315

CLORITA, RUTILO, SERICITA, CAOLINITA

316

369

Minerales secundarios: Sericita, Mineral arcilloso, Clonita, Rutilo, Feldespato-potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica

Intense: Plagioclase → sericite + min. arcillosos

Débil: Biotita → clorita + rutilo + feldes k

Débil: Feldes k → min. arcillosos

OBSERVACIONES

Gran parte de los cristales no supera el tamaño de 1 mm, por eso en la clasificación decimos: de grano fino a medio.

La andalucita se encuentra dentro de cristales de moscovita, formada a expensas de la primera. Lleva asociado sillimanita que además de en moscovita se encuentra en cuarzo y en plagioclase.

La plagioclase está zonada de forma difusa, siendo los núcleos los más afectados por procesos de sericitización.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GABRILO Biotítico MOSCOVITICO

370

423

Granito de dos micas de grano fino a medio

ANÁLISIS QUÍMICO

424

ANÁLISIS MODAL

425

PLUTÓNICA - P

HIPOBÁSAL - H

VOLCÁNICA - V

426

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1023 ITLB 9214

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

ec

A. Carriero

2- DATOS DE CAMPO

Granitoide de la Unidad de Salame. Sierra de Gata
En la ladera Norte. Norte de la provincia de Cáceres

3- DESCRIPCION MACROSCOPICA

Granito de dos micas de grano fino

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION EST: ATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACIÓN - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

HOLOCRISTALINA HETEROGANULAR SERIADA DE GRANO MEDIO A FINO HIPIDIOMORFA

COMPOSICION MINERALOGICA

MINERALES PRINCIPALES (FENOCRISTALES, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

CUARZO, MICROCLINA, PLAGIOCLASA, BIOTITA, MOSCOVITA

MINERALES ACCESORIOS (MATRIZ, SI SE TRATA DE ROCAS VOLCANICAS O SUBVOLCANICAS)

SILLIMANITA, APATITO, CIRCON, OPACOS, TOPACIO, CLORITA, RUTIL

LO, SERICITA, CAOLINITA, MINERALES DE HIERRO

Minerales secundarios: Sericita, Caolinita, Clonita, Rutilo, Feldespatos - potásico

ALTERACIONES (TIPO Y GRADO)

Dentérica

Intense: Plagioclase → sericita + caolinita

Débil: Biotita → clorita + rutilo + feldes +

Débil: Feldes K → mica amarillosa

OBSERVACIONES

Los tamaños de grano varían bastante, siendo los feldespatos de mayor tamaño los que tienen formas más tendientes al idiomorfo. Los cuarzos y todos los de tamaño fino son xenomorfos.

Algunas moscovitas presentan un extenso borde fibroso resultado de reacción.

La plagioclase es ácida, con muy ligera zonación y los núcleos bastante alterados.

6- CLASIFICACION

DE DOS MICAS

GRANITO BIOTITICO MOSCOVITICO

Granito de dos micas de grano fino a medio

ANÁLISIS QUÍMICO

ANÁLISIS MODAL

PLUTÓNICA - P
HIPOBÁSAL - H
VOLCANICA - V

P