

-20593

EMPRESA NACIONAL ADARO

ENADIMSA

3023ADJE 7 a 24

Todas las muestras
llevar "L"

ESTUDIO MICROPALSONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE SIETE
MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE CUEVAS DE VINROMA

Informe núm. 784

DIRECCION TECNICA
ESTRATIGRAFICA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Octubre 1972



EMPRESA NACIONAL "ADARO"
DE
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES
TELEFONO 237 17 00

24 de Octubre de 1972

784
INFORME N.º

ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE SISTEMAS
MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE CUEVAS DE VINROMA

23
30-23 AD-JE 00056.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Equinodermos

Ostrácos

Dorothia hechti

Patellina sp.

Valanginiense-Aptense

Portland-Valang

30-23 AD-JE 0007.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Equinodermos

EL JEFE DEL LABORATORIO

tubos calizos de Algas

Spirillina sp.

Patellina aff. *suboretacea*

Lenticulina sp.

Haut-Barrem

30-23 AD-JE 0008.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Patellina aff. *suboretacea*

Sabaudia (entre ellas *S. minuta*)

Cheffatella decipiens

Textularia foeda

Hauteriviense-Bedouliense Haut-Barrem

(probable Barremiense por la abundancia de *Ch. decipiens*)

30-23 AD-JE 0009.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Patellina cf. *suboretacea*

Sabaudia minuta

Orbitolina (*Mesorbitolina*) ex. gr. *texana*

Cyclammina

Albense-Albense

(probable Gargasense)

Gargas - Alb inf.

30-23 AD-JE 0010.-

El residuo de levigación está formado en su casi totalidad por cuarzo.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada

(Albense por su posición estratigráfica)

¹¹
30-23 AD-JE ~~11~~.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas arenosa.

Se determinan:

Patellina subretacea

Sabaudia sp.

Ammonaculites aff. wenonahae

Pseudocyclammina sp.

probable Albense

(Albense superior-Cenomanense por la posición estratigr)

Alb.

24

30-23 AD-JE 1~~a~~. -

BB
El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Orbitolina (Mesorbitolina) ex. gr. texana

Aptense-Albense

(probable Gargasienne)

~~Albense - Casem.~~

Gargas