

2002.- Aspecto general de las facies "Weald".



2010.- Techo de la serie "Weald" y base de la serie "Paraurgoniana".



2048.- Intraesparita. Detalle de un nivel bioclástico, en el que pueden observarse las secciones de los fósiles.




2056.- Intrabiomicrita parcialmente recristalizada. Aspecto general masivo, donde se insinúa una mala estratificación incipiente.




2058.- Intrabioesparita. Estratificación irregular con aspecto ligeramente masivo, lumaquélica.



2060.- Intrabiomicrita arenosa. Planos de estratificación bien marcados, donde se observa estratificación cruzada incipiente bien marcada.




2066.- Caliza recristalizada nodulosa con abundantes margas blancas a crema claro.



2068.- Micrita fosilífera recristalizada, masiva



2070.- Micrita fosilífera masiva. Al fondo, el núcleo del sinclinal y el pantano del río Mijares,



2074.- Intramicrita, aspecto masivo, estratificación irregular.




2076.- Micrita fosilífera recristalizada. Aspecto masivo, estratificación irregular y discontínua, o ausente.



2079.-Micrita algo arcillosa, estratificación marcada pero irregular, localmente biostromal.



2081.- Bioesparita. Aspecto masivo, estratificación mal marcada, localmente biostromal.



2083.- El Pas de Fulla. Discordancia angular entre el Palógeno (¿) plegado a la izquierda y el Neógeno horizontal a la derecha.



2084.- El Pas de Fulla. Detalle de los conglomerados poligénicos del Neógeno.




2095.- El Pas de Fulla. Lentejones e interdigitaciones de conglomerados y areniscas limosas hacia el techo de la serie Neogena.



2113.- Corte de onda. Paleocanal de conglomerados erosionando areniscas y limonitas.




2116.- Corte de onda. Detalle de la base de un canal de conglomerados.



2117.- Corte de onda. Detalle del final lateral de un canal de conglomerados bajo areniscas limosas.




2121.- Corte de onda. Nivel de arenas limosas sobre un canal conglomerático y erosionando a su vez por otro canal - de conglomerados. Obsérvese las huellas de erosión ba_ sales.



2122.- Corte de onda. Detalle de los conglomerados poligénicos del Paleógeno. (¿).



2124.- Corte de onda. Borde lateral de un canal de conglomerados entre areniscas limosas.



2133.- Corte de "El Faraón". Aspecto general del Cretácico inferior.



2134.- Aspecto general d el Cretácico inferior en las proximidades del río Mijares.



2135.- Corte El Plano. Aspecto general de la serie Neógena, desde Geldo.




2143.- Corte El Plano. Arcillas rojas con niveles de areniscas y conglomerados.



2144.- Corte El Plano. Areniscas calcáreas, microconglomeráticas con cantos dispersos.



2146.- Corte El Plano. Calizas arcillosas, mal estratificadas, cavernosas.



2149.- Corte El Plano. Conglomerado poligénico calcáreo.




2166.- Corte El Plano. Calizas superiores, arenosas, con cantos dispersos.




En primer término Keuper. Al fondo, calizas dolomíticas, masivas, de color oscuro. Detrás calcarenistas, microcristalinas pisolíticas, de color gris del Kimmeridgiense med-sup.
Ayodar




Detalle Dogger. Malm de Ayodar.



En primer término: Keuper sobre el que se apoyan calizas dolomíticas, masivas del Lías inferior. Al fondo calcarenitas microcristalinas, pisolíticas del Kimmeridgiense medio-sup.? Ayodar.



Capas de paso calloviense Oxfordiense. Junto al martillo, 0,20 m. de calizas con oolitas ferruginosas.
(SE. Ayodar).



Li-Pi - Lías inf.
Pliensbach. (parte)

P S - Pliensb. Sup. (=Domeriense)

T - Ki - Toacciense
Kimmeridg. inf.


Km. - Kimmeridg. med.




Vista general del Dogger y Malm de Ayodar.



A la izq. calizas dolomíticas masivas del Lías inferior. A la derecha calizas masivas del Bathoniense?
(SE Ayodar)



En primer término, calizas dolomíticas, masivas del Lías inferior. Al fondo calcarenitas microcristalinas, gris claro, del Kimmeridgiense y medio-sup.?
(SE Ayodar).



Contacto entre el Keuper y las calizas dolomíticas, brechoideas, masivas del Lías inferior
Ayodar




Detalle Dogger. Malm de Ayodar.



A la izquierda, cubierto por vegetación: "vitmita" del Kimmeridgiense inferior. En el centro : Capas de paso Dogger malm. La hoz del río, corta el resto del Dogger.
(SE. Ayodar)




En primer término calizas dolomíticas masivas del Lías inferior. Al fondo calcarenitas microcristalinas, gris claro del Kimmeridgiense medio-sup.
(SE. Ayodar).




Detalle Dogger y Malm de Ayodar.




Calcarenitas microcristalinas, con nódulos de silex interestratificados. Edad: Aaleniense-Bajociense.
Gaibiel.



Pliegue en calizas del Kimmeridgiense inferior. S. Gaibiel.



A la izquierda calizas bioclásticas del Pliensbachiense Superior C = Domeriense). En el centro, margas con intercalaciones calcáreas del Toarciense (tramo muy reducido. A la derecha, calizas tableadas del Lías superior y Dogger, con nódulos de silex.
S. Gaibiel.



Calcarenitas microcristalinas con nódulos de silex interestratificados.
Edad: Aaleniense? - Bajociense.
S. Gaibiel.



Margas con intercalaciones de calizas tableadas-Toarciense. S. Gaibiel.



En primer término: Calizas masivas, oquerosas en la base, del Lías inferior-Phiensbachiense (parte) apoyadas sobre el Keuper. Al fondo calizas pisolíticas, con pequeños nódulos de silex, del Kimmeridgiense inferior-medio.
S. Gaibiel.




Margas con intercalaciones de calizas tableadas. Toarciense. S. Gaibiel.



A la Izq. Cal. bioclásticas del Pliensbachiense. Superior C = Domeriense). A la derecha capas de paso al Toarciense. S. Gaibiel.




Detalle Pliensbachiense sup. C = Domeriense). Mard Ground.
S. Gaibiel.



K - Keuper
Li-Pi - Lías inf.- Pliensbach. (parte)
Ps-Ki - Pliensbach. sup.- Kimmeridg. inf.
Km. - Kimmeridgiense medio
S. Gaibiel.



Calizas del Kimmeridgiense. Estratificación cruzada. Cola del Pantano del Regajo, Ctra. de Gaibiel.



Calizas del Kimmeridgiense- Estratificación cruzada. Cola del Pantano del Regajo, Ctra. de Gaibiel.



Detalle de la "Ritmita" del Kimmeridgiense inferior-Puente sobre la Rambla de Peña. Ctra. de Gaibiel.



Pliegues en la "Ritmita" del Kimmeridgiense inferior.
S. Gaibiel.



Detalle de la "Ritmita" de Kimmeridgiense inferior. Puente sobre la Rambla de Peña. Ctra. de Gaibiel.



Calizas pisolíticas del Kimmeridgiense medio. Puente sobre la Rambla de Peña. Ctra. de Gaibiel.



Micritas y calcarenitas pisolíticas del Kimmeridgiense inferior y medio- Más El Campillo, Ctra. de Gaibiel.



Calizas pisolíticas y areniscas calcáreas, del Kimmeridgiense medio. La Fuente del Baño (NO. Navajas).




Calizas pisolíticas del Kimmeridgiense medio. La Fuente del Baño (NO. Navajas).



A la Izquierda, calizas con microfilamentos del Bathoniense-Calloviense. A la derecha calcarenitas, grises, pisolíticas, del Kimmeridgiense medio. La Fuente del Baño (NO. Navajas).



A la Izquierda; aspecto parcial de la serie del Dogger. Los niveles más altos contienen fauna calloviense. La Fuente del Baño (NO. Navajas).



Detalle.- Caliza pisolítica del Kimmeridgiense medio. (Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).



Alternancia rítmica de micritas y calizas arcillosas, lajosas. Kimmeridgiense inferior.
(Km. 36-38 Ctera. Sagunto-Burgos).



Alternancia rítmica de micritas y calizas arcillosas, lajosas. Kimmeridgiense inferior.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).



Micritas y pelmicritas tableadas del Dogger.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).



Detalle, micritas tableadas del Dogger.
(Km. 34-36 Ctra. Sagunto-Burgos).



Alternancia rítmica de micritas y calizas arcillosas, lajosas. Kimmeridgiense inferior.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).



Detalle.- Areniscas calcáreas con intercalaciones de areniscas compactas. Kimmeridgiense medio.
(Km. 36-38, Ctra. Sagunto Burgos).




Detalle.- Caliza pizolítica del Kimmeridgiense medio.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos)




Areniscas Calcáreas (subarcosas) del Kimmeridgiense medio (Km. 36-38, Ctra. Sagunto Burgos).



Detalle.- Areniscas calcáreas con intercalaciones de areniscas compactas. Kimmeridgiense medio.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).



Detalle.- Areniscas calcáreas con intercalaciones de areniscas compactas. Kimmeridgiense medio.
(Km. 36-38, Ctra. Sagunto-Burgos).



Detalle.- Areniscas calcáreas con intercalaciones de areniscas compactas. Kimmeridgiense medio.
(Km. 36-38, Crta. Sagunto-Burgos).



Areniscas calcáreas y calcarenitas microcristalinas oolíticas. Kimmeridgiense medio (Km. 36-38, Crta. Sagunto-Burgos).



Alternancia rítmica de micritas y calizas arcillosas, lajosas. Kimmeridgiense inferior.
(Km. 36-38 Ctra. Sagunto-Burgos).