



Foto nº 100.- Pliegue en abanico, en el esquistograuváquico - (PC_2^w). Proximidades del Km. 80 de la C^a Cáceres-Portugal.



Foto nº 101.- Microplegues y esquistosidad de fractura (S_1), en el esquistograuváquico. Km. 85 de la C^a Cáceres-Portugal.



101.- Micropliegues y esquistosidad de fractura (S_1), en el esquistograuwáquico. Km. 85 de la C^a Cáceres-Portugal.



Foto 102.- Aspecto del granito en facies porfiroide ($\text{p}_{2-3}^{\text{b} \varphi^2}$)



Foto nº 103.- Cornubianitas (K_p) al sur del batolito. Junto a las Huertas.



Foto nº 104.- Cuarcitas del Arenigiense (O_{12}) en Peñas de Puerto Roque.




Foto n° 105.- Vista panorámica desde Sierrafría. Se observan -- los siguientes tramos cartografiables: Ordovícico Silúrico (O_2-S^B), Arenigiense (O_{12}), Esquistograu váquico (PC_2), granito y derrubios de ladera (Q_L) Al fondo relieves de la Sierra de San Pedro.



105.- Vista panorámica desde Sierrafría. Se observan --
los siguientes tramos cartografiables: Ordovícico
Silúrico (O_2-S^B), Arenigiense (O_{12}), Esquistograu
váquico (PC_2), granito y derrubios de ladera (Q_L)
Al fondo relieves de la Sierra de San Pedro.



Foto nº 106.- Esquistosidad de plano axial (S_1) y anticlinal --
desdibujado, en el Silúrico-Devónico inferior ---
($S_1^B-D_{11}$) (Ladera N. de Sierrafría).



Foto nº 107.- Zona de grauvacas (PC₂^W) en el esquistograuváquico de las proximidades del Km. 80 de la C^a Cáceres-Portugal.




Foto nº 108.- Barra meridional de las cuarcitas del Llanvirnien-se-Llandeiloense (O_{21-22}), practicamente cubiertas por derrubios de ladera (Q_L) y próximas al esquistograuváquico (PC_2). Zona de Los Lapones.



108.- Barra meridional de las cuarcitas del Llanvirnien-
se-Llandeiloense (O_{21-22}), practicamente cubier-
tas por derrubios de ladera (Q_L) y próximas al es-
quistograuváquico (PC_2). Zona de Los Lapones.



Foto nº 109.- Aspecto de los depósitos Ordovícico-Silúricos (O_2-S^B), junto al Km. 103 de la C^a Cáceres-Portugal.



Foto nº 110.- Aspecto general del granito desde el Km. 99,2 de
la C^a Cáceres-Portugal.



Foto nº 111.- Granito desde el Km. 8 de la C^a a Alcorneo.




Foto n° 112.- Conjunto de Sierrafría. En primer término esquisto-grauváquico (PC_2) y Arenigiense (O_{12}), parcialmente cubiertos. Al fondo Ordovícico-Silúrico (O_2-S^B), Silúrico-Devónico (S^B-D_{11}), Diegeniense (D_{12}) y Siegeniense-Emsiense (D_{12-13}).



2 112.- Conjunto de Sierrafría. En primer término esquisto-grauváquico (PC_2) y Arenigiense (O_{12}), parcialmente cubiertos. Al fondo Ordovícico-Silúrico (O_2-S^B), Silúrico-Devónico (S^B-D_{11}), Diegeniense (D_{12}) y Siegeniense-Emsiense (D_{12-13}).



Foto n° 113.- Aspecto de un dique de aplita (F.A), afectado por una falla. Km. 1. C^a de Val de Alcántara a San Vicente.

(H)



Foto nº 114.- Micropliegues de la estratificación (S_0), producidos por la primera fase (F_1). Km. 82 C^a Cáceres a Portugal.




Foto nº 115.- Micropliegues de la estratificación (S_0), producidos por la primera fase (F_1). Km. 82 C^a Cáceres a Portugal.