



VF.1.- Facies "rubannée". Precámbrico del anticlinal del Esteras.



VF.2.- Paleocanal conglomerático situado aproximadamente en el límite entre pizarras y areniscos "rubannées". Con una potencia de unos 8 m., se observa el muro erosivo.

Precámbrico del anticlinal del Esteras.



VF.3.- Ripples con areniscas micaceas (km 18'4) Almadén-Agudo



VF.4.- Grandes bloques de cuarcita de hasta varios metros, de forma aborregada, con marcas de choque de forma de media luna.


Apoyados sobre pizarras de Calymene o englobados por rañas.



VF.5.- Detalle de la anterior.



VF.6.- Roca volcánica con diaclasado muy patente.



VF.7.- Repliegues de tipo fluidal en lavas ácidas.



VF.8.- Superficies de flujo en lavas ácidas, bastante replegadas



VF.9.- Conglomerado constituído por cantos de cuarcita y de rocas volcánicas, cementados por una matriz piroclástica ácida.



VF.10.- Hábito astilloso en las pizarras de Calymene, generalmente originado por la intersección de una esquistosidad de fractura con la superficie de estratificación, ambas oblicuas entre sí.



VF.11.- Pliegue en la "Alternancia Pochico". Dirección aproximada del eje N60E.



VF.12.- Pliegues en la "Alternancia Pochico", retocados por algunas fallas. Plano axial N75E y 25º de buzamiento al N.



VF.13.- Detalle de la anterior.



VF.14.- Dique subvolcánico, aproximadamente paralelo a la So, en las Pizarras de Calymene. Se acuña hacia la derecha.



VF.15.- Contacto a techo del dique anterior con las pizarras de Calymene. Se puede notar la ausencia de aureola de metamorfismo de contacto.



VF.16.- Ripples asimétricos de gran longitud de cresta en cuarcitas micáceas intercaladas en las Pizarras de Calymene.



VF.17.- Laminación cruzada en la "Cuarcita de Canteras", cuarcita micácea, bastante tableada.




VF.18.- Secuencias b-c de Bouma en cuarcitas intercaladas con niveles más peliticos del Tremadoc.



VF.19.- Ripples en cuarcitas del Tremadoc.



VF.20.- Bioturbación en el techo de cuarcitas del Tremadoc.



VF.21.- Pórfido subvolcánico interestratificado en el Precámbrico de Los Valles-Navalmedio.



VF.22.- Conglomerado de base del Tremadoc, muy próximo al límite con el Precámbrico.



VF.23.- Idem. a una distancia de unos 200 m al W. de la anterior.