

26-34-AD-BA-660.- Calcarenitas y calizas de Algas del Mioceno inferior-medio (T^{Ba}_{11-12} y T^{Ba-Bb}_{12-11}) de Las Hermanas, discordantes entre sí y sobre las dolomías del Kimmeridgiense medio-superior - (J^{2-3d}_{32}).



26-34-AD-BA-661.- Las mismas calcarenitas de Las Hermanas vistas desde otro ángulo. La serie en primer término representa el Cretácico superior dolomítico (C_2) del Prebético externo (s. st.).



26-34-AD-BA-662.- Aspecto de las "jumillitas" ($^{c'}_{P}\beta\, A^{7.8}_{M.L.n.}$) rocas basicas alcalinas, características de esta región, de donde reciben su nombre.



26-34-AD-BA-663.- Panorámica del Castillo de Jumilla y la Sierra del Buey al fondo. Los niveles masivos son dolomías del Cenomanense-Turonense (C_{21-22}).



26-34-AD-BA-664.- Dolomías cenomanienses-turonienses (C_{21-22}) sobre el Keuper del diapiro de Jumilla (T_{G3}).



26-34-AD-BA-665.- Panorámica de la Sierra del Buey y Jumilla. Todos los relieves están constituidos por dolomías y calizas del - Cretácico superior.



26-34-AD-BA-666.- Falla entre la Sierra del Molar (a la izquierda), y el bloque situado al Norte. Falla normal afectando al Cretácico superior.



26-34-AD-BA-667.- La gran masa dolomítica del Cenomaniense-Turoniense de Santa Ana (C_{21-22}^{1-0}). Entre la parte superior y la inferior existe un cabalgamiento que duplica la potencia de las dolomías.



26-34-AD-BA-668.- Arenas blancas del Albiense superior ($C_{16}^{3}w$) de Santa Ana.



26-34-AD-BA-669.- Al fondo las calizas senonenses de la Sierra del Molar (C_{23-26}). En primer término dolomías del Cenomanense-Turonense de Santa Ana (C_{21-22}^{1-0}).



26-34-AD-BA-670.- Calizas del Serravaliense-Tortoniense ($T_{12-11}^{Bc-Bc_C}$) discordantes sobre las margo-calizas arenosas del Burdigaliense-Langhiense (T_{12-11}^{Ba-Bb}).



26-34-AD-BA-671.- Panorámica de la Serie de la Sierra Larga desde el Este. Al fondo dolomías del Cenomaniense-Turoniense (C^{1-0}_{21-22}). En primer termino, y apoyándose sobre ella, calizas y calizas margosas del Senoniense (C_{23} y C_{24-26}). Sobre ellas calizas del Paleoceno-Ypresiense (T^{A-Ac}_{1-2}) y hasta Calizas de Algas del Aquitaniense-Burdigaliense (T^{Ba}_{11-12}).



26-34-AD-BA-672.- Calizas algo dolomíticas del Coniaciense (C_{23}) de la Sierra Larga.



26-34-AD-BA-673.- Conglomerado poligénico del Serravaliense-Tortoniense ($T^{Ba-Bc}_{12-11}cg$). En la base de la serie post-orogénica.



26-34-AD-BA-674.- Diapiro triásico de La Rosa. (J_{G3}). Al fondo el Cretácico inferior de la Sierra del Corche.



26-34-AD-BA-675.- Arcillas rojas y arenas del Oligoceno-Aquitaniense (T^{A-Ba}_{3-11}) apoyándose sobre calizas del Luteciense superior (T^{Ab}_{22}).



26-34-AD-BA-676.- Calizas nummulíticas del Luteciense superior (T_{22}^{Ab}) de la Rajica de Enmedio.



26-34-AD-BA-677.- Aspecto del Oligoceno-Aquitaniense (T^{A-Ba}_{3-11}) de la Rajica de Enmedio. Conglomerados, arenas y arcillas.



26-34-AD-BA-678.- Fallas afectando a calizas del Paleoceno-Eoceno inferior (T^{A-Ac}_{1-2}).



26-34-AD-BA-679.- Panorámica de la Serie de la Sierra Larga, desde el Oeste. El banco masivo superior son las dolomías del Cenomaniense-Turoniense (C_{21-22}^{1-0}). El más bajo corresponde a las calizas dolomíticas del Albiense superior (C_{16}^{3}). Entre ambos, y en los pinares, arenas y arcillas del Albiense superior ($C_{16}^{3}w$) y dolomías ocres con Orbitolinas planas del Albiense superior-Cenomaniense - inferior (C_{16-2}^{3-1}).



26-34-AD-BA-680.- Margas arenosas con Ostreas en el Aptiense superior-Albiense (C_{15-16}) de la Sierra Larga.



26-34-AD-BA-681.- Panorámica de Santa Ana. Cretácico inferior rodeado por dolomías del Cenomaniense-Turoniense (C_{21-22}^{1-0}).



26-34-AD-BA-682.- Vista del Pueblo de Jumilla apoyado sobre dolomías alternando con margas del Cenomaniense-Turoniense (C_{21-22}).



26-34-AD-BA-683.- Dolomías y calizas del Cretácico superior de la Sierra del Buey. A la derecha calcarenitas del Aquitaniense-Burdigaliense (T^{Ba}_{11-12}).



26-34-AD-BA-684.- La parte oriental del Macizo de Santa Ana. Dolomías y calizas del Cretácico superior. El valle está ocupado por Mioceno post-orogénico (T^{Bb-Bc}_{12-11}).



26-34-AD-BA-685.- La serie del Cretácico inferior de Sopalmo. Al fondo, a la derecha, calizas dolomíticas y dolomías del Albiense superior (C_{16}^{3}). Al fondo, a la izquierda, las dolomías masivas del Cenomaniense-Turoniense (C_{21-22}^{1-0}).



26-34-AD-BA-686.- La serie del Cretácico inferior de Sopalmo. Al fondo las dolomías del Cenomaniense-Turoniense (C^{0-1}_{21-22}). En primer término, y en la parte alta, calizas y calizas dolomíticas del Albiense superior (C^{3}_{16}). En el centro calizas arenosas muy fosilíferas, y arenas del Aptiense-Albiense (C



26-34-AD-BA-687.- El diapiro triásico de La Rosa (T_{G3}). En primer término arenas y margas del Aptiense superior-Albiense de Sopalmo (C_{15-16}).



26-34-AD-BA-688.- Calizas pisolíticas del Kimmeridgiense medio-superior (J_{32}^{2-3}) del vértice Tienda.



26-34-AD-BA-689.- Parte meridional de Sopalmo. A la izquierda - cantera para árido en las calizas del Paleoceno-Ypresiense - (T^{A-Ac}_{1-2}).



26.-34-AD-BA-690.- Al fondo, el diapiro triásico de La Rosa (T_{G3}). En primer término conglomerados y arcillas del Plioceno (T_2^B).