

Alternancia de materiales pelíticos y areníticos. Unidad detrítica en Facies Culm. Cuenca carbonífera del Guadiato (A1-260).



Aspecto de detalle de la fotografía anterior. Observar disyunción en "lapices" en los materiales pelíticos. (A1-261).



Calizas de la Sierra del Castillo. Unidad detrítico-carbonatada. Cuenca carbonífero del Guadiato. (A1-262).



Idem. anterior. Observar explotación canteril para áridos. (A1-263).



Conglomerados Westfalienses de la Cuenca Carbonífera del Guadiato. (A1-264).



Alternancia de pizarras y grauvacas en el Culm del Guadalbarbo (A1-265).



Volcanitas básicas con estructuras almohadilladas en el Culm del Guacalbarbo. (A1-266).



Pliegue sinesquitoso en la alternancia de pizarras y grauvacas (Culm de Pedroches). (A1-267).



Volcanitas ácidas (tobas y polvos volcánicos) en la base del Culm de los Pedroches (A1-268).



Calizas fosiliferas grises, hacia la base del Culm de los Pedroches (A1-269)



Detalle de la fotografía anterior (A1-270).



Aspecto de la Cuarcita Armoricana en la zona de Peñaladrones (A1-271).



Idem a fotografía anterior (A1-272).



Alternancia de cuarcitas y pizarras arenosas de "El Sordo" (A1-273).



Aspecto de detalle de la fotografía anterior (A1-274).



Alternancia de pizarras y areniscas de color oscuro (A1-275).



Afloramiento de cuarcitas masivas blancas (Cuarcitas de Camaras Altas) (A1-276).



Relieve típico de las cuarcitas de Camaras Altas, corresponde en la foto a los dos máximos relieves (A1-277).



Alternancia de pizarras y cuarcitas acarameladas (A1-278).



Calizas fosiliferas (arrecifales) del Devónico (A1-279).



Idem a fotografía anterior (A1-280).




Cuarcitas blancas del Devónico superior (A1-281).




Alternancia de esquistos cuarzoesquistos con intercalaciones de neises y anfibolitas (Unidad Obejo-Espiel) (A1-282).



Pasada neísica en la sucesión de esquistos y cuarzoesquistos (A1-283).



Afloramiento de detalle del granitoide de El Escribano. Unidad Obejo-Espiel (A1-284).



Aspecto de detalle del granitoide de El Escribano (A1-285).



Formación arcosica, asimilable a torreárboles. Unidad Obejo-Espiel (A1-286).



Aspecto de detalle de la fotografía anterior (A1-287).



Sucesión de filitas con pasadas arenosas milimétricas muy parecida a Formación de Azuaga. Unidad Obejo-Espiel (A1-288)



Aspecto de detalle de la fotografía anterior (A1-289).



Pliegue sinesquistoso en las cuarcitas de Sierra Bollera, junto a Villanueva del Rey (Materiales del grupo de Sierra Albarrana) (A1-290).



Micaesquistos en zona muy tectonizada junto a las Casas de la Vaquilla (Materiales del grupo de Sierra Albarrana) (A1-291).



Foto de los neises de Azuaga (A1-292).