

EMPRESA NACIONAL ADARO

ENADIMSA

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE  
OCHO MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE MURCIA.-

Informe núm. 729

DIRECCION TECNICA  
ESTRATIGRAFIA  
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA  
Julio 1972



EMPRESA NACIONAL "ADARO"

DE  
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.

LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

MADRID - CERRO DE LOS ANGELES  
TELEFONO 237 17 00

5 de Julio de 1972

INFORME N.º 729

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE  
OCHO MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE MURCIA.-

25-35 AD-OM 31

Pelsparita ligeramente arenosa.

Se determinan:

Globotruncana

Melobesias

Miliólidos

Globorotálidos

Lagénidos

Clypeorbis?

Discoecyclina

Paleoceno-Eoceno inferior

EL JEFE DEL LABORATORIO

25-35 AD-GM 32

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Equinodermos

Ostrácodos

Epistomina lacunosa

Epistomina scaphioloecula

Ticinella roberti

Biticinella breggiensis

Rotalipora ticinensis

Hedbergella trocoidea

Albense superior

25-35 AD-GM 33

Felsparita algo arenosa.

Se determinan:

Ostrácodos  
Globotruncanas  
Globigerinidos  
Ophtalmidiidos  
Operculinas?  
Anomalínidos  
Ataxophragmiidos  
Moluscos  
Equinodermos  
Truncorotalias

Paleoceno-Eoceno inferior

25-35 AD-GM 34

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y algo de yeso.

Se determinan:

Ostrácodos

*Epistomina lacunosa*

*Ticinella roberti*

*Hedbergella troccidea*

*Biticinella breggiensis*

*Hedbergella ex. gr. planispira*

Albense superior

25-35 AD-GM 35

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y yeso.

Se determinan:

Ostrácodos

*Rotalipora ticinensis*

*Ticinella roberti*

*Biticinella breggiensis*

*Hedbergella planispira*

Albense superior

25-35 AD-GM 37

Micrita algo arenosa, con óxido de hierro.

25-35 AD-GM 38

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

espículas

Radiolarios

Globorotalia mayeri

Praeorbulina ex. gr. glomerosa

Globorotalia scitula praescitula

Globigerinoides bisphaericus

Globigerinoides subsacculifer

Globigerinoides trilobus

Burdigaliense superior-Langhiense inferior

-20890

25-35 AD-GM 39

Biomicrosparita.

Se determinan:

Globigerinas  
Globorotalídeos  
Rotálidos  
Melobesias  
Textularídeos  
Lagónidos  
Solenomeris?  
Miogypsinídeos  
Nummulitídeos?  
Moluscos  
Equinodermos

Terciario (Mioceno probable)