

REVISADO IGME

-20890

①

EMPRESA NACIONAL ABARO

MTADINEA

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE
NUEVE MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE MURCIA.-

Informe núm. 833

DIRECCION TECNICA
ESTRATIGRAFIA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Diciembre 1972



MADRID - CERRO DE LOS ANGELES
TELEFONO 237 17 00

12 de Diciembre de 1972

EMPRESA NACIONAL "ADARO"
DE
INVESTIGACIONES MINERAS, S. A.
LABORATORIO DE MICROPALAEONTOLOGIA

INFORME N.º 833

ESTUDIO MICROPALAEONTOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO DE
NUVE MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE MURCIA.-

25-35 AD-LJ 118

El residuo de levigación contiene abundante curso.

Se determinan:

espículas
Orbulina universa
Globorotalia miosca
Cassidulina laevigata
Bolivinoidea miocenica
Globorotalia gorostoma
Ehrenbergina alicantina
Bolivina arta
Globoquadrina dehiscens

EL JEFE DEL LABORATORIO

Hopkinsina bononiensis

Globorotalia pseudomiocenica

Amhyeorina scalaris

Globorotalia ex. gr. menardii

Tortonense

25-35 AD-LJ 120

El residuo de levigación está formado por trozos de marga arenosa.

Se determinan:

Globorotalia acrostoma

Globigerinoides trilobus

Bolivina arta

Globorotalia micsea

Cassidulinoides bradyi

Orbulina universa

Globorotalia praemenardii

Uvigerina schwageri

Helvetiense (probable Serravallo-
lionse)

25-35 AD-LJ 121

El residuo de levigación está formado, casi en su totalidad, por cuarzo.

Se observan oogenios de Characón.

Mad indeterminada

25-35 AD-LJ 122

El residuo de levigación está formado por trozos de margu y algo de yeso.

Se observan:

Maebleriella cf. *mangonoti*

Leaprethamnium cf. *priscum*

Ilordienso-Cuisienso

25-35 AD-LJ 123

El residuo de levigación está formado por trozos de margu y abundante cuarzo.

Se observan cogonies de Characoa.

Edad indeterminada
(posible Eoceno-Oligoceno)

25-35 AD-LJ 124

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

cogonies

Globigerinas? (pequeñas)

Edad indeterminada
(posible Eoceno-Oligoceno)

25-35 AD-LJ 126

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza más o menos margosa y cuarzo. Los restos orgánicos son escasos; hay algo de resedimentación del Cretácico.

Se determinan:

Trifarina bradyi
 Nonion pompilioides
 Plectofrondicularia varicosta
 Globigerinoides aff. sacculifer
 Nonion soldanii

Mioceno

25-35 AD-LJ 127

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza margosa algo arenosa.

Se determinan:

espículas
 Nonion pompilioides
 Globigerinoides trilobus
 Siphonina reticulata
 Globorotalia scitula
 Globorotalia miozea
 Orbulina universa
 Bolivina arta

Globorotalia praemonardii

Helvetiense

(probable Serravalloense)

25-35 AD-LJ 128

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

espículas

Globorotalia miosoa

Nonion soldanii

Bolivina arta

Globorotalia pseudopachyderma

Ammonia beccarii

Globigerinoides trilobus

Cassidulinoides bradyi

Helvetiense-Tortonense